

의약품 분류번호	114 해열·진통·소염제
-------------	------------------

【원료약품의 분량】 100mL 중

아세트아미노펜(KP)	1388.89mg
덱스트로메토르판브롬화수소산염수화물(KP)	80mg
페닐레프린염산염(KP)	50mg
디펜히드라민염산염(KP)	123.33mg
*첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸(KP)	90mg
: 파라옥시벤조산프로필(KP)	10mg

【성상】

갈색 또는 흰색의 플라스틱 또는 유리병에 든 포도향이 나는 단맛의 무색 또는 미황색의 시럽제

【효능·효과】

감기의 증상(여러 증상)(코물, 코막힘, 재채기, 인후(목구멍)통, 기침, 오한(춡고 떨리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

【용법·용량】

다음의 1회 용량을 1일 3~4회, 식후 30분 및 취침 시에 복용한다. 복용간격은 4시간으로 한다.

연령	1회용량
15세 이상	15mL
만 11세 이상 ~ 만 15세 미만	10mL
만 7세 이상 ~ 만 11세 미만	7.5mL
만 3세 이상 ~ 만 7세 미만	5mL
만 2세 이상 ~ 만 3세 미만	3.75mL

만 2세 미만에게 투여하지 않는다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받는다.

【사용방법】



1. 뚜껑 뒷부분을 누른 상태에서 시계 반대 방향으로 돌려주세요.



2. 병 입구에 실린지의 꼭지를 맞추어 고정해 주세요.



3. 병과 실린지를 잡고 뒤집어, 실린지 안쪽의 피스톤을 당겨 실린지 내부에 시럽을 채웁니다.



4. 병을 바로 세운 후, 양손으로 병과 실린지의 몸통을 잡고 힘주어 뺀 후, 용법·용량에 따라 소아에게 투여합니다.



5. 컵에 깨끗한 물을 담고, 실린지 끝을 담겨 물을 채웁니다.



6. 실린지의 채운 물을 버리고, 5항목의 과정을 반복합니다.

【취급상의 주의】

써스펜 나이트시럽은 어린이들이 쉽게 개봉하기 어려운 어린이보호용 마개(CRC=Child-Resistant Closure)를 사용하여 약의 오용(잘못사용)·남용 및 어린이 약물중독을 예방하고 있습니다.

【사용상의 주의사항】

- 경고
매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용 하면 간손상이 유발 될 수 있다.
- 이 약을 복용하는 동안 다음과 같은 행위를 하지 말 것
이 약에는 아세트아미노펜이 함유되어 있다. 다른 아세트아미노펜 제품과 함께 복용하여 일일 최대용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용해서는 안 된다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
2) 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 천식을 일으킨 적이 있는 사람
3) 만 3개월 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기)
4) 수유부(수유중인 사람은 이 약을 복용하지 않거나 수유를 중단할 것)
5) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것
진해(기침을 그치게 함)거담제(가래약), 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염(코염)용 경구제, 멸미약, 알레르기용약), 디펜히드라민을 함유하는 제제(피부에 적용하는 제제 포함)
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것
1) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(젖먹이, 갓난아기) 및 만 15세 미만의 어린이(구역이나 구토를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이증후군의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의할 것)
2) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염(코염), 편두통, 음식을 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
3) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
4) 간장질환, 신장(콩팥)질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 위십이지장궤양, 녹내장(예:눈의

통증, 눈이 침침함 등), 배뇨(소변을 누)곤란 등이 있는 사람 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람

- 5) 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나 궤양, 출혈 문제를 가지고 있는 사람
- 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 7) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨약, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)
- 8) 다음과 같은 기침이 있는 사람
출연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침
6. 소아에 대한 투여
만 2세 미만에게 투여하지 않는다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받는다.
7. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것
상당시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것
1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
발진·발적(총혈되어 붉어짐), 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 변비, 부종(부기), 배뇨(소변을 누)곤란, 목마름(지속적이거나심한), 어지러움
2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 증상(심한 증상) 증상이 나타난 경우
① 속(아나필락시스) : 복용후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다.
② 피부점막안정후군(스티븐스-존슨증후군), 중독성표피괴사증후군(레일증후군) : 고열을 동반하고, 발진·발적(총혈되어 붉어짐), 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈 점막에 나타날 수 있다.
③ 천식
④ 간기능장애 : 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨)등이 나타날 수 있다.
⑤ 간질성폐렴 : 기침을 동반하고, 숨이 차고, 호흡곤란, 발열 등이 나타난다.
3) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우
8. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
2) 장기간 계속 복용하지 말 것
3) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도·감독하에 복용시킬 것
4) 복용시에는 음주하지 말 것
5) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것
6) 바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다.
9. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것
2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것
3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

【저장방법 및 사용기한】 기밀용기, 실온보관(1~30℃), 제조일로부터 36개월

【포장단위】 90mL

【제품문의처】 한미약품(주) 소비자상담실 : 080-916-9000(수신자요금부담)

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다.
(구입 시 사용기한 또는 유통기한이 경과되었거나 변질·변패·오손된 제품은 구입처를 통하여 교환 또는 환불하여 드립니다.)

※ 사용기한이 경과한 제품은 복용하지 마십시오.

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한(유효기한)이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견 될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 의약품의 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인의약품서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하시기 바랍니다.

※ 이 문서 작성일자(2015년 9월) 이후 변경된 내용은 www.mcunilpharm.com 또는 전화 (031-378-1460)를 통하여 확인하실 수 있습니다

※ 주의

1. 어린이가 함부로 사용하지 않도록 보호자의 각별한 지도·감독에 주의를 기울여 줄 것.
2. 정해진 용법·용량을 준수하여 사용할 것.
3. 사용 후에는 뚜껑을 꼭 닫아 보관할 것.
4. 사용한 실린지는 다른 이물질이 묻지 않도록 물에 씻어서 위생보관할 것.

제품 개봉 시 또는 취급 시에 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

설명서 작성연월일 : 2015. 09. 15

판매자 :

Hanmi 한미약품(주)

(본사) 서울특별시 송파구 위례성대로 14
(공정) 경기도 화성시 팔탄면 무화로 214

제조자 : **한국맥넬티(주)**

충청남도 천안시 서북구 성환읍 울금3길 46

※ 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는 설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 이 제품설명서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 한미약품(주) 홈페이지(www.hanmi.co.kr)의 제품정보 또는 제품문의처 전화를 통해 확인하실 수 있습니다.