



분류번호 : 319(기타의 비타민제)

● 메가트루포커스 개요 및 특징

비타민B는 미량 영양소로서, 우리 몸에서 생기는 다양한 대사 반응을 촉진하고 에너지 대사를 원활하게 하며 근육과 피로에 한한다. 한 종류라도 부족하게 되면 체내에서 일어나는 여러 가지 대사에 지장을 초래하며 질병이 유발될 수 있습니다. 베타카로틴과아스당은 비타민B군을 포함하고 있으며, 특히 비타민B의 활성형으로 체내로 흡수되므로 건강과 질병에 대한 비타민B군을 이용한 고분자 제제에 비해 체내 흡수능력을 높였습니다. 또한 높은 선장화 완화 등 건강에 좋은 비타민 A와 B2 제제에 도움을 주는 칼슘, 비타민D, 이소플라본 및 아미노산 성분은 안과질환 예방에 한층더 도움이 되며, 성장발달에, 신경계, 근육, 관절, 뼈, 소화기능을 있는 영양소로 보충 해 줍니다. 노년기 및 임신, 수유기에 더욱 중요합니다.

● 성분·합량 1점 중

β-카로틴20% 과립(별규(β-카로틴으로서 3.6mg))	18.0mg
벤조티아민(KP)티아민염산염으로서 36,16mg)	50.0mg
피리독시염산염(KP)	50.0mg
시아노코발린 100배산(별규(시아노코발린으로서 100μg))	10.0mg
아스코르브산 과립97%(별규(아스코르브산으로서 100.01mg))	103.1mg
콜레칼시페롤과립(BP)(비타민D로서 400IU)	4.0mg
리보플라빈(KP)	30.0mg
α-비오틀린1%(별규(비오틀린으로서 0.1mg))	10.0mg
인산소칼슘수화물(USP)(칼슘으로서 50.07mg, 인으로서 38.69mg(총 칼슘으로서100,12mg))	215.0mg
침강탄산칼슘(KP)(칼슘으로서 50.05mg(총 칼슘으로서 100,12mg))	125.0mg
로알렐리(생규(10-히드록시-4-테세노인산으로서 0.4mg))	10.0mg
산화마그네슘(KP)(마그네슘으로서 100.08mg)	165.9mg
산화아연(KP)(아연으로서 15.02mg)	18.7mg
폴리타르타르산염(DAB)	50.0mg

● **성상** 적갈색의 타원형 필름코팅정

品名	規格	単位
B-FC	Y H	

● **형·화**

- ▶ 다음 경우의 비타민 A, D, B, B₂, B₆, C의 보급
 - 육체적으로 - 임신, 수유기 - 병중, 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력회복 - 발육기 - 노년기
 - 이밖에 함유된 비타민 등의 효능 - 효과는 다음과 같다.
 - 비타민A(β-카로틴20%, 과립): 눈의 건조막의 완화, 야맹증(잘 못 보는 증상)
 - 비타민D(테트라칼슘과포화): 뼈, 이의 발달증진, 구루병의 예방
 - 비타민B(비타민B1~B12) - 다음 증상의 예방: 신경통, 근육통, 관절염(염), 요하림, 야맹증 등 - 각기 - 눈의 피로
 - 비타민B(비타민B1과B12), 비타민D(비타민D독신염산염) - 다음 증상의 완화: 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 속진, 피부병
- ▶ 이연의 보급

- **대상** 만12세 이상 및 성인 : 1회 1전 1일 1~2회 복용 ※ 충분한 양의 물과 함께 복용하십시오

● **사용상의 주의사항**

1) 경고

(1) 입부에 비타민 A(레티놀)를 1일 5,000 IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A를 5,000 IU/일 이상 투여하지 마십시오(비타민 A결핍증 환자는 제외).

2) 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오

(1) 고칼슘혈증(hypercalcaemia: 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태) 환자, 유육종증(sarcoidosis: 원인을 알 수 없는 전신 염증질환, 신장(콩팥)질환 환자 (2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 (3) 만 12개월 미만의 저면이 (4) 신장(콩팥)결석 환자 (5) 신장 조상의 신부전 환자

3) 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

(1) 인산염, 칼슘염, 경구(먹는)용 테트라사이클린계 제제, 제산제 (2) 레보도파

4) 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오.

[illegible]

5) 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 중단

참포문자를 시호화한다

(1) 이의 명부 목록에 의해 대외의 증명이 있을 경우 : 지역, 국호, 기호, 조호와 개인, 단체, 동종친 결핵증후부가 실려
 들은 번, 번번, 저혈압, 얼굴말아오름, 심박률불규칙, 피부발진, 높은 빈도, 부전자축(심박률증가), 중추신경계
 기능저하, 경골조직의 조형장애 등 두부이상증상, 폐경후부(가장 긴) 조골을 포함하여 증상의 다양성이 있음
 (2) 피파리시비 일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 2 주간의 복용으로 감진증상(신경통증, neuropathy,)
 말초신경계의 기능상 장애로 발생하여 나타날 수 있음. (4) 폴산이 부족한 환자에게 2 주간의 B12를
 10 mg 이나 투여할 경우 혈청에서 이산화탄소가 나타날 수 있음. (5) 대장암과 관련 하여, 구토 등 위장장애
 골다공증혈중, 골밀도상부, 부종(부기 등)의 증상이 나타날 수 있음. (6) 장기간투여에 의해, 고칼슘혈증 및
 결석증상 나타날 수 있음. (7) 장기간 고용량의 비탄 아세트아르비린으로부터 전한 것 제외한
 폐경기 전 여성들의 다공성골(경골)증상을 유발할 수 있음. (8) 항암제(타르페, 트라테티딘) 병용투여
 (항배위)은 고칼슘혈증증상을 일으킬 수 있으므로 주의함. (9) 우발적으로 과량복용 한 경우 (10) 1개월 정도
 복용하여도 조산의 개시에 영향을 준다

6) 기타 이 약의 복용 시 주의사항

(1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜십시오. (2) 복용시 의사, 한의사, 약사, 한약사와 상의하십시오. (3) 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000 IU 이상을 넘지 않도록 합니다. (4) 각종 요양사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다. (5) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사에 영향을 줄 수 있습니다. (6) 노인, 환자 등 탄소를 함유하는 차는 복용중 복용전후에는 피하십시오.

7) 저장상의 주의사항

(1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오 (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관하십시오 (3) 오용/잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오

● **사용기한** 외부포장에 표기

● 포장단위 120정(60정x2)

● **저장방법** 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

※정제를 꺼낸 후에는 뚜껑을 꼭 닫아주시시오(본 제품은 습기가 많은 곳에서는 보관 중 안습(흡습)되어 변색될 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.)

※이 의약품은 KGMP(우수 의약품 제조관리기준) 적격업체 의약품으로 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되었거나 파손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환·반품 가능하며, 정비가 "소비자보호센터"에서 이의 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※이 설명서의 최근 변경된 내용은 홈페이지(www.yuhan.co.kr) 또는 소비자상담실(080-024-1188)에서 확인하실 수 있습니다.

문안작성연월일 2015년 9월 23일



제조판매위

유한양행

■ 본사: 서울특별시 동작구 노량진로 74

공장:충북 청주시 청원구 오창읍 연구단지로 219

소비자상담실 : 080-024-1188

J1463212/01B