

리버디 캡슐

이연제약주식회사

분류번호 391

전문의약품

리버디 캡슐

【원료약품 및 그 분량】 1 캡슐 중
비페닐디메틸디카로복살레이트(별규) 12.5mg
우르소데옥시콜산(KP) 50mg
첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소, 우유)

【성상】
흰색의 분말을 함유한 상하부 흰색의 경질캡슐제

【효능·효과】
지속적으로 SGPT가 상승되어 있는 만성지속성 간염

【용법·용량】
보통 성인 1회 1캡슐, 1일 3회 식후 경구 투여한다.

【사용상 주의사항】

- 다음 환자에게는 투여하지 말 것
 - 1) 완전담도 폐쇄가 있는 환자
 - 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 다음 환자에게는 신중히 투여할 것
 - 1) 만성 활동성 간염환자
 - 2) 간경화 환자
 - 3) 저알부민증이 있는 환자
 - 4) 심한 회장 질환이 있는 환자
 - 5) 소화성 궤양이 있는 환자
 - 6) 담석증 환자
- 부작용
 - 1) 소화기: 때때로 설사, 구역, 구토, 드물게 복통, 변비, 가슴 앓이, 위부불쾌감 등의 증상이 나타날 수 있다.
 - 2) 과민증: 때때로 가려움증, 드물게 발진등의 과민증상이 나타날 수 있다. 간혹 파진이 생길수 있으나 일반적으로 항과민약을 함께 사용하면 소실된다.
 - 3) 일과성 황달이 나타날 수 있으나 투약을 중지하거나 황달 치료제를 병용 투여하면 소실된다.
 - 4) 기타: 드물게 전신관통감, 헛기아 나타날 수 있다.
 - 5) 국내 시판 후 조사결과
국내에서 재성사를 위하여 6년 동안 640명의 만성지속성 간염환자를 대상으로 실시한 시판 후 사용성적조사결과 유효사례 및 약물유해반응 발현율은 0.31%(2명/640명, 3건)로 보고되었으며, 간경화, 복수, 급성 C형 간염 각각 0.16%(1명/640명, 1건)로 조사되었다. 모두 중대하고 예상하지 못한 약물유해반응이며, 이 약과의 인과관계를 배제할 수 없었다.
- 일반적 주의사항
 - 1) 정해진 용법 용량을 지킬 것
 - 2) 장기간 (최대8주)의 복용에도 불구하고 증상의 개선이 없거나, 이 약의 복용으로 이상 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의할 것

- 3) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
5. 임신부에 대한 투여
동물 실험에서 태자독성이 보고되어 있으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에게는 투여하지 않는 것이 바람직하다.
6. 상호작용
경구 당뇨병약(글리벡 등)과 병용 투여시 경구 당뇨병약의 작용이 증가 될 수 있으므로 신중히 투여할 것

【포장 단위】 30캡슐, 300캡슐

【저장 방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【사용 기간】 제조일로부터 36개월

【제 조 자】 (주)넥스팜코리아
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 168-41

【제조외화자】 이연제약(주)
충청북도 진천군 덕산면 한성로 69-10

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오염되거나 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서 작성일자(2015년 09월 23일)이후 변경된 내용은 www.reyonpharm.co.kr이나 식품의약품안전처 온라인 의약품서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 의약품 용어설명이나 기타 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 온라인의약품서관(<http://drug.mfds.go.kr>) 의약품 정보 참조

※ 고객센터 : 080-221-2000(수신자부담)

작성년월일 : 2015. 09. 23

이연제약주식회사
본사 : 서울 용산구 서빙고로 91나길 43
공정 : 충북 진천군 덕산면 한성로 69-10
TEL.027793-5557