

복합항생제·상처치료제 풀믹신연고

일반의약품

분류번호:02690

【원료약품 및 그 분량】 1g 중

■ 유효성분 :

네오마이신황산염(KP)	3.5mg(역가)
바시트라신아염(KP)	500I.U(역가)
폴리믹신B황산염(KP)	10,000I.U(역가)
프라목신염산염(USP)	10mg
■ 첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸	0.8mg
■ 첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산프로필	0.2mg
■ 기타 첨가제 : 백색바셀린, 에탄올, 유동파라핀, 폴리옥실 40 스테아레이트	

【성상】 흰색 또는 옅은 황색의 연고제

【효능·효과】

배임, 창상(상처), 화상에 의한 감염증 예방 및 통증완화

【용법·용량】

2세 이상 : 1일 1 ~ 3회 질환부위에 적당량을 바른다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것.

- 1) 아미노글루코사이드계 항생제 및 바시트라신에 의한 과민반응이 나타난 적이 있는 환자
- 2) 고막 천공(돌림)이 있는 환자

2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

상당시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 과민반응 : 발진 등의 과민증상이 나타나는 경우
- 2) 장기 연용(계속 복용) : 신장에(신장장애), 난청(귀먹음)이 나타나는 경우(장기 연용을 피할 것).
- 3) 감각중후(가려움증, 발적(충혈되어 붉어짐), 종창(부기), 구진, 소수포(물집) 등)가 나타나는 경우(감작(과민상태로 만들)되어 있을 수 있으므로 관찰을 충분히 할 것).
- 4) 내성군 또는 비감수성균이 발육과다를 초래할 수 있다. 이러한 현상이나 지극, 과민반응, 중복감염이 나타나는 경우
- 5) 2주 이상 사용여도 증상 개선이 보이지 않을 경우

3. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항

- 1) 외용으로만 사용할 것.
- 2) 광범위한 화상, 궤양이 있는 피부에는 장기간 사용하지 말 것.
- 3) 안과용으로는 사용하지 말 것.

4. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보존할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 대로(습기가 적고) 서늘한 곳에 (밀전하여 (뚜껑을 꼭 닫아)) 보존할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질을 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 10g

【사용기간】 제조일로부터 24개월

- * 본 의약품은 우수약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용(유효)기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- * 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
- * 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용(복용)하지 마십시오.
- * 이 약을 사용(복용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.
- * 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.
- * 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

첨부문서 개정 연월일 : 2017. 07. 27

제조사

태극제약(주)

충청남도 부여군 초촌면 금백로 821



판매자

BORYUNG

보령제약

제조의뢰자

제이에스제약(주)

전남 장성군 황룡면 강변로 484-28
소비자상담전화 : 061) 394-5530