

우수한 위산분비 억제제

라베민정10mg20mg(라베프라졸나트륨)

Rabeprazole Sodium 10mg/20mg

- 원료약품 및 분량** : 1정 중 라베민정10mg(라베프졸나트륨)
 - 유효성분: 라베프라졸나트륨(JP) - 10.0mg
 - 기타 첨가제: D-만니톨, 침강탄산칼슘, 수산화알루미늄, 히드록시프로필셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 에틸셀룰로오스, 히드록시프로필메타크릴레이트, 디아세틸화호모글리세리드, 텔크, 산화티탄, 황색산화철, 카르나우바남
- 라베민정20mg(라베프라졸나트륨)
 - 유효성분: 라베프라졸나트륨(JP) - 20.0mg
 - 기타 첨가제: D-만니톨, 침강탄산칼슘, 수산화알루미늄, 히드록시프로필셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 에틸셀룰로오스, 히드록시프로필메타크릴레이트, 디아세틸화호모글리세리드, 텔크, 산화티탄, 황색산화철, 카르나우바남
- 성상**
 - 담황색의 원형정형 필름코팅정
- 효능·효과**
 - 위궤양, 십이지장궤양
 - 미란성 또는 궤양성 위식도역류질환
 - 위식도역류질환의 증상 완화
 - 위식도역류질환의 장기간 유지요법
 - 헬리코박터피로리 감염된 소화기 궤양 환자에 대한 항생제 병용요법
 - 졸렝거 엘리스 중후군
- 용법·용량**
 - 위궤양, 십이지장궤양 : 통상 성인에게 라베프라졸나트륨으로서 1일 1회 10mg을 경구 투여한다. 중증에 따라 1일 1회 20mg을 경구 투여할 수 있다. 통상 위궤양에는 8주까지, 십이지장궤양에는 6주까지 투여한다.
 - 미란성 또는 궤양성 위식도역류질환 : 1일 1회 10mg 또는 20mg을 4 ~ 8주간 투여한다. 프로톤펌프억제제(PPI, proton pump inhibitor)를 8주간 투여 후에도 치료되지 않은 경우, 투여를 8주간 10mg 또는 20mg을 1일 2회 경구 투여할 수 있다. 단, 20mg 1일 2회 투여는 중증의 잠막 손상이 확인된 환자에 한한다.
 - 위식도역류질환의 증상 완화 : 1일 1회 10mg을 투여한다. 4주간 투여 후에도 증상이 조절되지 않는 경우, 추가 진료가 필요하다.
 - 증상이 소실된 후에는, 필요시 10mg을 1일 1회 투여하는 on-demand 요법을 사용하여 이후에 나타나는 증상을 조절할 수 있다.
 - 위식도역류질환의 장기간 유지요법 : 환자에 따라 1일 10mg 또는 20mg을 경구 투여한다.
 - 헬리코박터피로리 재균 : 헬리코박터피로리 감염 환자들은 재균요법으로 치료받아야 한다. 이 약 20mg과 클레트리트로마isiin 500mg, 아목시실린 1g을 1일 2회씩 7일간 병용 투여함이 권장된다.
 - 졸렝거 엘리스 중후군 : 성인에 대한 권장 조절가능량 1일 1회 60mg이다. 투여량은 개개 환자의 필요에 따라 1일 120mg 까지 조절 가능하다. 100mg 용량까지는 1일 1회 투여가 가능하며, 120mg 용량은 60mg씩 1일 2회로 나누어 투여한다. 졸렝거 엘리스 중후군 환자들은 이 약을 1년까지 투여한 것이 있다.
- 간장애 환자 - 간경변 환자에서 간성뇌증의 임상반응이 보고되었다. 따라서 신중히 투여하여야 한다.
 - 소아 - 소아에 대한 안전성이 확인되어 있지 않다.
 - 고령자 - 간기능이 저하되어 있는 경우가 많으므로 신중히 투여한다.
- 사용상의 주의사항**
 - 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 이 약, 이 약의 구성성분 또는 벤즈이미다졸류에 과민반응 및 그 병력이 있는 환자
 - 2) 페니실린계 항생제에 과민반응 환자(헬리코박터피로리 박멸을 위해 아목시실린과 병용요법시)
 - 3) 마크로라이드계 항생제 과민반응 환자(헬리코박터피로리 박멸을 위해 클레리트로마isiin과 병용시에 한함.)
 - 4) 테르페나딘, 시사프리드, 피오지드, 아스테미졸을 투여 받고 있는 환자(헬리코박터피로리 박멸을 위해 클레리트로마isiin과 병용시에 한함) (상호작용항 참조)
 - 5) 아타나나비르를 투여중인 환자
 - 6) 임부 및 수유부
 - 7) 필피비린을 투여중인 환자(상호작용항 참조)
 - 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 1) 간장애 환자
 - 2) 고령자/고령자에 대한 투여항 참조)
 - 3) 약물 과민반응의 병력이 있는 환자
 - 이상반응
 - 1) 과민반응 : 때때로 발진, 두드러기, 가려움 등이 나타날 수 있으므로 이런 증상이 나타난 경우에는 투여를 중지한다.
 - 2) 혈액계 : 때때로 적혈구감소, 백혈구감소, 백혈구증가, 호중구증가, 호중구증가, 림프구감소, 빈혈, 반상출혈, 림프절병증, 자색소빈혈, 범혈구 감소, 무과립구증, 혈소판감소, 응혈성 빈혈 등이 나타날 수 있으므로 투여 중에는 정기적으로 혈액학적 검사를 하는 것이 바람직하다. 또 이상이 나타난 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 조치를 한다.
 - 3) 간장 : 때때로 ALT, AST, ALP, γ-GTP, LDH, 총빌리루빈의 상승 등이 나타날 수 있으므로 투여 중에는 정기적으로 혈액생화학학적 검사를 하는 것이 바람직하다. 전격성간염, 간기능장애, 황달이 나타날 수 있다. 이상이 나타난 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 조치를 한다.

- 심혈관계 : 고혈압, 심근경색, 심전도 이상, 편두통, 실신, 협심증, 각차단, 심계항진, 두서맥, 빈맥, 드물게 서맥, 폐색전증, 심실상성 빈맥, 혈전정맥염, 혈관확장, QTC 연장, 심실 빈맥이 나타날 수 있다.
- 소화기계 : 설사, 때때로 변비, 복통, 복부팽만감, 소화불량, 트림, 구역, 작열감, 열, 열변, 기식증, 담석증, 구강궤양, 삼킴곤란, 잇몸염, 갈개증, 식욕항진, 비정상적 대변, 대장염, 식도염, 설염, 폐장염, 직장염등을 드물게 구갈, 구토, 허복부통, 위체, 위염, 구내염, 마리아상, 출혈성 설사, 담관염, 십이지장염, 위장 출혈, 간성뇌증, 간염, 간암, 간지방축적, 침샘확장, 갈증이 나타날 수 있다.
- 정신신경계 : 두통, 불면, 불안, 현기증, 경련, 비정상적인 꿈, 성욕저하, 신경병, 감각이상, 떨림, 때때로 무력증, 신경과민, 졸음, 또 드물게 현훈, 우울 등이 나타날 수 있다. 드물게 조조, 기억상실증, 혼돈, 추체의 탈동추근, 순환혈류량과다가 나타날 수 있다. 또, 간경변환자 1례에서 상지 사지성 마(知覺麻痺), 약력저하, 언어혼란, 휘청거림, 외국에서 간성뇌증의 기왕력을 가진 간경변환자 1례에서 착란, 방황감각 장애, 기면(嗜眠)의 보고가 있다.
- 호흡기계 : 기침, 인두염, 비염, 호흡곤란, 천식, 코피, 후두염, 딸꾹질, 과다호흡, 때때로 기관지염, 부비동염이 나타날 수 있다. 드물게 무호흡, 호흡저해가 나타날 수 있다. 간질폐렴이 나타날 수 있으므로 발열, 기침, 호흡곤란, 폐음 이상 등이 확인된 경우에는 이 약의 투여를 중지하고 신속하게 흉부 X선 검사 등을 실시하고 적절한 처치를 한다.
- 근골격계 : 근육통, 요통, 관절염, 다리경련, 뼈 통증, 관절증, 율혈관염, 과다 근육긴장증, 신경통, 드물게 단일수축이 나타날 수 있다.
- 피부 및 부속기계 : 발진, 가려움, 발한, 두드러기, 발모증, 드물게 피부건조, 대상모진, 간진, 피부색 변화, 독성표피괴사용해(리얼중후군), 피부점막만중후군(스티븐스-존슨증후군), 다형홍반이 나타날 수 있다.
- 특수감각 : 배내장, 악시, 복내장, 안구건조, 비정상적 시야, 이명, 중이염, 드물게 각막혼탁, 초라비음, 결모비, 난청, 눈의 통증, 망막변성, 사시가 나타날 수 있다.
- 비뇨기계 : 단백뇨, 방광염, 빈뇨, 월경곤란, 배뇨곤란, 신결석, 자궁출혈, 다뇨증, 드물게 유방확장, 혈뇨, 발기부전, 질분비물, 월경과다, 고환염, 요실금, 간질신장염이 나타날 수 있다.
- 기타 : 때때로 부종 및 총콜레스테롤, 중성지방, BUN, 혈중 갑상샘 자극 호르몬의 상승, 홍통, 오한, 발열, 요로감염, 흉한, 또 드물게 관태강, 체중증가, 시각 이상, 식욕부진, 경부경직, 광과민성 반응, 속취와과, 체중감소, 통풍이 나타날 수 있다. 다른 프로톤펌프억제제(proton pump inhibitor)계열약품(오메프라졸, 란소프라졸)에서 드물게 아나필락시스반응, 쇼크를 일으켰다는 보고가 있으므로 이상이 나타난 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- 사한 후 외국에서 보고된 이상반응
 - 간 호소 수치의 상승이 보고되었으며, 드물게 간염, 황달이 보고되었다. 간경변 환자에서 간성뇌증이 드물게 보고되었다. 급사, 혼수, 고암모니아혈증, 황문공 동해, 방광간질장애, 섬망, 아나필락시스, 혈변부종이 보고되었다. 또한, 드물게 저마그네슘혈증, 혈소판감소, 호중구감소, 백혈구감소, 무과립구증, 응혈성 빈혈, 범혈구감소증, 수축 호소 등은 두드러기성 피부 발진 및 전신적인 알레르기 반응(저혈압, 호흡곤란, 안면부종 등), 근육통, 관절통이 보고되었다. 매우 드물게 간질 신장염, 여형형용양증, 간질폐렴, 갑상샘자극호르몬 상승, 다형홍반, 독성 표피괴사증후군(리얼중후군) 및 피부점막만중후군(스티븐스-존슨 증후군)이 보고되었다. 와르파린과 병용시 INR과 프로트롬빈 시간 증가가 보고되었다. 뼈골절이 보고되었다. 실험실적 검사에서 라베프라졸 치료와 관련이 있는 다른 뚜렷한 비정상적인 검사결과는 보고되지 않았다. 클로스트리듐 디피실레성 설사가 나타날 수 있다(빈도불명).
- 다음은 프로톤펌프억제제의 사한 후 조사를 통해 보고된 이상반응이다. 이 이상반응은 불특정 다수의 인구집단에서 자발적으로 보고된 것이기 때문에, 항상 발생률을 신뢰성 있게 예측하거나 약물 투여와의 인과관계를 확립할 수 있지는 않다.
 - 면역계 : 전신홍반증후군
 - 피부 및 피하조직계 : 피부홍반무루스
- 국내 사한 후 조사결과
 - 국내에서 재심사를 위하여 6년 동안 53,109명을 대상으로 실시한 사용성적조사결과 이상반응의 발생증례들은 인과관계와 상관없이 0.47%(250례/53,109례)로 보고되었다.
 - (1) 소화기계 : 구역, 변비, 복통, 설사, 소화불량, 복부팽만, 트림, 구갈, 구취, 설염, 구강건조, 구토, 마리아상, 위염, 간기능 이상, ALT 상승, AST 상승
 - (2) 전신 및 대사이상 : 가슴답답함, 알레르기 반응, 발열, 부종, 고중성지방혈증, 고콜레스테롤혈증, 체중감소
 - (3) 신경계 : 두통, 어지럼, 착란, 무력증, 손발저림, 불안, 불면, 졸음
 - (4) 피부 및 부속기계 : 두드러기, 발진, 가려움증, 열골부종, 홍조
 - (5) 근골격계 : 관절통, 근육통
 - (6) 호흡기계 : 기침, 호흡곤란
 - (7) 기타 : 두근거림, 안압상승, 시각이상, 요로감염
- 일반적 주의
 - 1) 이 약으로 인해 약성종양의 증상이 완화되거나 진단이 지연될 수 있으므로 약성 종양이 의심되는 경고 증상(의도하지 않은 현저한 체중 감소, 재발성 구토, 삼킴곤란, 토혈, 흑색변 등)이 있으면서 위궤양이 있거나 의심되는 경우 약성이 아님을 확인하고 투여해야 한다.
 - 2) 치료시 결과를 충분히 관찰하고 증상에 따라 이 약을 최소용량 및 적절한 치료기간으로 투여하여야 한다. 이 약으로 장기간 치료할 경우(특히 1년 이상) 환자는 정기적으로 검사를 받아야 한다.
 - 3) 신장에 환자에게 용량조절이 필요치 않다. 이 약의 투여 중에는 혈액성과 간기능에 주의하고 정기적으로 혈액학적 검사 및 혈액생화학학적 검사를하는 것이 바람직하다. 또한 이상이 인정된 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
 - 4) 위궤양, 십이지장궤양, 문혈부궤양에 대해서는 정기적인 위경합형은 충분하지 않으므로 유지요법에 사용하는 하지 것이 바람직하다.
 - 5) 간질환군에서 프로톤펌프억제제 치료시 고간질성, 속독 및 척추의 골다공증과 연관된 골절의 위험성 증가와 관련이 있을 가능성이 있다고 보고되었다. 골절의 위험은 권장용량을 상회하는 고용량을 투여한 환자와 1년 이상의 장기사용 환자에

- 서 증가되었다.
- 3개월 이상 프로톤펌프억제제 치료를 받은 환자들에게서 저마그네슘혈증이 드물게 보고되었으며, 1년 이상 치료를 받은 경우에 가장 많이 나타났다. 대부분의 환자들에게 저마그네슘혈증의 치료로서 마그네슘보충 및 프로톤펌프억제제 투여 중단이 필요하다. 장기간 치료가 필요하거나 다국산 또는 저마그네슘혈증을 유발하는 약물(예, 이노제) 병용투여하는 환자들은 모든 시약을 포함한 주기적 마그네슘 수치 모니터링이 필요하다. 중대한 이상반응은 강직, 부정맥, 발작을 포함한다.
- 7) 프로톤펌프억제제로 인해 위내 산도가 감소하면 위장관에 보통 존재하는 세균의 수가 증가한다. 이 약으로 치료할 때 살모넬라, 캄필로박터, 클로스트리듐 디피실레와 같은 세균에 의한 위장관의 감염 위험이 약간 증가할수 있다. 이것은 클로스트리듐 디피실레성 설사 위험성 증가와 연관 있으며 특히 입원환자에서 이러한 위험성이 증가되었다는 여러 관찰연구 결과가 보고되었다. 이러한 진단은 설사증세가 개선되지 않았을 때 고려되어야 한다. 클로스트리듐 디피실레균성 설사는 거의 모든 항균제 사용 중 보고되고 있다.
- 8) 약리학적 특성과 발생한 이상반응을 근거로 하면, 이 약은 운전능이나 기계 조작 능력 등에 영향을 주지 않을 것으로 예상된다. 그러나 졸음으로 민첩성이 떨어질 수 있으므로, 운전이나 복잡한 기계 작동은 피하도록 한다.
- 9) 메토크레이트 : 프로톤펌프억제제와 메토크레이트(주로 고용량을 사용하는 경우, 메토크레이트의 사용상의 주의사항 참조)를 병용하는 경우 메토크레이트 그리고/또는 그 대사체의 혈청 농도가 상승 및 지속되어 메토크레이트의 독성이 나타날 수 있다는 문헌보고가 있었다. 고용량의 메토크레이트를 사용하는 경우, 프로톤펌프억제제의 일시적인 투여 중단을 고려할 수 있다(상호작용항 참조).
- 10) 헬리코박터피로리 박멸을 위한 항생제 병용요법으로 이 약과 같이 투여하는 항균제의 사용설명서를 참조해야 한다.
- 1) 이 약의 장기투여로 인해 저염산증 또는 무위산증에 의해 비타민 B12(시아노코발라민)흡수장애가 나타날 가능성이 있다.
- 2) 피부 및 전신홍반무루스 : 프로톤펌프억제제를 복용한 환자에서 피부홍반무루스(Cutaneous lupus erythematosus, CL)과 전신홍반무루스(Systemic lupus erythematosus, SLE)가 보고되었다. 이러한 사례들은 새로 발생하거나 기존의 자기면역질환의 악화로 발생하였다. 프로톤펌프억제제로 유발되는 홍반무루스 사례는 대부분 피부홍반무루스였다. 프로톤펌프억제제를 복용한 환자에서 보고된 피부홍반무루스의 가장 흔한 형태는 아급성피부홍반무루스이며, 영어발라 노인에 이르기까지 지속적인 약물 치료 후 수주에서 수년 이내에 발생하였다. 일반적이지 않았던 결과는 장기치입시 없는 상태로 관찰되었다. 프로톤펌프억제제를 복용한 환자에서 전신홍반무루스는 피부홍반무루스보다 덜 흔하게 보고되었다. 프로톤펌프억제제 관련 전신홍반무루스는 보통 비약물유발성전신홍반무루스보다 더 가벼운 증세를 보인다. 전신홍반무루스는 주로 젊은층의 성인부터 노인에 이르기까지 초기 약물 치료 후 수일에서 수년 이내에 발생한다. 대다수의 환자는 발진만 나타났으나, 관절통과 혈구감소증도 보고되었다. 의학적요법 없이도 몇 달 더 오랫동안 프로톤펌프억제제를 투여하지 않는다. 만약 이 약을 복용한 환자에서 피부홍반무루스 또는 전신홍반무루스와 일치하는 증상이나 징후가 나타나면 경우, 약물 복용을 중단하고 적절한 전문의에게 환자 평가를 의뢰한다. 대부분의 환자들은 4 ~ 12주 내로 프로톤펌프억제제 중단만을 통하여 개선되었다. 혈청학적 검사에, 항핵항체(Antinuclear antibody, ANA)에서 양성으로 나타날 수 있으며, 높은 혈청학적 검사결과와 임상 증상보다 해결되는데 시간이 더 소요될 수 있다.

5. 상호작용

- 다른 프로톤펌프억제제 계열 약물과 마찬가지로, 이 약은 간대사계인 CYP-450계를 통해 대사된다. 건강한 성인을 대상으로 실시한 시험에서 이 약은 아목시실린 또는 CYP-450계에 의해 대시되는 와르파린, 페니토인, 테오필린, 디아제팜과 같은 약물과 임상적으로 유의한 상호작용을 나타내지 않았더라도 PPI 계열 약물인 오메프라졸의 경우에는 페니토인의 대사, 배설을 지연시켰다는 보고가 있다.)
 - 이 약을 포함한 프로톤펌프억제제와 와르파린을 병용투여한 환자들에게서 INR과 프로트롬빈 시간이 증가하였다는 보고가 있었고, INR과 프로트롬빈 시간의 증가는 비정상적출혈과 심지어 사망까지 초래할 수 있다.
- 인체 간 마이크로솜과의 in vitro 시험에서 이 약은 CYP-450(CYP2C19와 CYP3A4)계 효소에 의해 대사되었다. 이러한 시험에서 인체 내 라베프라졸의 혈중농도는 CYP3A4를 저해하거나 유도하지 않았다. 인체 간 마이크로솜과의 in vitro 시험에서 이 약은 시클로스포린의 대사를 저해하였으며, 이때 IC50은 62μM이었으며, 이 농도는 건강한 자원자가 20mg씩 14일간 복용한 후 측정되는 최고 혈중농도의 60% 이상을 나타냈다. 이러한 저해의 정도는 같은 농도의 오메프라졸과 유사하다.
- 아타자나비르 - 건강한 자원자에 아타자나비르 300mg/피코타나비르 100mg과 오메프라졸(40mg 1회) 또는 아타자나비르 400mg과 란소프라졸(60mg 1회 1회)의 병용투여시 아타자나비르 노출도와 실질적으로 감소하였다. 아타자나비르 흡수는 pH 의존적이다. 이 약과의 병용투여는 연구되지 않았으나 기타 프로톤펌프억제제와 유사한 결과가 예상된다. 따라서 이 약을 포함한 프로톤펌프억제제를 아타자나비르와 동시에 투여해서는 안 된다.
- 이 약은 위산분비를 뛰어나게 또한 장기간 지속적으로 저해한다. 위산농도에 따라 흡수에 차이가 있는 약물과는 상호작용이 있을 수 있다. 이 약과 병용투여시 정상인에서 케토코나졸의 혈중농도는 약 30% 감소, 디곡신의 최저혈중농도는 22%가 증가하였다. 또한 이 약과 이트라코나졸, 페피디탐을 병용투여시 이들 약물의 혈청 농도가 저하될 우려가 있다. 따라서 이러한 약물과 이 약을 병용투여하여 용량조절이 필요일 경우, 환자별용 모니터링하여 결정하도록 한다.
- 임상시험에서 제산제와 이 약 병용시 제산제와의 상호작용을 확인하기 위해 실시된 시험에서 액체형 제산제와 상호작용이 관찰되지 않았다. 수산화알루미늄겔, 수산화마그네슘 함유 제산제와 이 약을 동시에 병용 투여한 경우와 제산제 투여 1시간 간 후에 복용한 경우 평균 혈중농도감소현적이 각각 8%, 6% 저하되었다는 보고가 있다.
- 저지방 식이를 섭취한 일본의 임상시험에서 음식과도 임상적으로 상관성이 있는 상

- 호작용이 없었다. 고지방 식이와 함께 이 약을 투여시 이 약의 흡수가 4시간 이상까지 지연될 수 있지만 흡수 정도(AUC)와 최고 혈중농도는 변화 없다.
- 항생제와의 병용 치료 : 16명의 건강한 자원자에게 이 약 20mg과 아목시실린 1,000mg, 클레리트로마isiin 500mg을 단독 혹은 병용 투여하고 교차 시험을 시행하였다. 클레리트로마isiin과 아목시실린의 AUC와 최고 혈중농도는 단독요법과 유사하였다. 라베프라졸의 AUC와 최고혈중농도는 각각 11%, 34% 증가하였으며 14-히드록시클레리트로마isiin클레리트로마isinin의 혈청 대사체의 AUC와 최고혈중농도는 단독 투여시의 값에 비해 각각 42%, 46% 증가되었다. 이 라베프라졸과 14-히드록시클레리트로마isinin 노출의 증가는 임상적으로 유의하지 않은 것으로 보인다.
- 이상반응 사례 보고, 집단약동학 연구(population pharmacokinetic studies) 및 후향적 연구 등에서 메토크레이트(주로 고용량을 사용하는 경우, 메토크레이트의 사용상의 주의사항 참조)와 프로톤펌프 억제제를 병용하는 경우 메토크레이트 그리고/또는 그 대사체인 히드록시메토크레이트의 혈청 농도가 상승 및 유지되어 메토크레이트의 독성이 나타날 수 있다고 보고되었다. 그러나 고용량의 메토크레이트와 프로톤펌프억제제에 대한 정식 약물상호작용연구는 수행되지 않았다.(일반적 주의항 참조)
- 9) 헬리코박터피로리 박멸을 위한 항생제병용요법 : 클레리트로마isiin 및/또는 에리트로마이신을 피오지드와 병용 투여시 세부정맥(OT농도, 삼실성 빈맥, 심실세동, Torsades de pointes포함)이 나타나고 이는 클레리트로마isiin 및 에리트로마이신에 의해 이들 약물의 간대사가 방해받을 것이 때문인 것으로 의국의 시판용 조사결과 보고되었으나 치명적인 사례도 보고되었다.
- 1) 이 약과 필피비린의 병합증상이 간질성 폐질환과 감소할 수 있으므로(위장 pH증가) 병용 투여해서는 안된다. 이는 필피비린의 치료효과를 저하시킬 수 있다.
- 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 1) 사람의 임신에서 이 약의 안전성에 대한 데이터는 없다. 이 약은 임신중에 금기이다(동물시험에서 임신 랫트의 기관형성기에 경구투여시(400mg/kg/day) 태자의 골화지연, 분만시 착상수, 생존주식수와 분만일의 감소, 출생자의 체중증가량 저하와 open-field test에서 시행착오와 구획이행수의 감소가 관찰되었으며, 분만전 - 후에 정맥투여시(30 mg/kg/day) 출생자의 갑상선의 지속적인 체중저하가 관찰되었다. 임신 토끼의 기관형성기에 정맥투여시(30mg/kg/day) 태자의 체중 저하, 골화지연이 관찰되었다.)
 - 2) 이 약이 사람의 모유로 이행되는지는 알려져 있지 않다. 수유부에서 어떠한 연구도 행해지지 않았다. 따라서 이 약을 수유중에 사용해서는 안 된다(동물시험에서 유즙중으로 분비되는 것이 보고되었고, 랫트의 분만전 - 후에 정맥투여(30mg/kg/day) 출생자시 체중저하가 관찰되었다.)
- 고령자에 대한 투여
 - 이 약은 주로 간장애에서 대시되지만 고령자는 간기능이 저하되어 있는 경우가 많고 이상반응이 나타날 수 있으므로 소화기성증상의 이상반응(이상반응항 참조)이 나타난 경우에는 유효하라는 등 신중히 투여한다.
- 소아에 대한 투여
 - 소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않다(사용경험이 없다.)
- 임상검사와의 영향
 - 간호소수치와 관련된어 드물게 발생한 경우를 제외하고 실험실 시험결과 수치에 특별한 비정상적인 결과는 없었다.
- 과량투여시의 조치
 - 환재자에는 고의로 과량투여한 경험은 없다. 과량투여에 대한 경향이 제한적이다. 확인된 최고 투여량은 60mg 1일 2회 혹은 160mg 1일 1회를 넘지 않는다. 일반적으로 영향은 경미하며 다른 의학적 처치 없이 가역적이다. 특별한 해독제에 대해 알려진 바 없다. 라베프라졸나트륨은 단백결합률이 아주 높아, 쉽게 투석되지 않는다. 과량투여한 경우 증상에 따른 치료를 실시하고, 전체적인 보조 요법을 실시하도록 한다.
- 적용상의 주의
 - 이 약을 씹거나 부수어 복용하지 않도록 하며, 정제를 한번에 삼켜 복용한다.
- 보관 및 취급상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.
- 기타
 - 1) 다른 프로톤펌프억제제 계열오메프라졸)에 대해외국에서 시력장애가 나타났다는 보고가 있다.
 - 2) 다른 프로톤펌프억제제 계열오메프라졸, 란소프라졸)에 대해 랫트 장기간 경구 투여한 독성시험에서 위에 카르티노이드가 발생했다는 보고가 있고 이 약에서는 Enteromorphalin-like세포(EC세포)의 과형성이 관찰되었다.
 - 3) 동물시험(랫트 경구투여 25mg/kg/이상)에서 갑상선종양 및 혈종티록신이 증가했다는 보고가 있으므로 사용시 갑상선기능에 주의할 것.
 - 4) 세균을 이용한 in vitro 복귀 돌연변이감시시험에 약한 유전자변이 유발물질로 판명되었다.
 - 5) 동물시험에서 항원성을 나타내는 것으로 보고되었다.
 - 6) 동물시험 자료에서 라베프라졸나트륨의 LD50는 단회경구 투여시 마우스에서 1,000mg/kg, 랫트에서 1,300mg/kg 이었다. 라베프라졸나트륨의 치사량은 단회 경구투여시(개에서) 2,000mg/kg[사망 권장용량(대, 20mg/day)의 약 2,500 ~ 5,000배], 단회 정맥투여시 마우스에서 200mg/kg, 랫트에서 150mg/kg 이었다. 마우스에서 100mg/kg, 랫트에서 300mg/kg, 개에서 25mg/kg 씩의 초회 경구용량 7~7배 이하의 혈청 농도는 사람에서의 피크 혈청 농도(Cmax = 427ng/mL)의 8 ~ 37배 이었다.

- **저장방법** : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관
- **사용기간** : 제조일로부터 36개월
- **포장단위** : 28정/PTP

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과 하였거나 유통과 정 중 변질, 변태 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다. 제품에 관한 문의는 전화7070-4346~1213으로 하시기 바랍니다.

※ 본 의약품을 복용(사용)하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서는 의약품과 함께 보관하여 주십시오.

※ 본 의약품에 대한 기타 정보는 식품의약품안전처 온라인약도서관(http://drug.mfds.go.kr)의 '의약품검색' 에서 확인할 수 있습니다.

※ 약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관하여야 합니다.

개정연월일 : 2017년 07월 27일

- **제조사 : 대원제약(주)** 경기도 화성시 함남읍 제약공단1길 24
- **제조의폐자 : (주)넥스팜코리아**

총복 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 168-41