

일반의약품

구내염(입안염) 치료제



- 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오.
- 의약품을 사용하기 전에 본 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 의약품과 함께 보관하십시오.
- 사용기간이 지난 의약품을 사용하지 마십시오.

다케다

알보칠[®]

콘센트레이트 액
(폴리크레졸렌)

이 제품은 구내염(입안염)에 치료효과를 갖고 있습니다. 구강(입안)내 점막이나 병소(아픈부위)에 사용시 병변(병에 의한 물의 변화)조작은 하얗게 변하고 탈락되어 손상된 조직의 재생에 도움을 줍니다.

원료약품 및 분량

- 이 약 1g 중
- 유효성분: 폴리크레졸렌액50%(별규)-----720mg
(폴리크레졸렌으로서 360mg)
 - 기타 첨가제: 정제수

성상

적갈색의 투명한 외용액제

효능 · 효과

1. 질 세균 감염
2. 구내염(입안염) 및 치육염(잇몸염)

용법 · 용량

1. 질 세균 감염 : 용액을 적신 거즈를 질 안에 넣고 가벼운 압력으로 해당부위를 1 ~ 3분간 누른다. 3 ~ 4일 간격으로 두 번 사용하고, 증상이 사라지지 않으면 의사와 상담한다.
2. 구내염(입안염) 및 치육염(잇몸염) : 이 약을 적신 면봉 등을 이용해 여러번 반복하여 발라준다.

사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것
이 약 성분에 과민반응 환자
2. 이 약을 사용하는 동안 다음의 약을 사용하지 말 것
 - 1) 이 약은 다른 외용제와 병용(함께 사용)하여 사용하지 않는다.
 - 2) 이 약은 콘돔, 질내 피임용 격막과 같은 라텍스 또는 고무제품을 약화시킬 수 있으므로 주의할 것
3. 이 약을 사용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것
 - 1) 월경 중에는 사용하지 않는다.
 - 2) 치료기간 중 성교를 하거나 자극적인 비누로 세척하지 않는다.
 - 3) 이 약의 사용을 잇는 경우에는 용량을 보충하지 않고 그대로 다음 용량을 적용한다.
4. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것
 - 1) 임부 : 동물실험에서 태자에 대한 위험성은 나타나지 않았으나 사람에 대해 태아독성 및 기형발생을 유발하는지 여부에 대한 실험은 아직 실시되지 않았다. 이 약을 임신 중, 특히 임신이 진행된 경우에 자궁경부에 직접 적용하면 통증을 유발할 수 있으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에게는 치료상의 유익성 이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 사용하고, 자궁 경부나 그 주위에 직접 적용 시에는 적절한 보호 및 통제 하에서 사용한다.
 - 2) 수유부 : 이 약이 모유 중으로 이행되는지의 여부는 알려지지 않았으나, 수유부에는 신중히 투여한다.
5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 치료 초기에 국소적인 자극 및 알레르기반응이 나타날 수 있다.
 - 2) 강한 산성으로 인해 치아의 법랑질에 손상을 줄 수 있다.
6. 기타 이 약의 사용 시 주의할 사항
 - 1) 과량투여시의 조치
 - (1) 증상 : 이 약을 마신 경우 식도가 손상될 수 있다.
 - (2) 처치 : 응급처치로 기도를 확보하면서 위세척을 하거나 위내용물을 제거하며 즉시 전문의의 진료를 받는다.
 - 2) 이 약은 국소적으로만 사용한다.
 - 3) 이 약은 강한 산성을 띠고 있으므로 눈에 들어가지 않도록 주의하고, 눈에 들어갔을 경우에는 즉시 깨끗한 물로 씻어낸 후, 의사 또는 약사와 상의한다.
 - 4) 이 약을 구강(입안)점막이나 잇몸에 적용한 후에는 철저히게 입안을 행군다.
7. 저장상의 주의사항
 - 1) 이 약의 적용 시 쓰이는 기구 등은 사용한 직후 소독할 때까지 물(경우에 따라 1 ~ 2 % 탄산수소나트륨을 첨가)을 담은 용기에 보관한다.
 - 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
 - 3) 이 약은 차광하여 보존한다.
 - 4) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것

사용법



① 면봉에 찍는다.



② 구내염(입안염)에 바르십시오.

알보칠을
면봉에 찍어
사용하세요.

포장단위

5mL/병, 100mL/병

저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

알림

이 약 적용시 죽은 세포 혹은 손상된 세포를 탈락시키는 현상으로 적용부위가 하얗게 변할 수 있습니다. 이 약의 의류, 천류 등에 닿으면 손상을 줄수 있으므로 반드시 질환부위에만 면봉을 찍어서 바르십시오.

교환방법

구입시 사용기한이 지났거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 의약품은 구입한 약국 및 의약품 판매업자를 통해 교환 또는 환불 받을 수 있습니다.

최신정보 확인 방법 및 부작용 보고

- * 본 설명서 개정일 이후의 최신허가사항은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)을 참고하시기 바랍니다.
- * 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(1644-6223)에 알리거나 한국다케다제약(02-3484-0800)으로 연락 바랍니다.
- * 부작용 발생 시, 한국의약품안전관리원(1644-6223)에 피해구제를 신청할 수 있습니다.

※ 개정연월일 : 2019년 10월 7일

[원산지] 독일

[제조사]



Takeda GmbH

[본사] Byk-Gulden-Str.2 D-78467 Konstanz, Germany
[공정소재지] Robert-Bosch-Str. 8, 78224 Singen, Germany

[수입자]



한국다케다제약(주) 서울특별시 강남구 테헤란로98길 8, 9층, 12층 (대치동)

제품문의 080-553-3300

REP-ALB-19-3