

일반의약품
분류번호 222

뮤코레스® 캡슐200밀리그램

(아세트시스테인)

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐(345mg) 중

아세트시스테인(USP) 200mg

첨가제(동물유래) : 유당수화물(소, 우유)

【성상】 흰색 분말이 든 상부 흰색, 하부 흰색의 경질캡슐

【효능·효과】

1. 주효능 효과

- 1) 다음 질환에서의 객담배출곤란 : 급·만성기관지염, 기관지확장증, 천식성기관지염, 기관지천식, 세기관지염, 낭성성유증
- 2) 인·후두염, 부비강염, 삼출성 및 장막성중이염

【용법·용량】

아세트시스테인으로서 다음 용량을 식전에 소량의 물과 함께 경구투여한다.

1. 급성질환

- 성인 : 1회 200mg 1일 3회
- 소아 : 6~14세 1회 200mg 1일 2회

2. 만성질환

- 성인 : 1회 200mg 1일 2회
- 소아 : 6~14세 1회 100mg 1일 3회

3. 낭성성유증

- 소아 : 6세 이상 1회 200mg 1일 3회, 2~5세 1회 100mg 1일 4회
- 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약에 과민증 환자
- 2) 위·십이지장궤양 환자
- 3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

신생아 (중증 질환이 아닌 경우 신생아에게 투여하지 않는다.)

3. 부작용

- 1) 소화기계 : 드물게 구역, 구토, 구내염, 가슴쓰림, 설사 등이 나타날 수 있다.
- 2) 과민증 : 드물게 두드러기, 가려움, 발진, 두통, 이명, 기관지경련(특히 천식 환자) 등이 나타날 수 있다.

3) 드물게 빈맥, 고혈압이 나타날 수 있다.

4) 국내 자발적 유해사례 보고자료(1989~2013 상반기)를 분석한 결과, 유해사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 유해사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 유해사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 유해사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.

• 호흡곤란

4. 상호작용

경구용 항생물질(아목시실린, 세푸록심, 독시사이클린, 에리스로마이신, 치암페니콜)과 병용투여시 항생물질의 약효를 감소시킬 수 있다(적어도 2시간의 간격을 두고 투여한다).

5. 임부에 대한 투여

임부에 대한 적절한 연구가 없으므로 반드시 필요한 경우에만 투여한다.

6. 수유부에 대한 투여

이 약이 모유로 분비되는지 알려지지 않았으나 많은 약물이 모유로 분비되므로 수유부에 투여할 경우에는 신중히 투여한다.

7. 적응상의 주의

이 약의 용액에 다른 약물의 첨가는 피해야 한다.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 24개월

【포장단위】 자사포장단위

※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 반드시 의사·약사와 상담 후 사용하십시오.

※ 본 제품에 관련된 문의는 소비자상담전화 : 02)2182-0400으로 연락하시기 바랍니다.

※ 만약 구입시 사용(유효)기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되었거나 손상된 제품인 경우 복용(사용)하지 마시고 구입처에서 교환하시기 바랍니다.

※ 본 첨부문서의 변경된 최신내용은 당사 소비자상담실 또는 식품의약품안전처 온라인의약 도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

의약품은 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

151005-R(0)

설명서 작성년월일 2015년 10월 05일



제조의회사 :



주비씨월드제약

서울시 강남구 개포로22길 78 경빌딩
공정: 경기도 여주시 가남읍 여주남로 872-23
소비자상담실: 02)2182-0400
www.bcwp.co.kr

제조사 :

(주)유영제약

충청북도 진천군 광혜원면 용소2길 33