

새로모아 캡슐

일반의약품

SEROMOA CAP.

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐(394mg) 중

■ 유효성분 :

악용효모(히스티딘 1.0 mg, 류신 3.0 mg, 리신 3.1 mg)(별규)	100 mg
케라틴(히스티딘 0.22 mg, 류신 1.88 mg, 리신 1.0 mg)(별규)	20 mg
티아민질산염(KP)	60 mg
판토텐산칼슘(KP)	60 mg
L-시스틴(KP)	20 mg
p-아미노벤조산(USP)	20 mg

■ 첨가제(타르색소) : 상부 녹색, 하부 미황색 경질캡슐(황색5호, 황색203호, 청색1호, 적색40호)

■ 기타첨가제 : 스테아르산마그네슘, 콜로이드성이산화규소, 크로스포비돈

[성상] 연회색 가루의 내용물이 든 상부 녹색, 하부 미황색의 불투명한 경질캡슐

[효능·효과]

1. 손상된 모발, 감염성이 아닌 손톱의 발육 부진
2. 탈모의 보조치료

[용법·용량]

성인 : 1회 1캡슐을 1일 3회 식후에 복용한다.
12세 이상 소아 : 1회 1캡슐을 1일 1 ~ 2회 식후에 복용한다.
12세 미만은 복용하지 않는다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응 사람
 - 2) 12세 미만 소아
2. 다음과 같은 사람은 복용 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
 - 2) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여할 것.
3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 위통, 구토 등 위장관(창자) 불쾌감과 발한(땀이 남), 빈맥(빠른맥), 가려움, 두드러기, 두통, 어지럼, 홍조(붉어짐)
 - 2) 두부 이외의 신체부위에서 발모현상이 나타나는 경우
 - 3) 정해진 용법·용량대로 3~4개월 사용 후에도 증상의 개선이 보이지 않을 경우
 - 4) 증상이 지속되거나 기대하는 효과가 나타나지 않는 경우
4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 1) 설폰아미드 제제와 동시 복용 시 주의할 것.
 - 2) 홍터로 인한 탈모나 안드로젠 유전성 탈모증, 남성형 대머리에는 사용하지 말 것.

- 3) 이 약은 당뇨병환자에 복용할 수도 있다.
- 4) 평균 치료 기간은 3~6개월이다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 사용기한이 초과된 것은 복용하지 말 것.
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

[저장방법] 차광기밀용기, 25℃ 이하 보관

[사용(유효)기간] 제조일로부터 36개월

[포장단위] 180캡슐(90캡슐(10캡슐/PTP×9)×2)

[제조의뢰자]

 (주)아리제약

충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 3
충북테크노파크 생명기업관 B02호, B15호, B17-1호, B17-2호,
103호, 203호, 206호, 207호, 215호, 216호, 217호, 313호, 314호, 315호

[제조사]

 우리들제약 (주)

경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50

[판매자]

 BORYUNG
Consumer

서울특별시 종로구 창경궁로 136, 보령빌딩

- ♣ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 본 제품을 구입시 유효기한 또는 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손되었을 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환해 드립니다.
- ♣ 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)의 의약품 정보를 참조하십시오.
- ♣ 이 설명서의 개정일자 2020년 09월 03일 이후 변경된 내용은 소비자 상담실(02-843-1500)에서 확인할 수 있습니다.
- ♣ 사용(유효)기한이 경과한 제품은 복용하지 마십시오.
- ♣ 본 제품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야하며, 첨부문서는 본 제품과 함께 보관하십시오.
- ♣ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국 의약품안전관리원(1644-6223)

의사나 약사의 지시에 따라 사용하십시오.

MOA 2020.09.03-09