

미애타민® 주 (푸르셀티아민염산염)

[원료약품 및 그 분량] : 이 약 1mL 중

주 성 분 : 푸르셀티아민염산염(KP) 5.46mg
(푸르셀티아민 으로서 5mg)

포도당, 주사용수

[성상] : 이약은 무색의 무취와 약간의 고미를 가진 액체로서 갈색의 앰플에 충전된 투명한 액체의 주사제

[효능·효과]

1. 비타민B₁ 결핍증의 예방 및 치료
2. 비타민B₁의 수요가 증대하여 음식으로부터 섭취가 불충분한 때의 보급(소모성 질환, 갑상샘기능항진증, 임부, 수유부, 격렬한 육체 노동시 등)
3. 베르니케뇌병증(Wernicke encephalopathy)
4. 각기심장 장애
5. 다음 질환에 의한 비타민B₁의 결핍 또는 대사 장애가 관여한다고 추정되는 경우 1) 신경통 2) 근육통, 관절통 3) 말초 신경염, 말초 신경 마비 4) 심근 대사 장애 5) 변비 등의 위장 운동 기능 장애 6) 수술 후 장관 마비 비타민B₁의 결핍 또는 대사 장애가 관여한다고 추정되는 경우에 대하여 효과가 없는데 1개월가량 목적 없이 사용해서는 안된다

[용법·용량] : 푸르셀티아민으로서 보통 성인 1일 5~100 mg을 피하, 근육내 또는 정맥내 주사한다.
증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의 주의사항]

1. 경고
앰플주사제는 용기 절단시 유리파편이 혼입되어, 이상반응이 나타날 수 있으므로 사용 시 유리파편의 혼입이 최소화 될 수 있도록 신중하게 절단 사용하되, 특히 소아, 고령자 사용 시에는 특히 주의한다.
2. 다음 환자에는 투여하지 말 것
이 약 또는 이 약의 구성성분에 대해 과민반응의 병력이 있는 환자
3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
약물 과민반응의 병력이 있는 환자
4. 이상반응
1) 중대한 이상반응 : 드물게 쇼크를 일으키는 일이 있기 때문에 관찰을 충분히 하고 혈압저하, 가슴내통증, 호흡곤란 등의 증상이 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
2) 그 외의 이상반응 : (1) 과민반응 : 드물게 발진 등의 과민반응이 나타나는 일이 있으므로 증상이 나타날 때에는 투여를 중지한다. (2) 소화기계 : 드물게 구역, 구토, 설염, 때때로 설사 (3) 기타 : 때때로 두통, 빈뇨
5. 적응상의 주의
1) 정맥내 주사에 의해 혈관통증을 일으키는 일이 있기 때문에 주사 속도는 가능한 한 천천히 주사한다.
2) 주사액 사용시의 일반적인 주의로서, 세균등에 의한 오염을 피하기 위해 일부 사용후의 잔액은 사용하지 않는다.
3) 앰플 컷 : 이 약은 원포인트 컷 앰플을 사용하고 있으므로, 앰플 머리 부분의 마크를 위로 해 반대측(아래쪽 방향)에 가볍게 힘을 더해 컷을 한다. 덧붙여 앰플을 자를 때 이물 혼입을 피하기 위해, 윗부분 주위를 에탄올면 등으로 닦아서 깨끗이 한다.
6. 보관 및 취급상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.

[저장방법] : 차광밀봉용기, 실온(1~30℃)에서 보관

[제조원]

삼진제약(주) - 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 52(제조의뢰자)
(주)휴온스 - 충청북도 제천시 바이오밸리로 100(제조사)

- ※ 의사·약사의 지시에 따라 사용하십시오.
※ 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되었거나 손상된 의약품은 약국 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다.
※ 2015년 9월 22일 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.samjinpharm.co.kr)나 소비자상담실(수신자부담 전화 080-082-1234)을 통해 알 수 있습니다.



판매원
삼진제약주식회사

본 사 : 서울특별시 마포구 와우산로 121 (서교동)
공 정 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 52
☎ : 본사(02)3140-0700, 공장(031) 353-1712/6