

# 목 아플 때 한번에!

## 포리비돈

### 인후스프레이

#### 포비돈요오드

일반의약품  
분류번호:231

【원료약품 및 그 분량】 100mL 중

포비돈요오드(KP) ..... 0.45g  
(유효요오드로서 0.045g)

【성 상】 약간의 점성이 있는 옅은 갈색의 액체

【효능·효과】

구강(입안)내 살균소독, 인두염, 후두염, 구내염(입안염), 발치(이를 뽑음)후 및 구내(입안)수술후 살균소독, 구취(입냄새)중

【용법·용량】

1일 수회(여러 차례) 적당량을 분사도포한다(분사하여 바른다).

#### ■ 제품 사용방법

1. 누액방지용 보호캡(반투명)을 앞으로 당겨서 분리합니다.
2. 분사구가 목속 질환부위를 향하게 하고 용기의 뒷부분을 눌러 2~3회 분사합니다.
3. 사용 후에는 누액방지용 보호캡(반투명)을 끼우고 세워서 보관합니다.



#### 【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 요오드 과민증 환자
- 2) 감작성기능 이상환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 입안이 심하게 험은 환자
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부
- 3) 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 부작용

- 1) 과민증 : 발진 등의 과민증상이 나타나는 경우에는 사용을 중단한다.
- 2) 구강(입안) : 때때로 구강(입안), 인두의 자극감, 드물게 구강(입안)점막미란(직무름), 입안의 혈음 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 3) 소화기계 : 때때로 구역 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 4) 기타 : 드물게 불쾌감이 나타날 수 있으며, 소독용으로 이 약을 과량 사용시 요오드 독성이 있다.

4. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 지킨다.

2) 소아에 사용할 때에는 보호자의 지도, 감독하에 사용한다.

3) 구강(입안)용오로만 사용한다.

4) 발치(이를 뽑음)후 등 구강(입안) 창상(상처)의 경우 혈액이 응고하여 출혈이 멎기 전에는 격렬한 양치를 피한다.

5) 드물게 속(아나필락시스)이 일어날 수 있으므로 사용 후 갑자기 가려움, 부종(부기), 가슴쓰림 등과 동시에 안색창백, 수축냉감(손발이 찬느낌), 식은 땀, 숨가쁨 등의 중증(심한 증상)의 증상이 나타나는 경우에는 즉시 의사의 진료를 받는다.

#### 5. 적응상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 의복 등에 묻은 경우 바로 세척하면 물로 쉽게 씻겨진다.
- 3) 직사광선을 피하여 보존한다.
- 4) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 50mL

※ 본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 지났거나 변질,변패,오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.

※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용(복용)하지 마십시오.

※ 이 약을 사용(복용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.

※ 자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(<http://www.taiguk.co.kr>) 또는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.

※ 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

☎ 소비자상담전화 : 080-300-8282

첨부문서 작성 연월일 : 2016. 09. 07

제조사  
**태극제약(주)**  
경기도 화성시 향남읍 제암공단3길 123