

세티레인^{캡슐} 200mg

(아세틸시스테인)

CTL 2015.11.03-00

조제용
일반의약품
분류번호: 222

세티레인^{캡슐} 200mg

(아세틸시스테인)

세티레인캡슐은 점액용해성 거담제로 점액용해, 점액분비량증가 및 점액섬모계 운동횟수 촉진과 체내 기도 청정화반응을 촉진시켜 호흡기 기능을 신속히 정상화하여, 만성적인 호흡기질환의 악화를 막아주는 우수한 제제입니다.

【원료약품의 분량】 1캡슐 중

아세틸시스테인(KP) 200mg
첨가제(타르색소): 적색 3호, 청색 1호
동물유래성분 : 유당수화물(소, 우유)

【성상】 흰색의 분말이 충전된 상, 하부 연청색의 경질캡슐제

【효능·효과】

- 주효능 효과
1) 다음 질환에서의 객담배출곤란 : 급·만성기관지염, 기관지확장증, 천식성기관지염, 기관지천식, 세기관지염, 낭성섬유증
2) 인·후두염, 부비강염, 삼출성 및 장액성중이염

【용법·용량】

아세틸시스테인으로서 다음 용량을 식전에 소량의 물과 함께 경구투여한다.

- 급성질환
· 성인 : 1회 200mg 1일 3회
· 소아 : 6-14세 1회 200mg 1일 2회
- 만성질환
· 성인 : 1회 200mg 1일 2회
· 소아 : 6-14세 1회 100mg 1일 3회
- 낭성섬유증
· 소아 : 6세 이상 1회 200mg 1일 3회, 2-5세 1회 100mg 1일 4회
· 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
1) 이 약에 과민증 환자
2) 위·십이지장궤양 환자

- 3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 신생아 (중증 질환이 아닌 경우 신생아에게 투여하지 않는다.)
3. 부작용
- 1) 소화기계 : 드물게 구역, 구토, 구내염, 가슴쓰림, 설사 등이 나타날 수 있다.
 - 2) 과민증 : 드물게 두드러기, 가려움, 발진, 두통, 이명, 기관지경련(특히 천식 환자) 등이 나타날 수 있다.
 - 3) 드물게 빈맥, 고혈압이 나타날 수 있다.
 - 4) 국내 자발적 유해사례 보고자료(1989~2013 상반기)를 분석한 결과, 유해사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 유해사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 유해사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 유해사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
 - 호흡곤란
4. 상호작용
 경구용 항생물질(아목사실린, 세푸록심, 독시사이클린, 에리스로마이신, 치페니콜)과 병용투여시 항생물질의 약효를 감소시킬 수 있다(적어도 2시간의 간격을 두고 투여한다).
5. 임부에 대한 투여
 임부에 대한 적절한 연구가 없으므로 반드시 필요한 경우에만 투여한다.
6. 수유부에 대한 투여
 이 약이 모유로 분비되는지 알려지지 않았으나 많은 약물이 모유로 분비되므로 수유부에 투여할 경우에는 신중히 투여한다.
7. 적응상의 주의
 이 약의 용액에 다른 약물의 첨가는 피해야 한다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

【포장단위】 자사포장단위

【제조의뢰자】 조아제약(주) (경상남도 함안군 함안면 광정로 318)

- ◆ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 본 제품을 구입시 유효기한 또는 사용기한이 경과 되었거나 변질·변패 또는 오소되었을 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환해 드립니다.
- ◆ 이 설명서의 개정일자 2015년 11월 03일 이후 변경된 내용은 본사 홈페이지(www.wooridulpharm.com)또는 소비자상담실(080-080-4211)에서 확인할 수 있습니다.
- ◆ 온라인의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) 의약품 정보를 참조하십시오.

의사나 약사의 지시에 따라 사용하십시오.
 CTL 2015.11.03-00

제조 · 판매자
우리들제약 (주)

www.wooridulpharm.com

본사 · 공장 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50
 (소비자상담실) 080-080-4211