

일반의약품 정보(계속됨)

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

[사용기한] 포장재 측면 표기일까지

[참가제] ▶ 참가제(타르색소): 적색3호, 황색1호, 황색5호 ▶ 참가제(동물 유래성분): 유당수화물(소의 유유) ▶ 기타 참가제: 스테아르산마그네슘, 캡슐, 클로이드산인화구소

※ 부작용 보고 및 피해 구제 신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223)


[일반의약품] 분류번호: 114

인후통·목감기·기침·목마름·제반염증

[은교산] 생약성분의 항염증제

인후렉신

캡슐



10캡슐

경남제약(주)

[성상] 각색의 분말이 충전된 상부 추형색 불투명, 하부 미황색 불투명의 경질캡슐제 [제조자] 경병신약(주) 인천광역시 남동구 남동대로 394 [제조의뢰자] 경남제약(주) 충청남도 아산시 신창면 서부남로790번길 49
※ 올바른 사용방법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사 및 자사 소비자 상담실로 문의하시기 바랍니다.
소비자 상담전화: 080-232-6600, www.kyungnampharm.com ※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회고시 "소비자분쟁해결기준"에 의거 구입한 곳에서 교환 또는 환불 받을 수 있습니다. ※ 기타 자세한 약품 정보는 약품통합정보시스템 <http://meduc.mds.go.kr>, [작성일월일: 2020.01.29]



일반의약품 정보

이 약을 사용하기 전 반드시 아래의 정보를 확인하세요

[유효성분] 1캡슐 중 금은화(KP) 710mg, 연교(KP) 710mg, 두시(생구) 356mg, 우방자(KP) 356mg, 박해(KP) 426mg, 길경자(KP) 426mg, 감조(KP) 426mg, 담죽염(생구) 284mg, 향개(KP) 284mg, 양양자(생구) 22mg 이상 건조엑스로서 500mg ※ 동물유래성분: 영양각(영양인분)

[효능·효과] 감기로 인한 목구멍 통증, 목마름, 기침, 두통

[용법·용량] 보통 성인 1회 2캡슐, 7~14세 1캡슐을 1일 3회 식전 또는 식간에 식사와 함께(식사후) 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지말 것 1) 5세미만의 영·장·아기 2) 유아(2)이 약은 유당(젖당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(gucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것 1) 고혈압 환자 2) 심장병 또는 신장·배설장 장애 환자 3) 부종(부기) 환자 4) 몸이 허약한 환자(체력이 쇠약해진 환자, 몸이 약한 환자) 5) 위장이 약한 환자 6) 지금까지 약에 의해 발진·발적증상등이 나타났던 가려움 등을 일으킨 적이 있는 환자 7) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여받고 있는 환자) 8) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 9) 고령자(노인)(일반적으로 고령자도 있는 생리기능이 저하되어 있으므로 감별증인하는 등 주의할 것) 10) 이 약은 황색 4호타르진(타르)을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기

병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다. 11) 이 약은 황색5호(설페릴로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것 상습적 기능제한 이첨부문서를 소지할 것 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타날 경우 (1) 위알도스테론증: 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등 (1일 최대 복용량이 감소로서 1g이상인 제제는 3시간 계속하여 복용할 경우 자발적 혈중, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고인) 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰할항상몸체의 증상을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것 (2) 근병증(근육병증): 자발적발증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것 (3) 피부: 발진·발적증상등이 나타났던 가려움 등 (4) 소화기: 식욕부진, 위부불쾌감 구역 등 2) 수일간 복용 하더라도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항 1) 장해진 용법·용량을 잘 지킬 것 2) 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것 3) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 복용시킬 것 4) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크리산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리아클로메타이드)와 병용할 경우 위알도스테론증이나 자발적발증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로 신중히 복용할 것 5) 다른 한약제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 생약의 중복에 주의할 것

5. 저장상의 주의사항 1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것 (사용 후 반드시 밀폐 보관할 것) 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것 3) 약물을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기(예: 보관함)에 보관하는 것은 약품 오염을 초래할 수 있으므로 주의할 것 4) 약품의 유효기간이 지난 후라도 유효기간이 지난 후라도 보관할 것