

메가세클러캡슐

[세파클루르하물]

※ 이 약을 사용하기 전에 반드시 첨부문서를 주의 깊게 읽어야하며, 첨부문서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

메가세클러캡슐

[세파클루르하물]

【원료명 및 그 분량】 1캡슐(370mg) 중
• 유효성분: 세파클루르하물(KP(세파클루르(약기)로서 250mg) 250.0 mg
• 첨가제(테트라소스): 적색 3호, 청색 1호
• 첨가제(동물유래성분): 유당수화물(소, 우유)
• 기타 첨가제: 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 캡슐

【성상】 연한 노란색의 분말이 충전된 상부 캡슐뚜껑, 하부 캡슐 불투명 경질캡슐체
【효능·효과】
○ 유류균증
페티엔세균, 인플루엔자균, 포도구균, 스트렙토кокус 피오제네스그람-A-배타영
형성), 대장균, 프로테우스 미라빌리스, 클레브시엘라, 임균
○ 적응증
- 중이염
- 폐렴, 인후두염, 편도염, 기관지염
- 신우염, 방광염, 임균성 요도염
- 부신피염, 응충, 모낭염, 연조직염, 감염성 죽종, 파하농양, 생인소, 창상감염

【용법·용량】
○ 성인: 세파클루르하물로서 1회 250mg(약가)을 8시간마다 경구 투여한다. 중증감염
증(폐렴 등)과 감수성이 낮은 감염증의 경우 2배로 증량 투여할 수 있다. 급성 임균
성 요도염의 경우 이 약 3g과 프로베네시드 1g을 단회 병용 투여한다.
○ 소아: 1일 체중 Kg당 20mg(약가)를 8시간마다 분할 투여한다. 중증감염증, 중이염
및 감수성이 낮은 감염의 경우에는 1일 체중 Kg당 40mg(약가)를 투여할 수 있으며
최대용량은 1일 1g(약가)이다.
○ 신기능: 손상 환자: 용량 변화 없이 투여할 수 있다.
배타영형성 연쇄구균감염의 치료는 적어도 10일간 투여해야 한다.

【사용상의 주의사항】
1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
1) 이 약에 의하여 속의 병력이 있는 환자
2) 이 약 또는 세팔로스포린계 항생물질을 과민반응의 병력이 있는 환자
3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토스 불내성(galactose intolerance),
Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토스
흡수장애(glucose-galactose maldabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자애
게는 투여하면 안 된다.
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
1) 페니실린계 항생물질을 과민반응의 병력이 있는 환자
2) 과민 또는 부모양체가 기관지천식, 발진, 두드러기 등의 알레르기 증상을 일으키
기 쉬운 체질인 환자
3) 중증의 신장애 환자

4) 경구성치가 불량한 환자 또는 비경구영양 환자, 고령자, 전신상태가 나쁜 환자(비타민 K 결핍증상이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰한다.)
5) 위장관질환의 병력이 있는 환자(특히 대장염)
3. 이상반응
1) 속: 드물게 속을 일일 수 있으므로 충분히 관찰하고 증상이 나타나는 경우에는
투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
2) 과민반응: 아나필락시사양 증상(전신홍조, 부종, 호흡곤란, 맥박부종, 감각이상, 실
신 고혈압, 혈관확장), 발진, 두드러기, 홍반, 가려움, 발열, 림프절 종창, 관절통,
혈청병양 반응(발진, 다형홍반, 관절염, 관절염, 발열은 수반되거나 수반되지 않
음.) 등이 나타날 수 있으며 이러한 증상, 징후들은 투여를 시작한 후 며칠 이내
에 나타나서, 투여 종료 후 며칠 이내에 소실된다. 혈소판 감소 및 코르티코이드
는 회복을 도와준다.
3) 피부: 스티븐스-존슨증후군, 독성표피괴사증후군이 나타날 수 있으므로 충분히 관
찰하고 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
4) 혈액계: 때때로 무과립구증, 과립구 감소 또한 드물게 백혈구 감소, 빈혈, 혈소판
감소, 호산구 증가, 혈소구 증가, 백혈구 감소, 재생불량성빈혈, 중혈성 빈혈, 가
역적 호중구 감소 등이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하여 이상이 인정되는 경
우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
5) 간장: 드물게 일시적인 간염, 황달, 때때로 AST, ALT, ALP의 상승이 나타날 수
있으므로 충분히 관찰하고 이상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.
6) 신장: 기역적 간질성 신염, 드물게 BUN 상승, 혈청크레아티닌 상승, 급성 신부
전 등의 중증의 신장애가 나타날 수 있으므로 정기적으로 검사를 실시하는 등 충
통히 관찰하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
몇몇 세팔로스포린계 항생물질은 특히 신장애 환자에게 용량을 감량하지 않고
투여 시 발작이 야기될 수 있다. 발작이 약물치료와 관계이 있다면 약물치료를
중단해야 하고 임상적으로 필요할 경우 항경련제를 투여한다.
7) 소화기계: 드물게 위장장애 등의 현을 수반하는 중증의 대장염이 나타날
수 있다. 복통, 빈번한 설사가 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하는 등 적절
한 처치를 한다. 또한 때때로 구역, 구토, 설사, 복통, 위부불쾌감, 가슴쓰림, 식욕
부진 등이 나타날 수 있다.
8) 호흡기계: 다른 세균계 항생물질 투여 시 드물게 발열, 기침, 호흡곤란, 흉부 X선
이상, 호산구 증가 등을 수반하는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
9) 면역계: 드물게 구내염, 칸디다증이나 나타날 수 있다.
11) 비단립관염증: 드물게 비타민 K 결핍증상(저프로트롬빈혈증, 출혈경향 등) 비타
민 B12 결핍증상(설염, 구내염, 설염 등) 나타날 수 있다.
12) 기타: 드물게 두통, 생식기 가려움, 질염, 질 모비라자증 등이 나타날 수 있다.

전문의학품

품목기초코드:

201507396

13) 서방정의 임상시험결과 추가된 이상반응은 다음과 같다.
불효의 상처, 식욕부진, 불안, 관절염, 천식, 기관지염, 홍통, 오한, 율형성상부전,
결막염, 변비, 어지러움, 월경통, 소화불량, 배뇨곤란, 귀의 통증, 부종, 발열, 복
부팽만감, 위염, 감염, 불면증, 질분비물, 발진, 관대, 월경불순, 근육통, 구역, 구
토, 목의 통증, 신장질환, 아노증, 중이염, 통증, 심계항진, 호흡곤란, 부비동염, 졸
음, 땀, 떨림, 두드러기
4. 일반적 주의
1) 이 약의 사용에 있어서 내성균의 발현을 방지하기 위하여 감수성을 확인하고 치
료 상 필요한 최소 기간만 투여하는 것이 바람직하다.
2) 속 등의 반응을 예측하기 위해 충분히 문진한다.
3) 다른 항생물질들처럼 이 약에 내성인 미생물들에 의한 중복 감염이 발현할 가능
성을 고려해야 하고, 이러한 경우에는 적절한 치료법을 선택해야 한다.
5. 상호작용
1) 프로베네시드와 병용투여 시 이 약의 세뇌분 배설 속도가 감소되어 혈중농도를
지속 시킬 수 있다.
2) 마그네슘 히드록사이드 또는 알루미늄 트리하이드라이토를 포함한 제산제를 항생
물질 투여의 1시간 내에 복용하면 이 약의 흡수가 감소된다. H2 억제제는 이 약
의 흡수 속도 및 흡수량에 영향을 미치지 않는다(사별정에 한함).
3) 신독성이 있는 항생물질 또는 이노제무로세미드, 에타크리산제를 병용투여 시 신
장애가 증가될 수 있으므로 신중히 투여한다.
4) INR(국제정상화비율)의 변화: 이 약을 포함한 항생물질을 항응고제와 동시에 투
여 받은 환자에서 항응고 활성의 증가가 보고되었다. 감염성질환(그리고 영중성
과정을 동반한), 환자의 연령과 일반적인 상태는 위험요소가 된다. 비록 이 약과
외파린의 상호작용이 임상시험을 통해 밝혀지지 않았지만 INR 모니터링을 실시
하여 하고, 필요한 경우 경우를 항응고제의 용량을 적절히 조절한다. 항생물질
의 일부 종류들, 특히 플루로퀴놀론, 마크로라이드, 사이클린, 코르티코스테로이드
및부 세팔로스포린의 경우는 더 심하다.
5) 경구 피임약과 병용투여 시 피임의 효과가 감소시킬 수 있으므로 다른 피임법을
추가로 사용하는 것이 바람직하다.
6) 전균성 항생물질(클로트리메졸, 에리스로마이신, 테트라사이클린 등)과 병용투여
시 이 약의 살균작용을 감소시킬 수 있다.
6. 임부 및 수유부에 대한 투여
1) 임신 중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있
는 가기능이 있는 여성에는 치료 상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는
경우에만 투여한다.
2) 모유로의 소량 이행이 보고되어 있으므로 수유부에는 신중히 투여한다. 500mg
단일 용량 투여 후 세파클루르의 소량이 모유에서 발견되었다. 혈중 평균 농도는 2,
3.5시간 후 각각 0.10, 0.20, 0.10mg/L이었으며 1시간 후에는 극미량이 되었다.
수유에 대한 이 약물의 영향은 알려지지 않았으므로 수유부는 주의하여 이 약을
사용해야 한다.
7. 소아에 대한 투여
1) 3개월 이하의 신생아에 대한 유효성 및 안전성은 확립되어 있지 않다(캡슐제, 건
조시럽제에 한함).
2) 소아에서 효능과 내약성이 확립되지 않았다(사별정에 한함).
8. 고령자에 대한 투여
고령자에 투여할 때는 다음과 같은 점에 유의하고, 용량 및 투여간격에 유의하는 등
환자의 상태를 관찰하여 신중히 투여하고 적절한 처치를 한다.
1) 살처기능이 저하되어 있는 경우가 많고 이상반응이 발현하기 쉽다.
2) 비타민 K 결핍에 의한 출혈을 일으키기도 한다.
9. 임상징상제에 대한 영향
1) 테스타데로 반응을 제외한 베네딕트사양, 펠리사양, 클리니테스트에 의한 요당검
사에서 위양성이 나타날 수 있으므로 주의한다.
2) 간질 결심사양 양상이 나타날 수 있으므로 주의한다.
10. 과립투여 시 차(사별정에 한함).
1) 증상: 구역, 구토, 상복부 불쾌감 및 설사가 나타날 수 있으며 상복부 불쾌감과
설사의 정도는 용량과 관련이 있다. 정상용량의 5배가 되어 되었을 때는 위양관
세척, 약용탄 투여가 필요하며, 이때 기도를 보호해야 한다. 다른 증상들은 이미
존재해 있는 질환, 알레르기 반응 또는 다른 독소의 영향 때문일 것이다.
2) 처치: 과립투여의 치료 시 여러 약물의 과립투여, 약물상호작용 및 비경구적인
약물동력학 등의 고려되어야 한다. 환자에서 호흡이 가능하도록 적절한 기도를
확보하고 환자의 신체증상, 혈중소산, 혈청내 전해질 등을 모니터링 해야 한다.
위양관으로의 약물 흡수는 약용탄을 투여함으로써 감소되는데 많은 경우에서 구
토나 위세척이 치료 효과적이 증명되었으므로 위양세척에 추가하여 투여는 위양
세척을 대신하여 약용탄 사용을 고려해야 한다. 약용탄의 반복 사용은 흡수될 일

부 약물의 재제를 항진시킬 수 있다. 위양관 세척 또는 약용탄을 사용할 경우 기
도를 보호해야 한다. 기체 배뇨, 복막염 또는 알레 관류의 유익성이 확립되지
않았다.
11. 약약품동등성시험 정보
가. 시험약 보령세파클루르캡슐(세파클루르하물)(보령제약주)과 대조약 시클러캡
슐250밀리그램(세파클루르하물)(대용제약주)을 2x2 교차시험으로 각 1캡슐씩
건강한 성인에게 공복 시 단회 경구 투여하여 28명의 혈청 세파클루르를 측정한
결과, 비교평가항목치AUC_{0-24hr}, C_{max}를 로그 변환하여 통계 처리하였을 때, 평균치
치의 90%신뢰구간이 log 0.8에서 log 1.25 이내로서 생물학적으로 동등함을 입
증하였다.

구분	비교평가항목		참고평가항목	
	AUC _{0-24hr} (μg · hr/mL)	C _{max} (μg/mL)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (h)
대조약	8.812 ±1.516	7.275 ±1.702	0.75 (0.50 ~1.50)	0.86 ±0.18
시험약	8.687 ±1.182	7.003 ±1.596	0.75 (0.50 ~1.00)	0.80 ±0.19
90% 신뢰구간* (기준: log 0.8 ~ log 1.25)				
	log 0.959 ~1.022	log 0.872 ~1.062	-	-

(AUC, C_{max}, t_{1/2}: 평균값±표준편차, T_{max}: 중앙값(범위) n=28)
AUC: 투약시간부터 최종혈중농도 측정시간 1까지의 혈중농도-시간곡선하면적
C_{max}: 최고혈중농도
T_{max}: 최고혈중농도 도달시간
t_{1/2}: 말단 소설 반감기
* 비교평가항목치율 로그변환한 평균치 치의 90%신뢰구간

※ 이 약은 보령제약(주) 보령세파클루르캡슐(세파클루르하물)과 동일한 원료를 사용
하여 동일한 제조방법으로 전정공정을 보령제약(주)에 위탁 제조하였음.

12. 기타
이 약은 세포벽의 필수적인 특정 단백질과 결합하여 세포벽 합성을 저해함으로써
살균작용을 한다.

【저장방법】 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 30 캡슐/병, 300 캡슐/병

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【제조회자】 (주)엘엔씨바이오 경기도 안성시 공단2로 104 가동 1층

【제조자】 보령제약(주) 경기도 안성시 단원로 농농로 107, 109

※ 만약 구입 당시 사용(유효)기간이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오염되거나 손상된
제품은 구입처를 통하여 교환하여 주시기 바랍니다. 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래
위원회 고지 소비자문해해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
※ 본 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(www.incbio.co.kr) 또는
소비자상담실까지 확인할 수 있습니다.
※ 약약품 용어 설명 및 기타 자세한 약약품정보는 식품의약품안전처 약약품통계정보
시스템(https://medrug.mfds.go.kr)를 참조하시기 바랍니다.
※ 본 약제 투약 후 부작용(이상반응)이 발생하면, 경우 한국의약품안전관리원(1644-
6223)으로 문의 및 보고하여 주시기 바랍니다.
※ 사용(유효)기간 경과한 제품은 사용하지 마시기 바랍니다.

【첨부문서 작성일자】 2021년 11월 25일

Life and Creativity

L&C BIO

경기도 안성시 공단로 104 가동 1층

Tel.02-541-8577

http://www.incbio.co.kr

20210125/00