

치질로 인한 출혈 · 가려움 · 통증에

프레스탑[®] 연고

【원료약품 및 그 분량】 1g 중

리도카인(KP)	30mg
페닐레프린염산염(USP)	2.5mg
클로르헥시딘염산염(KP)	5mg
알란토인(USP)	10mg
레티놀팔미테이트유(KP)	1.2mg
(비타민A로서 1200IU)	
토코페롤아세테이트(KP)	30mg
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸(KP)	1mg
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산프로필(KP)	1mg

【성상】 미황색(연노랑) 내지 황색의 연고제

【효능 · 효과】

치열 · 치핵의 아픔 · 가려움 · 부종(부기) · 출혈의 일시적 완화 및 소독

【용법 · 용량】

만 15세 이상 : 1일 3회의 범위 내에서 환부(질변 부위)에 직접 바르거나, 직장내에 주입해서 사용한다. 주입해서 사용할 경우, 주입기를 튜브에 끼우고 직장내에 삽입한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것.

1) 심장질환, 고혈압, 갑상선질환, 당뇨병, 전립샘비대증으로 인한 배뇨(소변을 뚫)곤란 환자

2. 이 약을 사용하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 말 것.

1) dl-메틸에페드린염산염, 스키폴리아 엑스 및 글리시리진산 함유 좌제 또는 연고제, 크림제
2) 혈압강화제, 항우울약

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
3) 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고, 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약 사용에 의해 충혈되어 붉어짐, 부종(부기), 자극감 등의 증상이 나타날 경우
- 2) 이 약 사용에 의해 알레르기 증상(발진, 충혈되어 붉어짐, 가려움 등)이 나타날 경우
- 3) 7일 정도 사용하더라도 증상의 개선이 나타나지 않을 경우
- 4) 출혈이 있는 경우

5. 기타 이 약의 사용시 주의사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
- 2) 어린이에게는 사용하지 말 것.
- 3) 이 약은 항문부위에만 사용하고 안과용으로는 사용하지 말 것.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것.
- 3) 오염(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 30g

- ※ 본 의약품은 우수외약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용(유효)기한이 지났거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용(복용)하지 마십시오.
- ※ 이 약을 사용(복용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.
- ※ 자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(<http://www.taiguk.co.kr>) 또는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.
- ※ 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)
- ☎ 소비자상담전화 : 080-300-8282

첨부문서 작성 연월일 : 2016. 11. 28

제조 · 판매자
태극제약(주)
충청남도 부여군 초촌면 금백로 821