



전 문 의 약 품
분류번호 232

위비스디 정

【원료약품의 분량】 이 약 1정 중,
 라니티딘염산염(라니티딘으로서 150mg) (USP) 168mg
 비스무트시트르산염칼륨(산화비스무트로서 81mg, 칼륨으로서 24mg) (KP) 200mg
 수크랄페이트수화물(지방옥타황산에스테르로서 204mg) (USP) 600mg
 첨가제 타르색소 : 황색203호, 청색2호, 청색1호

【성 상】 연두색의 장방형 필름코팅정제

【효능·효과】

위궤양, 위염, 십이지장궤양, Zollinger-Ellison 증후군, 역류성식도염, 마취전 투약(멘델슨 증후군 예방), 수술후 궤양 비스테로이드성 소염진통제(NSAID)로 인한 위·십이지장궤양

【용법·용량】

- 성인
 보통 식사와 무관하게 1회 1정을 1일 2회 오전 및 취침전에 복용합니다.
 1) 위궤양 및 십이지장 궤양 : 1회 1정을 1일 2회 투여하거나 1회 2정을 1일 1회 취침전에투여합니다. 특히 십이지장궤양환자에 대해서 1회 2정 1일 2회 오전 및 취침전에 투여하면 보다 높은 치료율을 얻을 수 있습니다. 비스테로이드성 소염진통제 투여로 인한 궤양 또는 비스테로이드성 소염 진통제 장기 투여시위·십이지장궤양발생을 예방하기 위한 병용요법에 있어서도 용량은 같습니다. 보통은 4주 이내 비스테로이드성 소염진통제 투여로 인한 질환은 보통 8주 이내에 치유되나 간혹 환자에 따라 치유기간이 연장될 수도 있습니다. 이 약의 단기요법으로 효과가 우수하였던 재발성 궤양환자들에 대해서는 유지요법으로 1회 1정을 1일 1회 취침전에 투여합니다.
 2) 역류성식도염 : 8주동안 1회 1정, 1일 2회 투여하거나 1회 2정을 1일 1회 취침전에 투여합니다. 단 중증역류성식도염환자에 대해서는 1회 2정을 1일 4회로 증량할 수 있습니다.
 3) Zollinger-Ellison증후군 : 초기용량으로서 1회 1정을 1일 3회로 치료를 시작하며 필요에 따라 증량할 수 있습니다. 중증질환의 경우 의사의 지시에 따라 1일 라니티딘으로서 6g까지 부여할 수 있습니다.
 4) 소화성 궤양 급성 스트레스성 궤양 및 급성 위점막병변의 상부소화관 출혈 : 경구 투여가 가능해지면 주사에서 경구투여로 전환하여 1회 1정을 1일 2회 투여합니다.
 5) 마취유도 2시간전에 1회 1정을 투여합니다. 이 경우 수술전야에도 1회 1정을 투여하면 더욱 좋습니다.
- 소아
 소아에 대한 임상연구는 확립되어 있지 않으나 8-18세의 소아의 경우 1회 1정(라니티딘으로서 2mg/kg)을 1일 2회까지 복용할 수 있습니다.
- 신장해환자분
 크레아티닌청소율이 50ml/min이하인 심한 신장해환자분의 경우 1회 1정을 1일 1회 취침전에 복용합니다. 이는 환자의 상태에 따라 달라질 수 있으며 혈액투석이 약물의 혈중농도를 감소시키므로 혈액투석 직후 투약계획을 재조정합니다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자분에는 투여하지 마십시오.
 1) 투석요법을 받고 있는 환자분
 2) 염산 라니티딘에 대해 과민증의 기왕력이 있는 환자분
- 다음의 환자분의 경우에는 신중이 투여하십시오.
 1) 신장해가 있는 환자분 (혈중농도가 지속되므로 투여량을 감소하거나 투여간격을 두고 사용)
 2) 간장해가 있는 환자분
 3) 약물과민증의 경력이 있는 환자분
 4) 고령자
- 부작용
 1) 속 : 드물게 속이 나타날 수 있으므로 이 약을 투여중인 환자는 주의깊게 관찰하고 만약 이러한 증상이 나타난 경우 투약을 중지하고 적절한 조치를 하여야 합니다.
 2) 과민증 : 드물게 피부발진, 담마진, 혈관신경부종, 발열, 기관지경련, 저혈압 등의 과민증이 나타날 수 있습니다. 이러한 증상이 나타난 경우에는 투

여를 중지합니다.

- 3) 혈액 : 드물게 가역적인 백혈구 감소, 혈소판 감소가 나타날 수 있고 혈청 효소치 상승(혈청 크레아티닌, 혈청 트랜스아미나제)이 나타날 수 있습니다. 드물게 무과립구증, 범혈구감소증이 보고되었고 범혈구감소증이 나타난 환자에게 가끔 골수형성부전, 재생불량성 빈혈이 함께 보고되었습니다. 때때로 호산구증다가 나타날 수 있습니다.
- 4) 간장 : 일시적이고 가역적인 S-GOT · S-GPT · r-GPT · ALP의 상승이 나타날 수 있고 때로 가역적인 황달성 또는 비황달성 간염 등 간기능장애가 나타날 수 있습니다.
- 5) 순환기계 : 드물게 빈맥, 서맥, 방실차단, 조기심실수축과 같은 부정맥이 보고되었습니다.
- 6) 소화기계 : 때로 구역, 구토, 변비, 설사, 복부팽만감, 복통, 드물게 식욕부진의 증상이 나타날 수 있습니다. 대변색이 변색 또는 검은색으로 되나 이는 창자에서 비스마스살파이드 형성에 기인되는 것으로 별도로 치료할 필요가 없습니다.
- 7) 정신신경계 : 드물게 현운, 졸음, 드물게 가역성의 착란상태, 경련, 흥분, 우울, 환각, 불면, 두통, 두중감, 병감 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 드물게 조절변화로 추정되는 가역성 시력불선명이 보고 된 바 있습니다.
- 8) 내분비계 : 여성형유방, 음위 및 성행동 장애가 보고된 바 있으나 이 약의 복용과 이러한 장애들 간의 인과관계는 확립되지 않았습니다.
- 9) 근골격계 : 드물게 관절통이 보고된바 있습니다.
- 10) 피부 : 드물게 경미한 다형홍반을 포함하는 발진, 탈모가 보고된 바 있습니다.
- 11) 기타 : 때로 피부소양감, 설염이 나타날 수 있습니다. 간혹 허가 검게 되기도 하나 저절로 정상화됩니다.

4. 일반적 주의사항

- 1) 장기연용을 하지 않습니다.
- 2) 신장병의 병력이 있는 환자는 복용전에 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 3) 치료시에 있어서는 경과를 충분히 관찰하고 증상이 심화하여 치료상의 최소량을 사용하도록 하고 이 약의 효과가 없는 경우에는 타 약제로 교체합니다.

5. 임부 수유부의 투여

- 1) 임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신 가능성이 있는 부인에게는 치료상의 유약성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여하십시오.
- 2) 모유중으로 이행하므로 투약중 수유하지 않도록 주의해야 합니다.

6. 소아 투여

소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않습니다.(사용경험이 적습니다.)

7. 임상검사치에 대한 영향

시험방법에 의한 요단백검사에서 위양성이 나타날 수 있으므로 설포살리실산법으로 실험하는 것이 바람직합니다.

8. 과량투여

외국에서 1일 6g(라니티딘으로써)까지 과량투여 보고가 있었으나 특히 중대한 영향은 나타나지 않았습니다. 이러한 경우에는 최토, 위세척을 행함과 동시에 적절한 치료를 합니다. 필요하면 혈액투석에 의하여 제거해도 좋습니다.

9. 기타

- 1) 위암의 증상을 은폐할 수 있으므로 악성이 아닌 것을 확인한 후에 투여하십시오.
- 2) 동물의 흡수 배설시험에서 안구멜라닌과 친화성이 있다는 보고가 있으므로 장기투여시 안과적 검사를 행하는 등 주의하여 투여하십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관하십시오.

【사용기한】 외부 포장에 표시된 사용기한 내에 사용하십시오.

【포장단위】 30정, 300정

【제조의뢰·판매자】 한올바이오파마(주)

【제조사】 (주)대웅제약 경기도 성남시 중원구 갈매치로 244 / 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-14

- 위비스디정을 Acetylcysteine성분 제품과 함께 조제 시 변색의 우려가 있으므로 분리된 포장으로 조제하시기 바랍니다.
- 본 의약품은 KGMP업소에서 제조되어 엄격한 품질 관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 파손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- 최신 허가 변경 사항은 자사의 홈페이지(<http://www.hanall.co.kr>)에서 확인하여 주시기 바랍니다.
- 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약품서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하시기 바랍니다.

WBS2-I-0
15-11-30

**HANALL**
BIOPHARMA

한올바이오파마 | 주

대전광역시 대덕구 상서당1길 43
고객지원팀 : 1644-5515 www.hanall.co.kr