

미옥트® 주 (티옥트산)

[원료약품 및 그 분량]

이 약 1mL 중
주성분 : 티옥트산(KP) 5.0mg
안정(화)제 : 우레아 1.0mg
탄산수소나트륨, 염산, 주사용수

[성상]

연한 노란색의 투명한 액이 갈색앰플에 든 주사제

[효능 · 효과]

티옥트산의 수요가 증대되는 경우의 보급(격심한 육체노동시), Leigh증후군(아급성괴사성뇌척수염), 중독성(스트렙토마이신, 가나마이신에 의한) 및 소음성(직업성)의 내이성 난청

1개월 정도의 투여로도 효과가 나타나지 않을 경우에는 지속적으로 사용하지 않는다.

[용법 · 용량]

티옥트산으로서 통상 성인 1일 1회 10~25mg을 정맥내 주사한다.
단, 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의 주의사항]

- 경고**
앰플주사제는 용기 절단시 유리파편이 혼입되어, 부작용을 초래할 수 있으므로 사용시 유리파편 혼입이 최소화 될 수 있도록 신중하게 절단 사용하되, 특히 어린이, 노약자 사용시에는 각별히 주의할 것.
- 이상반응**
이 약은 사용성적조사 등 이상반응 발현빈도에 대한 명확한 조사가 실시된 바 없다.
1) 소화기 : 식욕부진, 오심, 설사
2) 기타 : 발진, 두통, 어지러움, 심계항진
- 고령자에 대한 투여**
일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로, 감량하는 등 주의한다.
- 적용상의 주의**
이 약을 정맥내 주사시 주사속도는 가능한 천천히 주사한다.

[저장방법] : 차광밀봉용기, 실온(1~30℃)에서 보관

[제조회사] : 삼진제약(주) – 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 52(제조의뢰자) (주휴온스 – 충청북도 제천시 바이오밸리로 100(제조사))

- ※ 의사 · 약사의 지시에 따라 사용하십시오.
※ 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질 · 변패 · 오염되었거나 손상된 의약품은 약국 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다.
※ 2015년 11월 04일 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.samjinpharm.co.kr)나 소비자상담실(수신자부담 전화 080-082-1234)을 통해 알 수 있습니다.