

대상포진·생식기포진 치료제
팜시비르정 250mg
(팜시클로비르)



【원료약품 및 병형】 1정 중
팜시클로비르(염기) 250.0mg
동등유리성분: 유당수화물(소, 우유)

【성상】
흰색의 장방형 필름코팅형

【효능·효과】
1. 대상포진 바이러스 감염증
2. 생식기포진 감염증의 치료 및 재발성 생식기포진의 억제

- 【용법·용량】
1. 대상포진 감염증의 치료
성인: 팜시클로비르로서 1회 250 mg 씩 1일 3회 7일간 경구투여한다.
감염 후 증상이 나타나는 즉시 치료를 시작하는 것이 바람직하다.
2. 초발성 생식기포진 감염증의 치료
성인: 이 약으로서 1회 250 mg씩 1일 3회 5일간 경구투여한다. 감염 후
증상이 나타나는 즉시 치료를 시작하는 것이 바람직하다.
3. 급성 재발성 생식기포진 감염증의 치료
성인: 이 약으로서 1회 125 mg씩 1일 2회 5일간 경구투여한다. 전구시
기 또는 감염 후 증상이 나타나는 즉시 치료를 시작하는 것이 바람직하다.
4. 재발성 생식기포진의 억제
성인: 이 약으로서 1회 250 mg씩 1일 2회 경구투여한다. 질병자연경과
의 변화여부를 관찰하기 위해 6~12개월마다 주기적으로 치료를 중단한다.
5. 신장에 환자: 신장에 환자에서는 이 약의 크레아티닌 청소율이 감소하기
때문에 용량조절에 신중을 기해야 하며 이들에 대한 용법용량은 아래와 같다.

1) 대상포진 및 초발성 생식기포진 감염증의 치료:

크레아티닌 청소율(mL/min/1.73m^2)	용량
30~59	1회 250 mg 씩 1일 2회
10~29	1회 250 mg 씩 1일 1회

2) 급성 재발성 생식기포진 감염증의 치료:

크레아티닌 청소율(mL/min/1.73m^2)	용량
30~59	1회 125 mg 씩 1일 2회
10~29	1회 125 mg 씩 1일 1회

전문의약품
분류번호: 629

- 3) 재발성 생식기포진 감염증의 억제:
- | 크레아티닌 청소율(mL/min/1.73m^2) | 용량 |
|--------------------------------------|-------------------|
| 30~59 | 1회 250 mg 씩 1일 2회 |
| 10~29 | 1회 125 mg 씩 1일 2회 |
- 4) 협정크레아티닌만 알고 있을 경우에는 다음 계산식으로 크레아티닌 청소율을 구할 수 있다.
남자: $(\text{체중}(\text{kg}) \times (140 - \text{나이})) / (72 \times \text{협정크레아티닌}(\text{mg/dL}))$
여자: $0.85 \times \text{남자}$ 에 대해 구해진 값
- 5) 혈액투석을 실시하는 신장에 환자
혈액투석 환자는 투석간격을 고려하여 48시간마다 투여하는 것이 바람직하다. 4시간 동안의 혈액투석은 이 약의 혈장 농도를 약 75 % 감소시키므로 투석 후 즉시 이 약을 투여한다. 권장용량은 대상포진 환자에는 250 mg, 생식기포진 환자에는 125 mg이다.
- 6) 간장애 환자: 만성 대상성 간질환 환자의 경우에는 별도의 용량조절이 필요치 않다. 명백한 만성 비대대상성간질환 환자에 대해서는 충분한 치료 경험에 없으므로, 명확한 권장용량이 설정되어 있지 않다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 이 약 또는 이 약의 구성성분 및 이 약의 생리활성물질인 팜시클로비르에 과민반응의 병력이 있는 환자
 - 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.(유당 함유 제제에 한함)
- 다음 환자에서는 신중히 투여할 것.
 - 신장에 환자
- 이상반응
 - 임상시험에서 두통 및 구역이 보고된 바 있으나 대개 경증 내지 중등도였고, 이와 같은 증상은 위약으로 치료받은 환자에게서도 유사한 빈도로 나타났다. 다른 모든 이상반응은 시험 후 경험에서 추가되었다. 빈도는 매우 흔함 ($\geq 1/10$); 흔함 ($\geq 1/100$, $1/10$); 흔하지 않음 ($\geq 1/1,000$, $1/100$); 드물게 ($\geq 1/10,000$, $1/1,000$) 매우 드물게 ($1/10,000$); 미상(자료로부터 추정 불가로 표시하였다).
 - 혈액 및 림프계: 드물게 혈소판감소증이 나타났다. 임상시험에서는 이 약 투여군에서 위약군보다 백혈구 및 호중구 감소가 더 자주 나타났다.

- 정신신경계: 매우 흔하게 두통, 흔하게 어지러움, 흔하지 않게 착각 및 돌음(특히 고정자에서 많이 나타남), 드물게 환각이 나타났다.
- 심장계: 드물게 심계항진
- 소화기계: 흔하게 구역, 구토, 복통 및 설사가 나타났다.
- 간담도계: 흔하게 간기능 검사 이상, 드물게 황달이 나타났다.
- 피부 및 피하조직: 흔하게 피부발진 및 가려움이 나타났다, 흔하지 않게 두드러기 및 혈관부종(예, 얼굴부종, 눈가물부종, 눈주위부종, 입두드러기)이 나타났다. 중증 피부부종(예, 다형홍반, 스티븐스-존슨 증후군, 증상표피괴사증후군) 및 백혈구과성혈관염이 나타났는데 자발보고 및 문헌에서 수집된 정보이기 때문에 그 빈도는 미상이다.
- 신장: 신기능을 고려하여 적절히 이 약의 용량을 감소시키지 않은 신질환 환자에서 드물게 급성신부전이 보고되었다.
- 국내 시판후 조사 결과(조증례수: 4,304명) 나타난 이상반응은 다음과 같으며, 이 약과의 관련 여부는 확실하지 않다.: 상복부통, 변비, 간기능 이상, 설사, 복부팽만감, 소화불량, 안면부종, 피로, 통증, 백혈구 감소증, 불면, 생리기간 단축, 배고고만
- 일반적 주의
 - 이 약은 생식기포진을 완전히 치료할 수 없으며, 이 약 치료가 시작된 이후라도 생식기포진의 증상이 있을 때는 성적 접촉을 피할 것을 환자에게 조언해야 한다. 또한 전염의 가능성이 있기 때문에 이 약의 치료와 더불어 안전한 성관계를 갖기 것이 권장된다. 재발의 첫 증상이나 증후가 보이면 바로 치료를 시작하도록 교육한다.
 - 이 약이 운전 또는 기계조작 능력에 영향을 미친다는 증거는 없다. 그러나 이 약을 복용하는 동안 어지러움, 졸음, 혼돈 및 기타 중추신경계 장애를 경험한 환자들은 운전이나 기계조작을 삼가해야 한다.
 - 경미 내지 중증증의 간장애 환자는 신기능이 손상되면 특별한 용량조절 필요치 않다. 중증의 간장애 환자를 대상으로 연구된 바 없지만, 이러한 환자에서 팜시클로비르가 생리활성물질인 팜시클로비르로 전환되지 않아 혈장 팜시클로비르 농도가 낮아서 약효가 감소될 가능성이 있다.
- 상호작용
 - 전임상시험에서 이 약은 시토크롬 P450을 유도하거나 CYP3A4를 억제할 가능성은 없는 것으로 나타났다.
 - 이 약에 다른 약물의 영향
 - 알로푸리놀, 시메티딘, 테오필린, 지도부딘, 프로메타진, 제산제(마그네슘 및 수산화알루미늄) 투여 후, 혹은 엘트리타이빈과 동시에 이 약 500mg을 단회 투여 시 생리활성물질인 팜시클로비르의 약동학에 임상적으로 유의한 변화가 나타나지 않았다.
 - 이 약 다회투여(1회 500 mg, 1일 3회) 후 다국산성을 다회 투여했을 때 팜시클로비르의 약동학에 임상적으로 유의한 변화가 관찰되지 않았다.
 - 농축성 신세뇨관 분비에 의해 주로 배출되는 약물들(예: 프로메타진) 혈장 팜시클로비르 농도를 상승시킬 수 있다. 따라서 이 약에 의해 500 mg, 1일 3회 복용하는 환자가 프로메타진과 더불어 연속적으로 병용할 시에는 독성이 나타나지 시 모니터링 하라. 이 약의 용량 감소를 고려할 수 있다.
 - 팜시클로비르는 알데하이드산화효소에 의해 대사이므로, 이 효소를 유도/억제하거나 이 효소의 대사를 받는 다른 약과 상호작용을 일으킬 가능성이 있다. In vitro 알데하이드산화효소저해제인 시메티딘 및 프로메타진과의 임상적 상호작용을 알아보는 시험에서 병용투여가 생리활성물질인 팜시클로비르 형성에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다. 강력한 in vitro 알데하이드산화효소저해제인 라복시펜은 팜시클로비르 형성을 감소시킬 수 있는 것으로 나타났다 때문에 이 약을 라복시펜과 병용시 치료 효과를 모니터링 하라.
 - 다른 약물에 대한 이 약의 영향
 - 이 약 500 mg 단회 또는 다회투여(1회 500 mg, 1일 3회)를 다국산과 병용했을 때 다국산의 약동학은 변하지 않았다.
 - 이 약 500 mg 단회투여를 지도부딘 또는 엘트리타이빈과 병용했을 때 지도부딘, 지도부딘의 대사체인 지도부딘글루쿠로니드 및 엘트리타이빈의 약동학에 임상적으로 유의한 영향이 관찰되지 않았다.
 - 이 약은 In vitro에서 알데하이드산화효소를 약하게 저해하는 것으로 나타났다.
- 임부, 수유부 및 기임여성에 대한 투여

- 동물실험에서 이 약 및 생리활성물질인 팜시클로비르에 의해 태자독성이나 기형발생이 나타나지는 않았다. 동물실험에서는 고환의 병리조직학적 변화가 관찰되었으나, 사람에서는 이 약을 1회 250 mg, 1일 2회 정기간 투여했을 때 남성의 정자수, 정자 형태, 운동능 등에 유의적인 영향을 미치지 않았다. 500 mg/kg을 투여한 수컷 랫드에서 생식능의 감소가 관찰되었고, 암컷 랫드의 생식능에는 의미있는 변화가 나타나지 않았다.
- 임신 중 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로, 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에게는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
- 수유부: 랫드를 이용한 동물실험에서 이 약의 경우 투여 후 팜시클로비르가 유즙으로 이행되는 것으로 나타났으나, 사람 모유로의 이행에 대한 정보는 알려지지 않았다. 수유부에게는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
- 기임여성: 기임여성에 대한 자료는 없으며 특별한 추천사항은 없다.
- 소아에 대한 투여
 - 18세 미만의 소아에 대한 안전성 및 유효성은 확립되어 있지 않으므로 투여하지 않는 것이 바람직하다.
- 고령자에 대한 투여
 - 일반적으로 고령자에게서 용량 조절은 요구되지 않으나 신장장애에 있는 경우 용량 조절이 필요치 않다.
- 광량투여시의 처리
 - 이 약을 과량투여한 경험은 제한적이다. 과량투여 시 적절한 보조적 치료 및 대증적 치료를 실시한다. 혈액투석을 실시 할 수 있으며, 이 약의 생리활성물질인 팜시클로비르는 4시간의 혈액투석으로 혈중농도가 75 %까지 감소될 수 있다.
- 보관 및 취급상의 주의사항
 - 30°C 이하의 건조도에 보관한다.
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고의 원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 주의한다.
- 기타
 - 임상적 용량의 약 50배를 투여한 암컷 랫드 고장량 투여군(600 mg/kg/day)에서 유산율의 발생빈도가 증가하였다. 어떤 랫드를 대상으로 태어난 후 4일 제부터 10주 동안 매일 팜시클로비르 0, 40, 125 또는 400 mg/kg/day를 투여했을 때, 태아와 관련된 사망 또는 임상적 관찰은 없었다. 상측 동물에 비해 어린 랫드에서 팜시클로비르의 독성이 증가되지는 않았다.

【저장방법】 기밀용기, 건조보관(30°C이하)

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 21정

제조회사의: (주)셀트리온제약 / 충청북도 청주시 청원구 오창읍 2신당로 82
제 조 자: (주)셀트콤코리아 / 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 189-41

* 본 약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약, 구입 시 사용기한 또는 유효기간이 경과되었거나 변질, 변태, 오염, 손상된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. (소비자상담실: 080-850-3611(~2) 수신자부담)
* 이 제품 설명서 작성일자 (하단에 표시) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.celltrionph.com), 온라인약사상담(<http://dr.mids.go.kr>) 또는 문의전화(02-2216-3611(내선3)에서 확인하실 수 있습니다.

작성일자 T-2015.11.11
관리번호 FCV1-H(0)

