

마그스 연질캡슐

MAGEUS Soft Caps.

일반의약품 분류번호:319

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

- 유효성분 : 산화마그네슘(KP)250 mg
(마그네슘으로서 150 mg)
토코페롤아세테이트(KP) 60 mg
(비타민 E로서 60 IU)
피리독신염산염(KP).....30 mg
티아민질산염(KP)..... 30 mg
니코틴산아미드(KP)..... 5 mg
- 기타 첨가제 : 농글리세린, 락색소, 레시틴, 산화티탄, 숙신산젤라틴, 콩기름, 폴리소르베이트80, 황납

【효능 및 효과】

1. 마그네슘결핍으로 인한 근육경련
2. 다음경우의 비타민 B₁, B₆, E의 보급
 - 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하시, 노년기
 - 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 비타민 E(토코페롤아세테이트)
말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨·목결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)
 - 비타민 B₁(티아민질산염)
다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨결림 등), 각기, 눈의피로
 - 비타민 B₆(피리독신염산염)
다음 증상의 완화 : 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

【용법 및 용량】

만 12세 이상 어린이 및 성인 : 1일 2회, 1회 1캡슐 또는 1일 1회, 1회 2캡슐 복용

【성상】 흰색의 내용물이 들어있는 적색의 장방형 연질캡슐

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 2) 만 12개월 미만의 젖먹이
 - 3) 심한 증상의 신부전 환자
 - 4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 인산염, 갈슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
 - 2) 레보도파
3. 다음 환자에는 신중이 투여할 것.
 - 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 체장증 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중이 투여해야 하는 환자
4. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와상의할 것.
 - 1) 만 1세 미만의 젖먹이
 - 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아

- 4) 심장·순환기계기능 장애 환자
 - 5) 신장장애 환자
 - 6) 저단백혈증 환자
 - 7) 임부
5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 묽은 변, 식욕부진, 복부팽만감, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하
 - 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
 - 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘) 성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있다.
 - 4) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적 변화)이 나타날 수 있다.
 - 5) 고혈당 투여에 의해 소화성 장애를 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액 중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
 - 6) 대량 투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
 - 7) 항실도스테론제, 트리암테넨과 병용(함께 복용)투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
 - 8) 우발적으로 과량복용 한 경우
 - 9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
6. 일반적 주의 - 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정중용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.
7. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도, 감독하에 투여할 것.
 - 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것
8. 저장상의 주의사항
- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【포장단위】 60C, 120C/PTP, 10C/PTP

【수신자부담고객상담실】 080-988-8888

【제조외리지】 조아제약(주) (<http://www.choa.co.kr>)

본사: 서울특별시 영등포구 당산로2길 12, 공장: 경상남도 함안군 함안면 광정로 318

【제조자】 (주)알피바이오 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-7

※ 기타 상세한 것은 의사 또는 약사의 지시에 따르십시오. ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국에서 교환해 드립니다. ※ 본 첨부문서의 내용은 최신정보 및 허가사항의 변경에 따라 계속 수정되고 있으므로 사용전에 주의깊게 읽어주시고, 의약품과 함께 보관하여 주십시오. ※ 의약품은 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다. ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품안전나라(<http://nedrug.mfds.go.kr>)를 참조하십시오. ※ 표시되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전처에 전달하십시오. ※ 의약품 사용 후 부작용 발생 시 한국의약품안전관리원(1644-6223)에 피해 구제신청을 할 수 있습니다.

개정연월일 : 2020. 02. 27 (Rev.0)