

조제용 | 일반의약품 | 분류번호 222

# 비알류코 캡슐

(아세틸시스테인)

## [원료약품의 분량] 1캡슐 중

아세틸시스테인(KP) ..... 200mg

첨가제(타르색소) : 적색3호, 청색1호 / 동물유래성분 : 유당수화물(소, 우유)

[성상] 흰색의 분말이 충전된 상·하부 연청색의 경질캡슐제

## [효능·효과]

다음 질환에서의 객담배출곤란 : 급·만성기관지염, 기관지천식, 후두염, 부비동염, 남성성유증

## [용법·용량]

아세틸시스테인으로서 다음 용량을 식전에 소량의 물과 함께 복용한다.

1. 급성질환  
성인 : 1회 200mg 1일 3회 / 소아 : 6~14세 1회 200mg 1일 2회
2. 만성질환  
성인 : 1회 200mg 1일 2회 / 소아 : 6~14세 1회 100mg 1일 3회
3. 남성성유증  
소아 : 6세 이상 1회 200mg 1일 3회

## [사용상의 주의사항]

1. 경고 : 이 약에 함유되어 있는 인공감미제 아스파탐은 체내에서 분해되어 페닐알라닌으로 대사되므로, 페닐알라닌의 섭취를 규제할 필요가 있는 유전성질환인 페닐케톤뇨증 환자에는 투여하지 말 것.
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
  - 1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응 환자
  - 2) 위·십이지장궤양 환자
  - 3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
  - 4) 2세 미만 영아
3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
  - 1) 임부 : 임부에 대한 적절한 연구가 없으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 반드시 필요한 경우에만 투여한다.
  - 2) 수유부 : 이 약이 모유로 분비되는지 알려지지 않았으나 많은 약들이 모유로 분비되므로 수유부에 투여할 경우에는 신중히 투여한다.

**4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.**

**상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것**

- 1) 소화기계 : 드물게 구역, 구토, 구내염, 가슴쓰림, 설사 등
- 2) 과민반응 : 드물게 두드러기, 가려움, 발진, 두통, 이명, 기관지경련(특히 천식 환자) 등
- 3) 드물게 빈맥, 고혈압
- 4) 국내 자발적 유해사례 보고자료(1989~2013 상반기)를 분석한 결과, 유해사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 유해사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 유해사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 유해사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.  
· 호흡곤란

**5. 기타 이 약을 복용 시 주의할 사항**

- 1) 경구용 항생물질 (아목시실린, 세푸록심, 독시사이클린, 에리트로마이신, 치암페니콜)과 함께 복용시 항생물질의 약효를 감소시킬 수 있다. (적어도 2시간의 간격을 두고 투여한다).
- 2) 이 약의 용액에 다른 약물의 첨가는 피할 것.

**6. 저장상의 주의사항**

- 1) 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 보관할 것.

**[1일 허용량제한]**

아스파탐 함량을 WHO 권장량(40mg/kg/1일) 이하로 조정(가능한한 최소량 사용)할 것.

60kg 성인 : 1일 최대복용량 2.4g

**[저장방법]** 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

- ※ 유효(사용)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품 등은 구입하신 곳에서 당사 담당 영업사원을 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 이 설명서의 작성연월일 이후 변경된 내용은 본사 홈페이지([www.boryungbio.co.kr](http://www.boryungbio.co.kr)) 또는 소비자상담실 (02-708-8427)에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) 의약품 정보를 참조하시기 바랍니다.
- ※ 올바른 사용법을 모르거나 의문 사항이 있는 경우 의사 또는 약사와 상담하십시오.

제조사 : 우리들제약(주) 경기도 화성시 향남읍 제약공단 2길 50

제조외뢰 및 판매자 : (주)보령바이오파마 충청북도 진천군 광혜원면 사동길 2

작성연월일 : 2015.12.15