

알레르기 증상완화제(1일 1캡슐)


로라딘

연질 캡슐

(로라타딘 10mg)

알레르기성 비염, 콧물·재채기

가렵고 충혈된 눈, 코, 목 가려움증



일반의약품 / 분류번호 : 01410

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐(210mg) 중

로라타딘(USP)..... 10.00 mg

첨가제(타르색소) : 적색40호, 청색1호

[성상] 무색 내지 연한 파란색의 투명한 내용액을 함유한 파란색의 투명한 타원형 연질캡슐

[효능·효과] 알레르기성 비염(코염)(꽃가루 알레르기) 또는 상기도의 알레르기로 인한 다음증상의 일시적인 완화 : 콧물, 재채기, 가렵고 충혈된 눈, 코 또는 목의 가려움

[용법·용량] 성인 및 12세 이상의 소아 : 로라타딘으로서 1일 1회 10mg(1캡슐)을 경구투여한다(복용한다). 6 ~ 12세 미만의 소아 - 체중 30 kg 이상 : 이 약으로서 1일 1회 10mg(1캡슐)투여한다.

[사용상 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응을 나타내는 환자
- 2) 6 세 미만의 소아
- 3) 임부 및 수유부

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것

이 약과 시메티딘, 에리트로마이신, 케토코나졸, 퀴니딘, 플루코나졸, 플루옥세틴과 병용(함께 복용) 투여시 이 약의 대사가 저해되어 혈중 농도가 높아진다.

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것

이 약이 모유중으로 이행되므로 수유중에는 투여하지 않는다.

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

간장에 또는 신부전 환자

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 이 첨부문서를 소지할 것

1) 이 약과 위약과의 비교 임상시험에서 보고된 이상반응은 아래와 같다.

- 신경계 : 진정작용, 항콜린작용, 두통, 실신, 졸음
- 소화기계 : 목마름, 위장장애(구역, 위염)
- 대사 및 영양계 : 식욕증진
- 순환기계 : 빈맥(빠른맥)
- 전신 및 투여부위 이상 : 피로
- 피부 및 피부조작계 : 발진과 같은 알레르기 반응

2) 시판 후 다음의 이상반응이 자발적으로 보고되었다 : 말초성 혈관부종(부기)을 포함한 아나필락시스, 간기능 장애, 상설성 부정맥(빠른맥), 두근거림, 어지러움, 경련

3) 과량투여시의 처치 : 과량을 투여했을 때에는 즉시 대증요법(증상별로 치료하는 방법)과 지지요법을 시작하여야 한다. 환자가 자발적으로 구토를 일으키지 않더라도, 구토를 유발시켜야 한다. (토근을 이용 하는 방법이 우선적으로 사용된다.) 그러나 의식장애가 있는 환자에게 구토를 유도하여서는 안된다. 구토 후에 활성탄과 물을 희석(묽게 함)하여 투여할 수도 있다. 만일 구토가 성공적이지 못하거나 금기 사항일 경우는 위세척을 실시하여야 한다. 이 약은 투석으로는 제거되지 않는다. 응급처치 이후 환자는 지속적으로 관찰되어야 한다.

6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

만일 피부자극 시험을 할 경우에는 항히스타민제들이 피부반응 표시기에 양성반응을 방해 및 감소시킬 수 있으므로 피부시험 실시 약 48시간 전에는 투여하지 않는다.

7. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오염(질문 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.

[저장방법 및 사용기간] 기밀용기, 실온(1 ~ 30℃)보관, 제조일로부터 24개월

[포장단위] 10연질캡슐

[소비자 상담실] 043)881-6333

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다.

※ 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해 드립니다.

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 설명서 작성일자(2015년 12월 1일) 이후 변경된 내용은 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

[제조회사] 한솔신약주식 / 충북 음성군 금왕읍 청평길 2-11

[제조자] (주)알파코프 / 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-7