

판그로캡슐

(PAN-Grow)

■ 원료약품 및 그 분량 이 약 1캡슐 중,

약용효모(별규)	100mg
	(히스티딘1.0mg, 류신3.0mg, 리신3.1mg)
케라틴(별규)	20mg
	(히스티딘0.22mg, 류신1.88mg, 리신1.0mg)
티아민질산염(KP)	60mg
판토텐산칼슘(KP)	60mg
L-시스틴(KP)	20mg
p-아미노벤조산 (USP)	20mg
동물유래성분(기원동물 및 사용부위) : 케라틴 (돼지발톱)	
첨가제(타르색소) : 황색5호, 황색203호, 청색1호, 적색40호	

■ 성상

연회색 가루의 내용물이 든 상부는 녹색, 하부는 미황색의 불투명한 경질캡슐제

■ 효능·효과

1. 손상된 모발, 감염성이 아닌 손톱의 발육 촉진
2. 확산성 탈모에 유효

■ 용법·용량

- 성인 : 1일 3회, 1회 1캡슐 식후 복용
- 소아 : 1일 1~2회, 1회 1캡슐 식후 복용

■ 사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

이 약은 황색5호 (간색젤로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.

2. 이상반응

도물개 위통, 구토 등 위장관 불편감과 발한, 빈맥, 소양증, 두드러기 등이 보고되었으며, 두부이외의 신체부위에서 발모현상이 나타날 수 있습니다.

3. 일반적 주의

- 1) 설문아미드제와 동시 복용 시 주의하여야 합니다.
- 2) 총터로 인한 탈모나 안드로겐 유전성 탈모증, 남성형 대머리에는 사용하지 않습니다.
- 3) 효능이 지속되거나 기대하는 효과가 나타나지 않는 경우 의사와 상의하십시오.

4. 임부, 수유부에 대한 투여

임부, 수유부에 투여할 경우는 의사와 상의하십시오.

5. 적응상의 주의

- 1) 평균 치료 기간은 3~6개월이고 보통 약 3~4개월 후부터 효과를 나타내며 필요한 경우 투여를 계속하거나 반복 투여할 수 있습니다.
- 2) 본 제제는 당뇨병환자에 투여할 수도 있습니다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 사용기한이 초과된 것은 복용하지 않습니다.
- 2) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

■ 저장방법 차광기밀용기, 25℃이하 보관

■ 사용기간 외부 포장에 표시된 사용기한 내에 사용하십시오.

■ 포장단위 90캡슐, 180캡슐

■ 제재의뢰·판매자 한울바이오파마㈜

■ 제조사 한국맥넬(주) 충청남도 천안시 서북구 성환읍 읍금3길 46

- * 본 의약품은 GMP업소에서 제조되어 엄격한 품질 관리를 위한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 파손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- * 최신 허가 변경 사항은 자사의 홈페이지(www.hanall.co.kr)에서 확인하여 주시기 바랍니다.
- * 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하시기 바랍니다.

HCS-I-0
15-11-24

HANALL
BIOPHARMA

한울바이오파마 | 주

대전광역시 대덕구 상서동길 43 / 고객센터 : 1644-5515 www.hanall.co.kr