

전문의약품

(발사르탄)

바레탄정

80mg/160mg

(발사르탄)
기타 고혈압치료제

Varetan Tab.

바레탄정

80mg/160mg

- * 의약품은 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
- * 사용기한이 지난 약품을 사용하지 않도록 합니다.
- * 약품을 사용하는 동안에는 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.

【원료약품 및 그 분량】1정 중

바레탄정80mg :

발사르탄(USP) 80.0mg

철가제(타르색소) : 황색5호 알루미늄레이크, 청색2호 알루미늄레이크

바레탄정160mg :

발사르탄(USP) 160.0mg

철가제(타르색소) : 황색5호 알루미늄레이크

【성상】

바레탄정80mg : 옅은 분홍색의 알갱이 불룩한 원형 필름코팅정

바레탄정160mg : 회색빛을 띠는 오렌지색의 타원형 필름코팅정

【효능·효과】

1. 본태고혈압

2. 심부전 : ACE억제제에 불내성(intolerant)인 심부전(NYHA class II ~ IV)

3. 심근경색 후의 사망 위험성 감소 : 증상, 중증 혹은 반사신학적으로 좌심실 부전 및/또는 좌심실 수축 기능 부전을 가진 임상적으로 안정된 환자에서의 심근경색 후 사망 위험성 감소

【용법·용량】

1. 본태고혈압

식사 중 물과 함께 복용하거나 식간에 복용한다. 가능한 매일 같은 시간에, 아침에 복용할 것이 권장된다.

1) 성인 : 성별, 인종에 상관없이 발사르탄으로서 1일 1회 80 mg 경구투여가 권장된다. 혈압강화효과는 2주 이내에 점진적으로 나타나며 4주 이후 최대효과를 나타낸다. 혈압조절이 잘 되지 않는 환자는 용량을 1일 160 mg까지 점진적으로, 이노제를 병용투여 할 수 있다. 만약, 추가적인 혈압 강하가 필요한 경우, 1일 최대 320 mg까지 용량을 증량할 수 있다.

2) 고령자(75세 이상) : 이 약으로서 1일 1회 40 mg으로 투여를 시작한다.

3) 신장애 환자 :

(1) 크레아티닌청소율 20 ~ 50 mL/min : 용량 조절이 필요하지 않다.

(2) 크레아티닌청소율 10 ~ 20 mL/min : 이 약으로서 1일 1회 40 mg으로 투여를 시작한다.

(3) 크레아티닌청소율 10 mL/min 미만 및 투석환자 : 이 약을 투여하지 않는다.

4) 혈액 및 체액 부족 환자 : 혈액 및 체액이 부족한 환자의 경우(예, 고용량의 이노제 복용환자로 용량을 강감할 수 없는 경우), 이 약으로서 1일 1회 40 mg으로 투여를 시작한다.

5) 신장애 환자 : 경증 및 중등도 신장애 환자인 경우 이 약으로서 1일 1회 40 mg으로 치료를 시작하며, 1일 80 mg을 초과해서는 안된다. 중증의 신장애, 간경화, 담즙정체환자에게 이 약을 투여하지 않는다.

6) 소아 : 18세 미만 소아 및 청소년에서 안전성, 유효성이 확립되어 있지 않다.

2. 심부전

성인 : 개시용량은 이 약으로서 1일 2회, 1회 40 mg 경구투여가 권장되며, 1회 80 mg 또는 160 mg까지 증량할 수 있다. 이노제 병용 투여시 이노제의 용량감소를 고려해야 된다. 1 일 최대 투여 용량은 320 mg으로 분할 투여한다. 이 약은 ACE억제제와 베타차단제와의 3중 병용투여는 권장되지 않는다.

3. 심근경색 후의 사망 위험성 감소

성인 : 심근경색 발현 후 12시간 이내에 투여를 시작할 수 있다. 개시용량은 이 약으로서 1회 20 mg씩 1일 2회로 시작하는 것이 권장되고, 이후 수 주에 걸쳐 이 약을 1회 40 mg, 80 mg, 160 mg을 1일 2회 투여하는 방식으로 환자의 내약성을 고려하여 용량을 증량한다. 저혈압 증상 또는 신부전이 나타날 경우 강감을 고려한다. 심근경색 후 다른 투여법(예, 혈전용해제, 아세살살리실산, 베타차단제 및 스타틴 계열 약물)으로 치료 중인 환자에게도 이 약을 투여할 수 있다. 그러나 ACE억제제와의 병용은 권장되지 않는다.

4. 신장애 환자 : 크레아티닌청소율 10 mL/min 이상인 경우 용량조절이 필요치 않으나, 크레아티닌청소율 10 mL/min 미만 및 투석환자에 대한 사용경험이 없으므로 이 약을 투여하지 않는다.

5. 신장애 환자 : 경증 및 중등도의 신장애 환자에 대한 이 약의 1일 투여량은 1일 80 mg을 초과하지 않는 것이 바람직하다. 1일 80 mg 이상을 투여하는 경우, 용량 증량 시 치료의 유익성이 위험성을 상회하는지 고려해야 한다. 중증의 신장애, 간경화, 담즙정체환자인 경우 이 약을 투여하지 않는다.

6. 소아 : 18세 미만 소아 및 청소년에서 안전성, 유효성이 확립되어 있지 않다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고

임부에게 레닌-안지오텐신-알도스테론계(RAAS)에 직접 작용하는 약물들의 투여시, 태아 및 신생아에게 손상 및 사망까지도 일어날 수 있으며, 이러한 사례는 ACE억제제를 복용한 환자에서도 세계적으로 수십례가 보고된 바 있다. 따라서 만일 임신으로 확인될 경우 즉시 이 약의 투여를 중단해야 한다(‘임부 및 수유부에 대한 투여’항 참조).

2. 다음 환자에게는 투여하지 말 것.

1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응 환자

2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부

3) 중증의 신장애 환자, 간경화증 또는 담도폐쇄, 담즙정체 환자

4) 유전성 혈관부종 환자(거나, ACE억제제 혹은 안지오텐신 II수용체 길항제 치료시 혈관부종의 병력이 있는 환자

5) 중증의 신장애 환자(크레아티닌청소율 10 mL/min 미만)(사용경험이 없다.)

6) 환발고알도스테론증 환자(원발고알도스테론증 환자는 레닌-안지오텐신-알도스테론계가 활성화되지 않기 때문에 이 약을 투여하지 않는다.)

3. 다음 환자(경우)에는 신중히 투여할 것.

1) 고령자

2) 고칼륨혈증 환자 혹은 혈청 칼륨치가 높아지기 쉬운 환자

3) 경증 ~ 중등도 신장애 환자(경증 및 중등도의 신장애 환자에 대한 이 약의 1일 투여량은 80 mg을 초과하지 않는 것이 바람직하다.)

4) 대동맥만 및 승모판 협착증 환자 혹은 폐쇄비대심근병 환자

5) 허혈 심장병, 허혈 심장질환, 질환, 뇌혈관 장애 환자(과도한 혈압강하는 심근경색이나 뇌혈류 부전으로 인한 뇌졸중을 일으킬 수 있다.)

6) 고용량의 이노제 투여와 같은 나트륨 또는 체액 부족 환자(이 약 투여 초기에 드물게 저혈압 현상이 나타날 수 있다.)

7) 양측성 또는 단독성 신동맥 협착증 환자(레닌-안지오텐신-알도스테론계에 영향을 미치는 다른 약물을 투여한 경우 혈중 요소 및 혈청 크레아티닌을 증가시킬 수 있으므로 안전성 면에서 모니터링이 권장된다.)

8) 심부전 또는 심근경색 후 환자

9) 혈액투석 중인 환자, 엄중한 감염 요법 중에 있는 환자(저용량부터 투여하기 시작하고 증상을 하는 경우에는 환자 상태를 충분히 관찰하면서 서서히 행해야 한다.)

10) 수술 전 24시간 이내의 환자

11) 다음 환자에게는 신중히 투여할 것 - 이 약은 황색5호(선택적으로FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

4. 이상반응

1) 고혈압 환자

이 약으로 치료받은 고혈압 환자 2,316명을 포함한 위약대조시험에서 전반적인 이상반응 발생율을 비교하였다. 다음 이상반응 표는 12주 이상 동안 여러 용량의 발사르탄(10 ~ 320 mg)으로 치료받은 10개의 임상시험을 바탕으로 한 것으로 2,316명 중 1,281명 및 660명이 각각 80 mg, 160 mg을 투여 받았다. 이상반응 발생률은 이 약의 용량, 치료기간, 성별, 나이, 인종에 무관했기 때문에 1% 이상의 발생율을 보인 모든 이상반응은 시험약과의 인과관계에 상관없이 다음 표에 포함시켰다. 기타 : 1% 미만 이상반응은 부종, 무력증, 불면증, 발진, 식욕감퇴, 어지럼(vertigo) 등이며 이 약과의 인과관계는 밝혀지지 않았다.

	발사르탄 n=2,316(%)	위약 n=668(%)
두통	9.8	13.5
어지럼(dizziness)	3.6	3.5
비리리자 감압	3.1	1.9
상부기도 감염	2.5	2.4
기침	2.3	1.5
설사	2.1	1.8
피로	2.1	1.2
비염	2.0	2.3
부비염	1.9	1.6
배통(요통)	1.6	1.4
복통	1.6	1.0
구역	1.5	2.0
인두염	1.2	0.7
관절통	1.0	1.0

2) 심부전 환자

발사르탄 심부전 연구(VaH-HFrT)의 4개월을 포함한 단기간의 이중맹검 연구에서 다음의 약물반응이 이상반응이 위약치로 환자보다 발사르탄 치료 환자에서 빈번하게 1% 이상의 발생률로 관찰되었다. : 어지럼, 저혈압, 기립저혈압, 기립저혈압, 피로, 설사, 두통, 구역, 신기능 손상, 고칼륨혈증, 모든 환자는 심부전을 위해 이노제, 디기탈리스, 베타차단제 또는 ACE억제제를 포함한 다중요법으로 치료 받았다. VaH-HFrT의 장기 데이터에서 단기 연구중인 이 약의 것 이외의 다른 이상반응은 나타나지 않았다.

3) 심근경색 후 환자

심근경색 후 고위험 환자군에 대해 발사르탄, 캅토프릴 및 발사르탄과 캅토프릴을 장기 투여 시 각각의 유효성 및 안전성을 비교한 다국적, 다기관, 이중맹검, 무작위, 대조 비교 평행 그룹 연구인 VALIANT 결과 발사르탄의 안전성은 해당 연구(예, 심부전 환자와 약물 자체 성질, 심혈관계 위험요소, 심근경색 후 상태에 따라 치료받은 환자들의 임상적 진행 상황 등에 부합했다. 중대한 이상반응은 주로 심혈관계 반응이었다. 일반적으로 내재 질환과 연관되어 있었다. 이는 일차적 평가 지표였던 모든 원인에 의한 사망 결과에도 반영했다. 사망 위험과의 연관성의 의심되는, 빈도가 0.1% 이상이며 발사르탄 투여군에서 캅토프릴 투여군보다 더 흔하게 나타나는 치명적이지 않은 중대한 이상반응은 고칼륨혈증, 기립, 심부전, 저혈압, 혈관신장부종, 신기능 손상에 관련된 반응들이었다. 이상반응으로 인해 투약을 완전히 중단한 환자의 비율은 발사르탄 투여군에서 5.8%, 캅토프릴 투여군에서 7.7%였다.

4) 외국 의 임상시험 및 시간 조차결과 다음과 같은 이상반응이 나타났다.

(1) 심부전, 부종, 졸음, 상복부통, 구토, 변비, 구갈, 식욕부진, 권태감

(2) 매우 드물게 혈관부종, 발진, 가려움, 탈모증, 발진증을 포함한 다른 과민성/알레르기 반응, 신기능 손상, 심신, 비출혈, 간염, 부장염

- (3) 간접성: 배열, 기침, 호흡곤란, 흉부 이상 현상 등을 동반하는 간접 성 폐렴이 나타나 는 일이 있으므로, 이러한 경우에는 투여를 중지하고, 부신피질 호르몬제 등 중요, 적절한 처치를 병행하여 한다.
- (4) 치료법: 특히, 당뇨병 등 중인 환자에서 저혈당 증세가 나타나는 경우가 있기 때문에, 관찰을 충분히 하여 혈당감, 공복감, 식욕감, 소변량, 신장기능, 지체, 경련, 의식장애 등이 나타났을 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 병행하여 한다.
- (5) 혈관부종(알레르기, 입술, 인두, 혀 부종 등이 증상), 간염, 신부전과 같은 이상반응이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- (6) 고칼륨혈증: 심각한 고칼륨혈증 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 즉시 적절한 처치를 한다.
- (7) 고나트륨: 심한 나트륨 고혈압에 따른 심신, 의식 소실이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 차가운 나트륨, 구토, 의식 소실 등이 나타날 경우에는 즉시 적절한 처치를 한다. 특히 혈액 투석 중 엄격한 나트륨 감소 요법, 이뇨제 투여중인 환자에서 저용량에서 투여를 시작하고 증강하는 경우에는 환자의 상태를 충분히 관찰하면서 서서히 한다.
- (8) 혈관공통증: 근육통, 무력감, 크레이프타나자제(CK) 상승, 혈중 및 요중 미오글로빈 상승을 특징으로 하는 혈관공통증이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이러한 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- (9) 이 요 무과립구증, 백혈구 감소, 혈소판 감소가 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하여 이상이 인정되는 경우 즉시 적절한 처치를 실시한다.
- 5) 실험실적 검사
- (1) 이 약을 투여받은 환자 0.8 %, 0.4 %에서 각각 적혈구응착, 백모글로빈이 20 %이상 감소했다. 대조제로서 위약투여군 0.1 %에서와 적혈구응착, 백모글로빈이 감소가 나타났다.
- (2) ACE억제제로 치료받은 환자의 1.6 %에서 호중구감소증이 관찰된 반면 이 약으로 치료받은 환자에서는 1.9 %에서 관찰되었다.
- (3) 고혈압 환자를 대상으로 한 대조 임상시험에서 혈청 크레아티닌, 칼륨, 총 빌리루빈치의 상당한 증가가 관찰되었는데 ACE억제제로 치료받은 환자에서는 각각 1.6 %, 6.4 %, 12.9 % 증가가 관찰된 반면 이 약으로 치료받은 환자에서는 각각 0.8 %, 4.4 %, 6 % 증가하는 것이 관찰되었다. 발사르탄을 투여받은 본토그합합 환자는 특별한 실험실적 수치 모니터링이 필요하지 않다.
- (4) 심부전 환자에서 50 %이상의 혈청 크레아티닌 농도 증가는 위약 그룹(0.9 %)보다 발사르탄 치료그룹(3.9 %)에서 더 많이 관찰되었다. 또한 20 %이상의 혈청 크레아티닌 농도 증가는 위약 그룹(5.1 %)보다 발사르탄 치료그룹(10 %)에서 더 많이 관찰되었다. 심부전 연구에서 BUN의 50 % 이상 증가는 위약 그룹(6.3 %)보다 발사르탄 치료그룹(16.6 %)에서 더 많이 관찰되었다.
- (5) 심장질환에 대한 영향: 때때로 간기능 검사치의 상승이 보고되었으나 이 약을 투여하는 본토그합합 환자에 대해 특별한 임상검사치의 모니터링이 필요한 정도는 아니다.
- 6) 국내 시판후 조사결과
- 국내에서 재조사된 후하여 6년 동안 1171명을 대상으로 실시한 시판 후 조사 결과 이상반응의 발현종류들은 인과관계와 상관없이 7.00 %(82/1171명)로 보고되었으며 이중 3.07 %(36/1171명)가 이 약과 인과관계가 있는 것으로 조사되었다. BUN증가가 0.85 %(10/1171명)로 가장 많았고, 그 다음은 두통, 어지럼, 기침이 각각 0.43 %(5/1171명), 부종 0.17 %(2/1171명), 경직, 무력 0.09 %(1/1171명)의 순으로 나타났다. 시판전 임상시험에서 나타나지 않았던 새로운 이상반응으로 소화불량, 빈혈, 이명, 이각각 2%, 긴장형, 운동기능 감소증, 혼미, 흉통, 발진, 근육통이 각각 1%씩 보고되었다.
5. 일반적 주의
- 1) 이 약의 투여에 의해 처음 투여 후 일시적인 급격한 혈압강하(심신 및 의식 소실 등을 동반)를 일으킬 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다. 또한 특히 다음 환자에서는 저용량에서 투여를 시작하고 증강하는 경우에는 환자의 상태를 충분히 관찰하면서 서서히 한다.
- (1) 혈액 투석중인 환자
- (2) 이뇨제를 투여중인 환자(특히 심한 나트륨 부족 혹은 체액 부족 환자에서는 드물게 중추성 저혈압이 발생할 수 있으므로 주의한다).
- (3) 엄격한 염분 제한 중인 환자
- (4) 고응고의 이뇨제를 병용하여 심한 나트륨 고갈이나 체액 고갈이 있는 환자의 경우 이 약 투여 초기에 드물게 저혈압 현상이 나타날 수 있다. 이 약 투여 전 이러한 나트륨 및 체액의 고갈은 이뇨제 용량을 감소하는 등의 방법으로 보정해야 한다. 저혈압이 발생한 경우 환자를 반듯한 자세로 눕히고 필요하다면 생리식염 주사액을 적절히 투여한다. 혈압이 안정된 후 약물투여를 계속한다.
- (5) 신독성 협착증 환자: 2차 편측성 신동맥협착을 수반하는 신혈관성 고혈압 환자 12명에 대한 이 약의 단기투여 시 신장의 혈액 동력학, 혈청 크레아티닌, BUN의 유의성 있는 변화는 유도되지 않았다. 그러나 레닌-안지오텐신-알도스테론계에 영향을 미치는 다른 약물을 양성성 또는 편측성 신동맥 협착증에 있는 환자에 투여한 경우 혈청 및 배설 크레아티닌을 증가시킬 수 있으므로 안전성 면에서 모니터링이 권장된다. 양성성 또는 편측성 신동맥 협착 환자에서는 신혈류량의 감소와 시구체 과과잉의 저에 의해 급속하게 신기능을 악화시킬 우려가 있으므로 치료 부득이하다고 판단되는 경우를 제외하고는 투여를 피한다.
- (6) 경증 및 중등도의 간장애 환자에 대한 이 약의 1일 투여량은 80 mg을 초과하지 않는 것이 바람직하다. 이 약 대부분 미변화체로서 담즙으로 배설되며 담도폐쇄 환자에서는 낮은 제거율을 나타내었으므로 이러한 환자에서는 사용하지 않는다. 경증에서 중등도 간장애 환자에서 이 약 투여시 혈장 농도가 건강한 성인에 비해 약 2배 상승하는 것으로 보고된 바 있다.
- (7) 이 약을 투여받는 심부전 또는 심근경색 발생 후의 환자는 주로 협압이 감소하지만 지속적인 저혈압 증세 때문에 치료를 중단할 필요는 없다. 심부전 환자는 심근경색이 발생한 후 환자의 치료 개시 시 주의한다. 레닌-안지오텐신-알도스테론계 억제제, 긴장한 환자에서 신기능 변화가 예상된다. 신기능이 레닌-안지오텐신-알도스테론계의 활성에 의존하는 증상의 심부전 환자에서 ACE억제제와 안지오텐신 II 수용체 길항제 치료하는 것은 소변감소증 및/또는 진행성 고혈소혈증 및 (드물게) 신성 신부전 및/또는 과다한 관련 있다. 유사한 결과들이 이 약에서도 보고된 적 있다. 심부전 또는 심근경색 발생 후 환자에 대한 평가에는 신기능 평가를 항상 포함해야 한다. 심부전 환자에서 ACE억제제, 베타차단제 그리고 발사르탄의 3종요법은 권장되지 않는다. 베타차단제와 ACE억제제를 동시 투여하면 심부전을 인한 이환율과 사망률이 증가하기 때문이다. 몇몇 심부전 환자에서 BUN, 크레아티닌 및 칼륨 수치의 증가가 관찰되었다. 이러한 현상은 주로 경미하고 일시적이며, 기존에 신손상을 지니고 있던 환자들에서 나타날 가능성이 높다. 이 약 및/또는 이뇨제의 용량 감소 및 투약 중단을 고려해야 한다.
- (8) 고칼륨혈증 환자에서는 고칼륨혈증을 악화시킬 우려가 있으므로 치료 불가피하다고 판단되는 경우를 제외하고 투여를 피한다. 또한 신장기능장애, 당뇨병 등에 의해 혈청 칼륨치가 높아지기 쉬운 환자에서는 고칼륨혈증을 발견시킬 수 있으므로 혈청 칼륨치에 주의한다.
- (9) 최근 신장기능을 실시한 환자에 대해서는 사용경험이 없다.
- (10) 다른 혈압강하제와 마찬가지로 강압작용에 의해 어지럼, 후정거림 등이 나타날 수 있으므로 운전이나 기계류를 조작할 때는 특별히 주의해야 한다.
6. 상호작용
- 1) 임상적으로 유의한 약물상호작용은 없었다. 시메티딘, 이온파린, 푸로세미드, 디곡신, 아티놀을, 인도메타신, 히드로콜로리타이드, 암로디핀, 글리벤크라미드와 상호작용

- 대한 임상시험이 있었다. 시메티딘과 병용 시, 발사르탄의 전신 노출이 증가할 수 있으며, 글리벤크라미드와 병용시 발사르탄의 전신 노출이 감소할 수 있다. 이 약은 유익성 있는 정도까지 대하지 않기 때문에 임상적으로 CYP-450 효소계의 대사와도 대하지에 의한 약물간 상호작용이 나타나는 것을 것으로 예측된다. 이 약은 혈장단백에 대해 높은 결합력을 보였지만 생체 내 연구에 의하면 디클로페낙, 푸로세미드, 외르피린과 같이 단백질결합이 높은 약물에 대해 어떤 상호작용도 나타나지 않았다.
- (2) 칼륨보충제(아노스피로노론, 트리암테린, 아미로라이드나) 칼륨보충제 또는 칼륨염류 유염제 혹은 칼륨농도를 증가시킬 수 있는 약물(예, 해파린) 병용시 혈중 칼륨 농도가 증가하거나 심부전 환자에서 혈중 크레아티닌 농도가 증가할 수 있으므로 신중하여 한다.
- (3) 안지오텐신 II 수용체 길항제와 비스테로이드염전통제(NSAID)에: 선택적인 COX-2억제제, 아세살살리산(Aspirin) 3g/day, 비선택적 비스테로이드염전통제와 병용시 혈압강하효과가 감소할 수 있다. ACE억제제와 같이, 안지오텐신 II 수용체 길항제와 비스테로이드염전통제의 병용은 신기능을 악화, 급성 신부전을 유발시킬 수 있고, 혈청 칼륨을 증가시킬 수 있다. 병용시 주의하여 하며, 특히 고령자에서는 유요혈변을 일으킬 수 있고, 중년 환자에서는 주의한다. 병용치료 시작 후에 환자에게 적절한 수분이 공급되어야 하며, 신기능을 주기적으로 모니터링 해야한다.
- (4) 리튬과 ACE억제제를 병용 투여했을 때 혈청 리튬 농도 및 독성의 가역적 증가가 보고되었으며, 매우 드물게 안지오텐신 II 수용체 길항제에서도 보고되었다. 병용 요법이 반드시 필요하다고 판단되는 경우에는 병용투여를 하는 동안 혈청 리튬 농도의 모니터링이 권장된다.
7. 임부 및 수유부에 대한 투여
- 1) 안지오텐신 II 수용체 길항제의 작용기전 때문에 태아에 대한 위험을 무시할 수 없다. 임신 2 ~ 3기 사이에 ACE억제제(레닌-안지오텐신-알도스테론계 작용하는 특정 약물)에 노출된 임부에서 태아 및 신생아의 저혈압, 고칼륨혈증, 신생아 두개골 발육부전, 요강소 그리고/혹은 무두증, 가역적 또는 비가역적인 신부전, 자궁내 성장 지체 및 사망을 포함하여 태아 및 신생아 손상과 연관성이 있었다. 태아 신기능 감소 때문인 것으로 추측된 양수과소증도 보고되었고, 양수과소증은 태아 사지구멍, 두개안연 기형 및 폐활부 부전과 연관성이 있었다. 후향적 자료에 의하면, 임신 1기에 ACE억제제를 사용하는 것은 출생결함의 발생적 위험과 관련 있었다. 또한 이 약에 의한 개인적 명확한 임부나 미숙, 자궁내 발육지연, 동맥관 열림증은 보고되지 않았다. 임부가 우발적으로 발사르탄을 복용했을 때, 자연유산, 양수과소증, 신생아 신기능이상이나 나타났다는 보고가 있다. 다른 레닌-안지오텐신-알도스테론계에 직접 작용하는 약물처럼 이 약도 임신 중 또는 임신을 계획하고 있는 여성에서 사용하는 데 적절치 못하며, 투약 중 임상이 확인되면 즉시 투약을 중단한다. 레닌-안지오텐신-알도스테론계에 작용하는 약물을 임신할 가능성이 있는 여성에게 처방하는 경우, 의사는 임신 중 이 약의 잠재적 위험에 대하여 알려 주어야 한다. 만약 임신 2 기 이후로 임부가 안지오텐신 II 수용체 길항제에 노출되었을 경우, 태아의 신장기능과 두개골 초음파 검사가 권장된다. 또한, 자궁 내서 이 약에 노출된 경향이 있는 신생아의 경우 충분한 배뇨, 고칼륨혈증, 혈압을 면밀히 조사해야 한다.
- (2) 이 약이 모유 중에 배비되는 지의 여부는 밝혀지지 않았으나 젖에 대한 실험에서 유유 중에 이 약의 분비가 확인되었으므로 수유부가 이 약을 사용하는 것은 바람직하지 않다. 수유중인 여성에게 이 약의 투여를 피하고, 부득이 투여하는 경우에는 수유를 중단해야 한다.
8. 소아에 대한 투여
- 18세 미만 소아 및 청소년에 대한 안전성 및 유효성은 연구되지 않았다.
9. 고령자에 대한 투여
- 고령자 경우에는 일반적으로 과도한 혈압강하는 뇌경색 등이 일어날 우려가 있어 바람직하지 않다고 보고 때문에, 저용량으로부터 투여를 시작하는 등, 환자 상태를 관찰하면서 신중하게 투여해야 한다. 고령자에 대한 약물동태 시험에서 이 약의 혈장농도가 비고령자에 비해 높은 것으로 나타났다.
10. 과량투여 시의 처리
- 이 약의 과량투여에 대한 경험은 없으나 현저한 저혈압, 의식장애, 순환회박 및 쇼크, 빈맥, 부종과 신장 장애에 의한 상태가 예상된다. 복용후처리된 구토를 유도하거나 활성탄을 투여하고 그 외에는 생리식염 주사액을 정맥 내에 주입한다. 만일 저혈압이 발생하면 바로 누운 자세를 취하고 고혈압을 교정할 수 있다. 혈액투석은 도움이 되지 않는다.
11. 보관 및 취급상의 주의사항
- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 시고환원이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.
12. 기타
- 다수 종의 동물들을 이용한 전임상 안전성 시험에서 생식독성을 제외하고는 전신 독성 혹은 특정 장기에 대한 독성은 관찰되지 않았다. 임신기간의 마지막 3개월 및 수유기에 600 mg/kg/day를 투여한 캣트의 자손에서 생중증 감소와 신생발달의 약간 지연만이 관찰되었다. 전임상 안전성 결과는 주로 약물의 약리학적 성질에 부합하였으며 임상적인 유의성은 없었다. 변이형성, 염색체이상유형성, 발암성은 나타나지 않았다.

[저장방법] 기밀용기, 열과 습기를 피해 30℃이하에서 저장
[포장단위] 30정, 100정
[사용기준] 제조일로부터 36개월

제조의회사  **GT CHEMICALS (주)세티바바이오**
경기도 안산시 단원구 강촌로 228-16
제조사  **인국약품**
인국약품
경기도 화성시 향남읍 제곡관리길 40

※ 본 약물은 엄격한 품질관리를 통한 제품입니다. 만약 구입 시 사용가능한 모든 유효기간의 지났거나 변질, 변색, 오염되었거나 손상된 약물은 공정거래위원회 고시(소보자 분해제거기준)에 의거, 구입한 약국 및 약품판매업자를 통해 교환 또는 환불받을 수 있습니다.