

원료약품 및 그 분량

주·아간용 1캡슐 중

● 주간용

덱스트로메토르판분말화수소염수화물(KP)	8mg
dl-메틸에페드린염산염(KP)	10mg
수도메페드린염산염(USP)	15mg
구아니페나신(KP)	40mg
아세트아미노펜(KP)	200mg

참가제(천연색소): 홍화황색소

● 아간용

덱스트로메토르판분말화수소염수화물(KP)	8mg
dl-메틸에페드린염산염(KP)	10mg
수도메페드린염산염(USP)	15mg
디펜하이드라민염산염(KP)	20mg
구아니페나신(KP)	40mg
아세트아미노펜(KP)	200mg

참가제(천연색소): 차차청색소

성상

● 주간용

미황색(연노랑)의 투명한 내용물을 함유한 노란색의 투명한 장방형 연질캡슐

● 아간용

미황색(연노랑)색의 투명한 내용물을 함유한 청색의 투명한 장방형 연질캡슐

효능·효과

● 주·아간용

감기의 증상(여러증상(코막힘, 재채기, 인후(목구멍), 가래, 기온, 과다한 재래가 동반되는 기침, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

용법·용량

● 주간용

만 15세 이상 및 성인: 1일 2회, 1회 2캡슐 식후 30분에 복용, 만 2세 미만에게 투여하지 않는다.

● 아간용

만 15세 이상 및 성인: 1일 1회, 1회 2캡슐 식후 30분에 복용, 만 2세 미만에게 투여하지 않는다.

사용상의 주의사항

● 주간용

1. 경고 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다. 2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람 2) 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 갑상선 질환, 심장질환을 일으킨 적이 있는 사람 3) 만 3개월 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기) 4) MAO억제제(항우울제, 항정신

일반의약품

분류번호 114

병제, 강정조절제, 항파킨슨제 등을 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람 3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것 진해(기침을 그치게 할)거담제(가래약), 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염)경구제, 경구제, 말미약, 알레르기(알레르기) 4. 이 약을 복용하는 동안 다음과 같은 행위를 하지 말 것 1) 약에는 아세트아미노펜이 함유되어 있다. 다른 아세트아미노펜을 포함한 다른 제품과 함께 복용해서는 안 된다. 5. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것 1) 수도 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(젖먹이, 갓난아기) 및 만 15세 미만의 어린이(구약이나 구토를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이증후군)의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의할 것.) 2) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염(코염), 편두통, 음식을 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람 3) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예: 발진, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람 4) 간장질환, 신장(콩팥)질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 위산이정제(위산)제, 녹내장, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람 5) 속쓰림, 위부 불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나, 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부 7) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨병, 통풍, 관절염, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람) 8) 다음과 같은 기침이 있는 사람, 흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열, 발진이나 지속되는 두통이 동반되는 기침 6. 소아에 대한 투여 만 2세 미만에게 투여하지 않는다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받는다. 7. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것, 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우, 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 변비, 부종(부기), 어지러움, 불안, 떨림, 불면 2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 증상(심한 증상)이 나타난 경우 ① 속(아나필락시스): 복통 후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴 답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다. ② 피부정맥염(종창) 스티븐스-존슨증후군, 중독성피부괴사증(리델증후군): 고열을 동반하고, 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈 점막에 나타날 수 있다. ③ 천식 ④ 간기능장애: 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨) 등이 나타날 수 있다. ⑤ 간질성패렴: 기침을 동반하고, 숨이 차고, 호흡곤란, 발열 등이 나타난다. ⑥ 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우 8. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항 1) 정해진 용법, 용량을 잘 지킬 것. 2) 정기간 계속 복용하지 말 것. 3) 복용시에는 음주하지 말 것. 4) 복용하는 동안 다음과 같은 행위를 하지 말 것 1) 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 갑상선 질환, 심장질환을 일으킨 적이 있는 사람 3) 만 3개월 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기) 4) MAO억제제(항우울제, 항정신

알코올을 투여한 환자는 다음의 아세트아미노펜을 대신 시는 능력에 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다. 9. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 밀 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(알루미늄) 보관할 것. 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

● 아간용

1. 경고 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다. 2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람 2) 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 갑상선 질환, 심장질환을 일으킨 적이 있는 사람 3) 만 3개월 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기) 4) 수유부 (수유중인 사람은 이 약을 복용하지 않거나 수유를 중단할 것.) 5) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 강정조절제, 항파킨슨제 등을 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람 3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것 진해(기침을 그치게 할)거담제(가래약), 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염)경구제, 경구제, 말미약, 알레르기(알레르기) 4. 이 약을 복용하는 동안 다음과 같은 행위를 하지 말 것 1) 약에는 아세트아미노펜이 함유되어 있다. 다른 아세트아미노펜 제품과 함께 복용하여 일일 최대용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용해서는 안 된다. 5. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것 1) 수도 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(젖먹이, 갓난아기) 및 만 15세 미만의 어린이(구약이나 구토를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이증후군)의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의할 것.) 2) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염(코염), 편두통, 음식을 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람 3) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예: 발진, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람 4) 간장질환, 신장(콩팥)질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 위산이정제(위산)제, 녹내장, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람 5) 속쓰림, 위부 불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나, 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부 7) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨병, 통풍, 관절염, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람) 8) 다음과 같은 기침이 있는 사람, 흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열, 발진이나 지속되는 두통이 동반되는 기침 6. 소아에 대한 투여 만 2세 미만에게 투여하지 않는다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받는다. 7. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것, 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우, 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 변비, 부종(부기), 어지러움, 불안, 떨림, 불면 2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 증상(심한 증상)이 나타난 경우 ① 속(아나필락시스): 복통 후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴 답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다. ② 피부정맥염(종창) 스티븐스-존슨증후군, 중독성피부괴사증(리델증후군): 고열을 동반하고, 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈 점막에 나타날 수 있다. ③ 천식 ④ 간기능장애: 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨) 등이 나타날 수 있다. ⑤ 간질성패렴: 기침을 동반하고, 숨이 차고, 호흡곤란, 발열 등이 나타난다. ⑥ 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우 8. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항 1) 정해진 용법, 용량을 잘 지킬 것. 2) 정기간 계속 복용하지 말 것. 3) 복용시에는 음주하지 말 것. 4) 복용하는 동안 다음과 같은 행위를 하지 말 것 1) 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 갑상선 질환, 심장질환을 일으킨 적이 있는 사람 3) 만 3개월 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기) 4) 수유부 (수유중인 사람은 이 약을 복용하지 않거나 수유를 중단할 것.) 5) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 강정조절제, 항파킨슨제 등을 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람 3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것 진해(기침을 그치게 할)거담제(가래약), 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염)경구제, 경구제, 말미약, 알레르기(알레르기) 4. 이 약을 복용하는 동안 다음과 같은 행위를 하지 말 것 1) 약에는 아세트아미노펜이 함유되어 있다. 다른 아세트아미노펜 제품과 함께 복용하여 일일 최대용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용해서는 안 된다. 5. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것 1) 수도 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(젖먹이, 갓난아기) 및 만 15세 미만의 어린이(구약이나 구토를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이증후군)의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의할 것.) 2) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염(코염), 편두통, 음식을 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람 3) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예: 발진, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람 4) 간장질환, 신장(콩팥)질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 위산이정제(위산)제, 녹내장, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람 5) 속쓰림, 위부 불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나, 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부 7) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨병, 통풍, 관절염, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람) 8) 다음과 같은 기침이 있는 사람, 흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열, 발진이나 지속되는 두통이 동반되는 기침 6. 소아에 대한 투여 만 2세 미만에게 투여하지 않는다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받는다. 7. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것, 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우, 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 변비, 부종(부기), 어지러움, 불안, 떨림, 불면 2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 증상(심한 증상)이 나타난 경우 ① 속(아나필락시스): 복통 후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴 답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다. ② 피부정맥염(종창) 스티븐스-존슨증후군, 중독성피부괴사증(리델증후군): 고열을 동반하고, 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈 점막에 나타날 수 있다. ③ 천식 ④ 간기능장애: 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨) 등이 나타날 수 있다. ⑤ 간질성패렴: 기침을 동반하고, 숨이 차고, 호흡곤란, 발열 등이 나타난다. ⑥ 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우 8. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항 1) 정해진 용법, 용량을 잘 지킬 것. 2) 정기간 계속 복용하지 말 것. 3) 복용시에는 음주하지 말 것. 4) 바르비탈계 약물, 심하게 항우울제 및

나타난 경우 ① 속(아나필락시스): 복통 후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴 답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다. ② 피부정맥염(종창) 스티븐스-존슨증후군, 중독성피부괴사증(리델증후군): 고열을 동반하고, 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈 점막에 나타날 수 있다. ③ 천식 ④ 간기능장애: 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨) 등이 나타날 수 있다. ⑤ 간질성패렴: 기침을 동반하고, 숨이 차고, 호흡곤란, 발열 등이 나타난다. ⑥ 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우 8. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항 1) 정해진 용법, 용량을 잘 지킬 것. 2) 정기간 계속 복용하지 말 것. 3) 복용시에는 음주하지 말 것. 4) 복용하는 동안 다음과 같은 행위를 하지 말 것 1) 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 갑상선 질환, 심장질환을 일으킨 적이 있는 사람 3) 만 3개월 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기) 4) 수유부 (수유중인 사람은 이 약을 복용하지 않거나 수유를 중단할 것.) 5) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 강정조절제, 항파킨슨제 등을 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람 3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것 진해(기침을 그치게 할)거담제(가래약), 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염)경구제, 경구제, 말미약, 알레르기(알레르기) 4. 이 약을 복용하는 동안 다음과 같은 행위를 하지 말 것 1) 약에는 아세트아미노펜이 함유되어 있다. 다른 아세트아미노펜 제품과 함께 복용하여 일일 최대용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용해서는 안 된다. 5. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것 1) 수도 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(젖먹이, 갓난아기) 및 만 15세 미만의 어린이(구약이나 구토를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이증후군)의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의할 것.) 2) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염(코염), 편두통, 음식을 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람 3) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예: 발진, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람 4) 간장질환, 신장(콩팥)질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 위산이정제(위산)제, 녹내장, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람 5) 속쓰림, 위부 불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나, 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부 7) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨병, 통풍, 관절염, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람) 8) 다음과 같은 기침이 있는 사람, 흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열, 발진이나 지속되는 두통이 동반되는 기침 6. 소아에 대한 투여 만 2세 미만에게 투여하지 않는다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받는다. 7. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것, 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우, 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 변비, 부종(부기), 어지러움, 불안, 떨림, 불면 2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 증상(심한 증상)이 나타난 경우 ① 속(아나필락시스): 복통 후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴 답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다. ② 피부정맥염(종창) 스티븐스-존슨증후군, 중독성피부괴사증(리델증후군): 고열을 동반하고, 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈 점막에 나타날 수 있다. ③ 천식 ④ 간기능장애: 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨) 등이 나타날 수 있다. ⑤ 간질성패렴: 기침을 동반하고, 숨이 차고, 호흡곤란, 발열 등이 나타난다. ⑥ 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우 8. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항 1) 정해진 용법, 용량을 잘 지킬 것. 2) 정기간 계속 복용하지 말 것. 3) 복용시에는 음주하지 말 것. 4) 바르비탈계 약물, 심하게 항우울제 및

저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위

자사포장단위

※ 본 약품은 KGMP 적격업체에서 생산하여 엄격한 품질관리를 통한 제품입니다. 만약 약품이 사용기한 또는 유효기간이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 약품은 구입한 약국 및 약품 판매처를 통하여 교환하여 드립니다. 제품에 관한 문의 및 이 첨부문서의 작성일자(2016년 02월 11일) 이후 변경된 내용의 확인은 식품의약품안전처 온라인의약품안전관리(www.yuyuy.co.kr)나 크로스바(식약처) 080-070-0701로 하시기 바랍니다.

제조회사

유유제약 (주)유유제약

서울사무소: 서울시 중구 동호로 197 유유빌딩
본사·공장: 충북 제천시 바이오헬스 1로 94

제조사

RP Corp (주)알피

경기도 화성시 남양읍 제양공단4길 35-7