



소화성궤양치료제

에소프라졸[®] 40mg

(에소오메프라졸나트륨수화물)



Esoprazol Tab.

■ 성분·함량: 1정 중
에소오메프라졸나트륨수화물(EP) 43.38mg
(에소오메프라졸로서 40mg)

■ 성상
분홍색의 원형 필름코팅정

■ 효능·효과

1. 위식도 역류질환(GERD)
 - 미란성 역류식도염의 치료
 - 식도염 환자의 재발 방지를 위한 장기간 유지요법
 - 식도염이 없는 위식도 역류질환의 증상치료요법
2. 헬리코박테리얼리 박멸을 위한 항생제 병용요법
 - 헬리코박테리얼리 양성인 십이지장궤양의 치료
 - 헬리코박테리얼리 양성인 소화성궤양 환자의 재발방지
3. 비스테로이드소염진통제(COX-2 비선택성, 선택성) 투여와 관련된 상부 위장관 증상(통증, 불만감, 작열감) 치료의 단기요법
4. 지속적인 비스테로이드소염진통제 투여가 필요한 환자
 - 비스테로이드소염진통제 투여와 관련된 위궤양의 치료
 - 비스테로이드소염진통제 투여와 관련된 위궤양 및 십이지장궤양의 예방
5. Zollinger-Ellison 증후군의 치료
6. 정맥주사로 위궤양 또는 십이지장궤양에 의한 재출혈 예방 유도 이후의 유지 요법

■ 용법·용량

아 약물 등 다른 약제와 함께 삼켜야 하며 씹거나 부수어서는 안된다.

1. 성인

1. 성인
 - 위식도 역류성 질환(GERD)
 - 미란성 역류식도염의 치료: 4주동안 1일1회, 1회 40mg을 투여한다. 식도염이 치료되지 않거나 증상이 계속되는 환자의 경우 4주 더 복용한다.
 - 식도염 환자의 재발 방지를 위한 장기간 유지요법: 1일 1회, 1회 20mg
 - 식도염이 없는 위식도 역류질환의 증상치료요법: 1일 1회, 1회 20mg, 4주후에도 증상 조절이 되지 않을 경우 추가 진료가 필요하다.
 - 일단 증상이 완화되면 그 후 연속되는 증상은 1일 1회, 1회 20mg을 투여하여 조절한다.
 - 성인에서, 1일 1회, 1회 20mg을 필요시마다 투여할 수 있다. 비스테로이드소염진통제 투여로 위궤양 및 십이지장궤양의 발현 위험이 높은 환자에게는 연속되는 증상 조절을 위해 필요시마다 투여하는 것을 권장하지 않는다.
 - 헬리코박테리얼리 박멸을 위한 항생제 병용요법
 - 약 20mg을 아목시실린 1g, 클라리트로마이신 500mg과 병용하여 1일 2회, 7일간 투여한다.
 - 비스테로이드소염진통제(COX-2 비선택성, 선택성)투여와 관련된 상부 위장관 증상(통증, 불만감, 작열감) 치료의 단기요법: 1일 1회, 1회 20mg, 4주후에도 증상이 조절이 되지 않을 경우 추가 진료가 필요하다. 4주를 초과하는 임상시험은 실시하지 않았다.
 - 지속적인 비스테로이드소염진통제 투여가 필요한 환자
 - 비스테로이드소염진통제 투여와 관련된 위궤양의 치료: 1일 1회, 1회 20mg 치료기간은 4~8주이다.
 - 비스테로이드소염진통제 투여와 관련된 위궤양 및 십이지장궤양의 예방: 1일 1회, 1회 20mg.
 - Zollinger-Ellison 증후군의 치료
 - 진단 초기 용량은 40mg 1일 2회 투여이다. 이후 용량은 환자별로 조절되어야 하며, 임상증상이 있는 동안 치료를 지속해야 한다. 임상상태에 따르면, 대부분의 환자는 1일 80~160mg의 용량에서 조절 가능하다. 1일 80mg 이상의 용량은 1일 2회로 나누어 복용하도록 한다.
2. 정맥주사로 위궤양 또는 십이지장궤양에 의한 재출혈 예방 유도 이후의 유지 요법
 - 정맥주사로 위궤양 또는 십이지장궤양에 의한 재출혈 예방 유도 이후 4주동안 1일1회, 1회 40mg을 투여한다.

2. 12세 이상의 청소년

1. 위식도 역류성 질환(GERD)
 - 미란성 역류식도염의 치료: 4주동안 1일1회, 1회 40mg을 투여한다. 식도염이 치료되지 않거나 증상이 계속되는 환자의 경우 4주 더 복용한다.
 - 식도염이 없는 위식도 역류질환의 증상치료요법: 1일 1회, 1회 20mg, 4주후에도 증상 조절이 되지 않을 경우 추가 진료가 필요하다.
 - 일단 증상이 완화되면 그 후 연속되는 증상은 1일 1회, 1회 20mg을 투여하여 조절한다.
 - 성인에서, 1일 1회, 1회 20mg을 필요시마다 투여할 수 있다. 비스테로이드소염진통제 투여로 위궤양 및 십이지장궤양의 발현 위험이 높은 환자에게는 연속되는 증상 조절을 위해 필요시마다 투여하는 것을 권장하지 않는다.
2. 12세 미만의 소아: 이 약을 12세 미만의 소아에 투여한 경험은 없다.
3. 신기능장애: 용량을 조절할 필요는 없다. 중증의 신부전환자에 투여한 예가 없기 않기 때문에 신중히 투여해야 한다.
4. 간기능장애: 경증-중등도의 간장애 환자에서 용량을 조절할 필요는 없다. 중증 간장애환자의 경우 약 20mg 용량을 초과해서는 안된다.
5. 고령자: 용량을 조절할 필요가 없다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음을 환자에는 투여하지 말 것.

1. 이 약, 이 약의 구성성분 또는 벤조이미다졸류에 과민반응 및 그 병역이 있는 환자
2. 페니실린계 항생제에 과민반응 환자(헬리코박테리얼리 박멸을 위해 아목시실린과 병용요법시)
3. 마크로라이드계 항생제 과민반응 환자(헬리코박테리얼리 박멸을 위해 클라리트로마이신과 병용시에 한함)
4. 테트라사이클, 시사리도, 티모지나, 아스테마졸을 투여 받고 있는 환자 (헬리코박테리얼리 박멸을 위해 클라리트로마이신과 병용시에 한함, X4, 상호작용할 참조)
5. 아티라지나비로 및 네파비나비르를 투여 중인 환자(4. 상호작용할 참조)
6. 수유부
7. 심근경색 및 그 병역이 있는 환자

2. 이상반응

1. 다음의 이상반응이 임상시험과 시판 후 조사에서 확인 또는 의심되었다.
 - 옅은 장상반응 없었다. 이상반응을 빈도에 따라 분류하였는데 >1/100, <1/10; 때때로 >1/1,000, <1/100; 드물게 >1/10,000,

- <1/1,000; 매우 드물게 <1/10,000.
- 혈액 및 림프계: 드물게 백혈구감소증, 저혈소판증, 매우 드물게 무과립구증, 백혈구감소증
- 면역계: 드물게 발열, 혈관부종, 아나필락시스 반응/쇼크 등과 같은 과민반응
- 대사/영양: 때때로 말초 부종, 드물게 저나트륨혈증, 매우 드물게 저마그네슘혈증(중증의 저마그네슘혈증은 저칼슘혈증을 유발할 수 있다. 저마그네슘혈증은 또한 저칼슘혈증을 유발할 수 있다).
- 정신계: 때때로 불안, 드물게 초조, 정신 혼란, 우울, 매우 드물게 공격성, 환각
- 신경계: 자주 두통, 때때로 어지럼(dizziness), 시각이상, 졸음, 드물게 마직장애
- 시각: 드물게 흐린시력
- 청각 및 미로계: 때때로 어지럼(vertigo)
- 호흡기계: 드물게 기관지염
- 위장관계: 구갈증, 자주 복통, 변비, 설사, 복부팽만감, 구역·구토, 때때로 위장관조동, 드물게 구내염, 위궤양과 칸디다증, 매우 드물게 현미경적 결장염
- 간담도계: 때때로 간효소 증가, 드물게 황달을 동반하거나 동반하지 않는 간염, 매우 드물게 간부전, 기존 간질환이 있는 환자에서 뇌병증
- 피부 및 피하조직: 때때로 두드러기, 가려움, 발진, 두드러기, 드물게 발모, 광각수선, 매우 드물게 다형홍반, 피부접막만종증(쿠스틴스-존슨증후군), 특발성피피사용체(레일증후군)
- 근육계: 구갈, 드물게 관절통, 근육통, 매우 드물게 근육쇠약
- 신장 및 비뇨기계: 매우 드물게 간질신장염
- 생식계: 매우 드물게 여성형유방
- 전신 및 투여부위: 드물게 무력증, 발한증가
- 감염: 클로스트리움 디피테리움 설사(빈도불명)

- 2) 이외에 다음의 이상반응이 1% 미만의 발생률로 이 약과 관련이 있거나 또는 관련 가능성이 있는 것으로 보고되었다.
 - 전신: 복부발진, 알레르기 반응, 등통, 흉통, 흉골하통, 연면부종, 연면홍조, 피로, 발열, 인플루엔자사상, 일반부종, 다리부종, 권태, 통증, 경직, 무력증, 말초부종
 - 심혈관계: 초조, 고열감, 빈맥
 - 내분비계: 갑상선종
 - 소화기계: 대장과민증, 변비/하혈, 소화불량, 연하과민, 위장관통증, 상복, 상복부통, 트림, 식도장애, 위장장애, 위궤양, 위장관염, 말초혈, 흑색변, 구갈증, 인두장애, 구강장애, 위궤양, 위궤양 증상, 혈중가스조동, 하혈, 하혈, 하부통, 개장성 증, 구역, 구토
 - 청각: 귀울림, 이명
 - 열역계: 빈혈, 자색소반혈, 지강경염/피절병증, 코피, 백혈구증가증, 백혈구감소증, 혈소판감소증
 - 간: 빌리루빈증, 간기능 이상, ALT 증가, AST 증가
 - 대사/영양: 당뇨, 고요산혈증, 저나트륨혈증, ALP증가, 구갈, 비타민 B₁₂결핍, 체중증가, 체중감소
 - 근골격계: 관절염/관, 관절염, 경련, 섬유근통증후군, 탈장, 저마티스신 다발성근육통, 관절염
 - 정신신경계: 식욕부진, 두근거림, 식욕증가, 혼란, 우울증, 과다근육긴장증, 초조, 감각저하, 발기부전, 불면증, 편두통, 편두통약, 수면장애, 떨림, 어지럼(dizziness, vertigo), 시야결함, 시각이상, 졸음
 - 생식계: 월경증, 월경장애, 질염
 - 호흡기계: 천식악화, 기침, 호흡곤란, 후두부종, 인두염, 비염, 부비동염
 - 피부/부속기관: 여드름, 항문/귀/귀, 발진, 홍반발진, 반구진발진, 혈관부종, 피부부, 가려움, 두드러기, 발한증가
 - 특수감각: 중이염, 이성각증, 미각이상, 마취도약
 - 비뇨기계: 소변이상, 방광염, 방광염, 뇨배관염, 전진감염, 혈뇨, 배뇨장애, 칸디다증, 알부민뇨, 당뇨
 - 시각: 결막염, 시각이상
 - 내시경 검사에 발견된 이상반응: 십이지장염, 식도염, 식도협착, 식도궤양, 식도정맥류, 위궤양, 위염, 위장염 또는 결절, 바레트식도(Bartlett's esophagus), 점막박선, 탈장

3. 일반적 주의

- 1) 이 약으로 인해 악성종양의 증상이 완화되거나 진단이 지연될 수 있으므로 악성 종양이 의심되는 경우 종양의진단하지 않은 현저한 체중 감소, 재발성 구토, 삼킴곤란, 토혈, 흑색변 등이 있으면서 위궤양이 있거나 의심되는 경우 악성기 아암을 확인하고 투여해야 한다.
- 2) 이 약으로 장기간 치료할 경우(최대 1년 이상) 환자는 정기적으로 검사를 받아야 한다.
- 3) 이 약을 필요시 투여하는 환자에서는 증상의 변화가 있을 때 의사와 상담하도록 주의시킨다. 이 약을 필요시 투여하도록 처방받은 경우 이 약의 활동능도 변동으로 인한 다른 약물의 상호작용을 고려해야 한다.
- 4) 헬리코박테리얼리 박멸을 위한 항생제 병용요법으로 이 약과 같이 투여하는 항균제의 사용설명서를 참조해야 한다. 클라리트로마이신은 강력한 CYP3A4 억제제이므로 시사리도과 같이 CYP3A4에 의해 대사되는 다른 약물을 복용하고 있는 환자에서 병용요법을 실시할 경우에는 클라리트로마이신의 용기 및 상호작용을 고려해야 한다.
- 5) 프로톤펌프억제제에 의해 위산 분비가 감소한 위궤양에 보통 존재하는 세균의 수 증가한다. 이 약으로 치료할 때 심혈관, 칼슘대사, 클로스트리움 디피테리움과 같은 세균에 의한 위궤양의 감염 위험이 약간 증가할 수 있다. 이것은 클로스트리움 디피테리움 설사 위험성 증가와 연관이 있으며 특히 입원환자에서 이러한 위험성이 증가되었다는 여러 관찰연구 결과가 보고되었다. 이러한 전전은 설사증상에 개선되지 않았을 때 고려되어야 한다. 클로스트리움 디피테리움 설사는 거의 모든 항균제 사용 중 보고되고 있다.
- 6) 일부 해의 역학연구에서 프로톤펌프억제제(Proton Pump Inhibitor) 치료와 관련성, 소독 및 척추 골절의 위험성 증가와 관련이 있을 가능성이 있다고 보고되었다. 골절의 위험은 권장용량을 초과하는 고용량을 투여한 후와 1년 이상의 장기사용 환자에서 증가되었다. 오메프라졸 및 에소오메프라졸과 같다(공통성) 골절의 빈도증가가 밝혀진 것은 아니나, 골다공증 및 골다공증성 골절이 진행될 위험이 있는 환자의 경우 최상의 신상 지침에 따라 적절한 임상적 모니터링이 필요하다.
- 7) 3개월 이상 프로톤펌프억제제(Proton Pump Inhibitor) 치료를 받은 환자들에서 저마그네슘혈증이 드물게 보고되었으며, 1년 이상 치료를 받은 경우에 가장 많이 나타났고, 대부분의 환자들에게서 저마그네슘혈증의 치료로서 마그네슘보충 및 프로톤펌프억제제(Proton Pump Inhibitor) 투여 중단이 필요했다. 장기간 치료에 필요한지 다하지 않는 저마그네슘혈증을 유발하는 약물에, 이노제를 병용투여하는 환자들은 치료 시작을 포함한 주기의 저마그네슘 수치 모니터링이 필요하다. 중대한 이상반응은 감작, 부정맥, 발작을 포함한다.
- 8) 실험적 연구와 간의 간섭: 증가된 CgA(serum chromogranin A) 수치는 신경 내분비 종양 검사에서 유용성을 잃을 수 있다. 이 간섭을 피하기 위해 CgA 측정치가 적어도 5일 전 일시적으로 에소오메프라졸 투

여를 중지해야만 한다.

- 9) 메토크세이트 : 프로토펙트 억제제와 메토크세이트(주로 고용량을 사용하는 경우, 메토크세이트의 '사용상의 주의사항', 참조)를 병용하는 경우 메토크세이트 그리고/또는 그 대체제의 혈청 농도가 상승 및 지속되어 메토크세이트의 독성이 나타날 수 있다는 문헌보고가 있었다. 고용량의 메토크세이트를 사용하는 경우, 프로토펙트 억제제의 일시적인 투여 중단을 고려할 수 있다(4. 상호작용 참조).
- 10) 치료시 경과를 충분히 관찰하고 증상에 따라 이 약을 최소용량 및 적절한 치료기간으로 투여하여야 한다.

4. 상호작용

- 1) 이 약 투여 중 위나 신도 감소로 인해 위 산도에 의해 흡수 기전이 영향을 받는 약물의 흡수가 증가 또는 감소될 수 있다. 다른 산 분비 억제제나 재산제와 마찬가지로 이 약 투여 중에는 케토프롤렌과 이트라코나졸 및 엘로티닙의 흡수가 감소될 수 있고 디곡신의 흡수가 증가할 수 있다. 건강한 자원자에서 오메프라졸(하루에 20mg)과 디곡신의 동시투여는 디곡신의 생체이용률을 10%정도 증가시켰다(10명의 자원자 중 2명은 30%까지 증가). 이 약은 오메프라졸의 아성체이다. 따라서 이 약은 디곡신과 병용투여시 환자의 상태는 모니터링되어야 한다.

- 2) 이 약은 CYP2C19과 CYP3A4에 의해 대사된다. 그리고 이 약은 이 약의 주요 대사효소인 CYP2C19을 저해한다. 디아제팜, 시탈로프람, 이미프란, 클로미프란, 페니토인, 와르파린 등과 같이 CYP2C19에 의해 대사는 약물과 병용시 이들 약물의 혈청 농도가 증가될 수 있으므로 이 약을 약물의 감량이 필요할 수 있다. CYP2C19 기질인 디아제팜과 이 약 30mg의 병용투여로 디아제팜의 청소율이 45% 감소되었다. 간질환자에게 페니토인과 이 약 40mg의 병용투여로 페니토인의 혈장농도 최저치가 13% 증가되었다. 이 약을 투여하기 시작하거나 중단 할 때 페니토인의 혈청 농도를 모니터링하도록 한다. 오메프라졸(1일 1회 40mg 투여)은 보리코나졸(CYP2C19 기질)의 C_{max} 와 AUC를 각각 15% 및 41% 증가시켰다.

- 임상시험에서 와르파린을 투여하고 있는 환자에게 이 약 40mg을 병용 투여하였을 때 응고 시간은 정상 범위에 포함되었다. 그러나 시판 후 조사에서 두 약물을 병용투여하는 동안 임상적으로 유의한 INR과 프로트롬빈 시간의 상승이 몇 건 보고되었으며 이는 비정상적혈소판성이나 사망까지 초래할 수 있다. 그러므로 와르파린 또는 다른 쿠마린 유도제와 이 약과의 병용투여를 시작하거나 중단할 때 모니터링이 필요하다.

- 3) 이 약은 CYP2C19과 CYP3A4에 의해 대사된다. 이 약과 CYP3A4 저해제인 클레르트로마이신(500mg 1일 2회 투여)을 동시에 투여하면 이 약의 AUC가 2배로 증가된다. 이 약과 CYP2C19, CYP3A4 저해제의 병용투여는 이 약의 노출을 두 배 이상 증가시킬 수 있다. CYP2C19, CYP3A4 억제제인 보리코나졸은 오메프라졸의 AUC를 280%까지 증가시켰다. 이 때문에 이 약의 용량을 조정할 필요가 없다. 그러나, 중증의 간기능 장애환자와 장기간의 치료가 필요한 환자에게서는 용량조절을 고려하여야 한다.

- 4) CYP2C19나 CYP3A4 혹은 두가지 모두를, 리ம்ப피신과 세린토스 유체) 유한다고 알려진 약물들은 에소오메프라졸 대사를 증가시킴으로써 에소오메프라졸 혈청 농도를 감소시킬 수도 있다. 이 약과 리ம்ப피신 또는 세린토스 유체의 병용투여를 피한다.

- 5) 이 약 뿐만 아니라, 오메프라졸도 CYP2C19의 억제제로써 작용한다. 고지혈증에서 건강한 자원자에게 40mg의 오메프라졸을 투여한 경우 실로스타톨의 C_{max} 와 AUC가 각각 18%와 26% 증가하였고 실로스타톨의 혈청 대체제 중 하나의 C_{max} 와 AUC는 각각 29%와 69% 증가하였다.

- 6) 건강한 자원자에게 오메프라졸(40mg 1일 1회 투여)과 아타자나비르 300mg/리토나비르 100mg를 병용투여했을 때 아타자나비르의 노출이 감소했다(AUC, C_{max} , C_{min} 이 약 75% 감소). 아타자나비르 400mg 1일 4회 투여는 오메프라졸의 아타자나비르 노출에 대한 영향을 상쇄시킬 수 없다. 이 약을 포함한 프로테옴프 억제제들은 아타자나비르와 병용투여할 수 없다.

- 7) 오메프라졸은 몇 개의 항 바이러스제와 상호작용이 있는 것으로 보고되었다. 이 보고된 상호작용 및 임상적 중요성과 기전은 밝혀지지 않았다. 오메프라졸 투여시의 위산 감소는 항 바이러스제의 흡수를 변화시킬 수 있다.

- 가능한 상호작용의 또 다른 기전은 CYP2C19이며, 아타자나비르 및 넬비나비르와 같은 항바이러스 제제에서는 오메프라졸과 병용 투여시 혈청수치 감소가 보고되었으며 병용투여는 권장되지 않는다. 그 외 사퀴나비르와 같은 항바이러스 제제에서는 혈청수치 증가가 보고되었다. 오메프라졸과 병용 투여시 혈청수치가 변하지 않는 항바이러스 제제 또한 존재한다. 오메프라졸과 에소오메프라졸은 유사한 약력학/약동학적 특성을 갖고 있으므로 아타자나비르 및 넬비나비르와 같은 항바이러스제와 병용투여해서는 안된다.

- 8) 건강한 자원자에게 시사프리드와 이 약 40mg을 병용투여했을 때 시사프리드의 AUC가 32% 증가되고 배설 반감기가 31% 연장되었으나, 최고 혈장 농도의 유의한 증가는 없었다. 이러한 상호작용으로 삼중 전가성제에 대한 시사프리드의 영향이 변경되지 않았다. 즉, 시사프리드 단독 투여에 의한 QTc 간격의 근소한 연장 외에 이 약과 시사프리드의 병용투여에 의해 더 이상 QTc 간격이 연장되지는 않았다.

- 9) 이 약은 아로실리핀 또는 퀴니딘의 약동특성에 임상적으로 유의한 영향을 미치지 않았다.

- 10) 이 약과 나프록센 또는 로페카시브의 병용 투여를 단기간 평간한 시험에 의하면 임상적으로 연관있는 약동학적 상호작용이 나타나지 않았다.

- 11) 건강한 자원자로부터의 연구결과로부터 클로피도그렐(조기용량 300mg/ 유지용량 1일 75mg)과 에소오메프라졸(경구투여 1일 40mg)은 약동학/약력학적인 상호작용이 있는 것으로 보여졌으며, 이것은 평균 14% 정도 혈소판 응집을 감소시키는 것으로 보여졌으며 클로피도그렐의 활성 대체제의 노출을 평균 40% 정도 감소시키는 것으로 나타났다. 이 결과에 근거하여 에소오메프라졸과 클로피도그렐은 병용투여하지 않도록 한다.

- 12) 이상반응 사례 보고, 집단약동학 연구(population pharmacokinetic studies) 및 후향적 연구 등에서 메토크세이트(주로 고용량을 사용하는 경우, 메토크세이트의 '사용상의 주의사항', 참조)와 프로토펙트 억제제를 병용하는 경우 메토크세이트 그리고/또는 그 대체인 히드록시메토크세이트의 혈청 농도가 상승 및 유지되어 메토크세이트의 독성이 나타날 수 있다고 보고되었다. 그러나 고용량의 메토크세이트와 프로토펙트 억제제에 대한 정식 약물상호작용연구는 수행되지 않았다(3. 일반적 주의사항 참조).

- 13) 이 약과 타크로리무스를 병용하면 타크로리무스의 혈청치가 증가할 수 있다.

- 14) 헬리코박터피로리 박멸을 위한 항생제 병용요법 : 클레르트로마이신 및/또는 에리트로마이신을 피오지드와 병용 투여시 심부정맥(OT) 연장, 심실성 빈맥, 심실세동, Torsades de pointes 포함이 나타나고 이는 클레르트로마이신 및 에리트로마이신에 의해 이들 약물의 간대사가 방해 받기 때문인 것으로 외국 의약품 조사결과 보고되었으며 치명적인 사례도 보고되었다.

5. 임부에 대한 투여

- 이 약의 임신 중 노출에 대한 데이터는 제한되어 있다. 동물실험 결과 배/태자 발달과 관련하여 직·간접의 유해작용은 나타나지 않았다. 라세미체 혼합물의 동물실험 결과 임신, 분만 또는 분만후 발달에 대한 직·간접의 유해작용도 나타나지 않았다. 그러나 이 약을 임부에 처방시 주의해야 한다.

6. 수유부에 대한 투여

이 약이 사람의 모유 중으로 이행하는지 여부는 알려져 있지 않다. 수유부를 대상으로 한 시험은 실시되지 않았으므로, 이 약을 수유 중 투여해서는 안된다.

7. 과량 투여시의 처리

계획된 과량투여(240mg/day 용량의 제한된 경험)와 관련해서 나타나는 증상은 일시적이다. 이 약 80mg을 1회 투여한 경우 별다른 문제가 없었다. 특이적인 해독제는 알려져 있지 않다. 이 약은 단백결합율이 아주 높기 때문에 투석되지 않는다. 따라서 과량투여시 대증요법 및 일반 유지요법을 사용하여야 한다.

8. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.

■ 저장방법

가밀용기, 실온(1~30°C)보관

■ 포장단위

28정

※ 본 제품은 우수약의품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 의하여 엄격한 품질관리를 완료한 제품입니다. 사용기한이 지나거나 유통과정 중 변질, 변색 또는 오손된 제품이 있으면 사용하지 마시고, 구입한 약국이나 담당약업소에서 교환하시기 바랍니다.

※ 약의품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하시기 바랍니다.

※ 첨부문서에 기재되지 않은 이상반응이 나타날 경우, 의사나 약사 또는 한국약물안전관련(drugsafe.or.kr) 약물관류제(사)에 보고에 알리시기 바랍니다.

※ 제품 개봉 시 도는 취급 시에 포장재용기, 케이스에 상처를 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

※ 이 약은 의사 또는 치과의사의 처방에 의하여 복용할 수 있는 전문의약품입니다. 이 약의 올바른 복용법을 모르거나 이 약 및 질병에 대한 의문사항이 있는 경우 의사·약사와 상담하시기 바랍니다.

이 첨부문서 개정일(15년 12월) 이후 변경된 내용은 www.kdpharma.co.kr 나 02-576-6121, 30세 확인할 수 있으며, 약품용 용어설명 및 기타 자세한 약품용 정보는 온라인약도서관(<http://drug.mids.go.kr>)을 참조하시기 바랍니다.

※ 이 약을 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 복용할 때 개봉하십시오.

제조원 : 신일제약(주)

공정 : 충청북도 충주시 양성면 북상길 28

제조·의뢰 : 판매원 : 경동제약(주)

공정 : 경기도 화성시 양감면 제갈단지로 224-3

소비자 상담실 전화번호 : (02)576-6121, 3



경동제약주식회사