가로규격(mm)	세로규격(mm)	원료약품(pt)	본문(pt)	컬러
140	297	8	8	Black

JW 신약 | 일반의약품

의약품 분류번호 | 325

모나에스캡슐

□원료약품 및 그 분량

1캡슐 중
- 유효성분 :
 L-시스틴(KP)……20.0mg
 p-아미노벤조산(USP)……20.0mg
 약용효모(별규)……100.0mg
 케라틴(별규)……20.0mg
 (총 아미노산으로서 히스티딘 1.22mg, 류신 4.91mg, 리신 4.1mg)
 티아민질산염(KP)……60.0mg
 판토텐산칼슘(KP)……60.0mg
- 첨가제(타르색소) : 황색5호, 황색203호, 청색1호, 적색40호
- 첨가제(동물유래) : 케라틴(돼지-발톱), 젤라틴(소-가죽, 돼지-피부)
- 기타첨가제 : 스테아르산마그네슘, 캡슐제, 콜로이드성이산화규소, 크로스포비돈

□성상

연회색 가루의 내용물이 든 상부는 녹색, 하부는 미황색의 불투명한 경질캡슐이다.

□효능·효과

1. 손상된 모발, 감염성이 아닌 손톱의 발육 부진
2. 탈모의 보조치료

□용법·용량

- 성인 : 1회 1캡슐을 1일 3회 식후에 복용한다.
- 12세 이상 소아 : 1회 1캡슐을 1일 1~2회 식후에 복용한다.
- 12세 미만은 복용하지 않는다.

□사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응 사람
 2) 12세 미만 소아
2. 다음과 같은 사람은 복용 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
 2) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여할 것.
3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 1) 위통, 구토 등 위장관 불쾌감과 발한, 빈맥, 가려움, 두드러기, 두통, 어지럼, 홍조
 2) 두부이외의 신체부위에서 발모현상이 나타나는 경우
 3) 정해진 용법·용량대로 3~4개월 사용 후에도 증상의 개선이 보이지 않을 경우
 4) 증상이 지속되거나 기대하는 효과가 나타나지 않는 경우
4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 1) 설폰아미드 제제와 동시 복용 시 주의할 것.
 2) 흉터로 인한 탈모나 안드로젠 유전성 탈모증, 남성형 대머리에는 사용하지 말 것.
 3) 이 약은 당뇨병환자에 복용할 수도 있다.
 4) 평균 치료 기간은 3~6개월이다.
5. 저장상의 주의사항
 1) 사용기한이 초과된 것은 복용하지 말 것.
 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

□포장단위

90캡슐, 180캡슐

□저장방법

차광기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

□제조의뢰자 및 제조자

- 제조의뢰자 : 제이더블유신약(주) 경기도 평택시 산단로 88-24
- 제 조 자 : (주)마더스제약 경상북도 경산시 진량읍 공단6로 24길 18

□첨부문서 작성연월일

2022.10.20
- 이 첨부문서 작성연월일 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.jw-shinyak.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

□교환 및 제품문의

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 통한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나, 변질·부패 또는 오손된 제품 등은 약국 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다. 또한 제품에 관한 문의사항이 있으시면 연락주십시오.
 연락처 : 고객만족팀 **1588-4675 / 080-090-6777**(수신자부담)
- 본 약제 투약 또는 복용 후 부작용(이상사례)이 발생한 경우 한국의약품안전관리원(**1644-6223, 14-3330**)으로 문의 및 보고하여 주시고, 동일기관에 의약품 부작용 피해구제 신청을 하실 수 있습니다.

JW 신약
제이더블유신약(주)

MSC-1-F