



편안한 장을 위한 효과빠른 치료제

락토딘 캡슐

K G M P
일반의약품
분류번호 02370

[원료약품 및 그 분량]

1캡슐(339 mg) 중

락토바실루스스프로게네스균(별규) (생균수로서 2×10^9) 20.00 mg

우르스테옥시물산(KP) 10.00 mg

동물유래성분(유당수화물 / 소 / 우유)

[성상] 흰색 내지 미황색의 분말이 든 상. 하부 담황색의 경질캡슐제

[효능 · 효과]

소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 체할, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감, 정장변비, 묽은 변, 복부(배부)팽만감, 장내이상발효

[용법 · 용량] 만 8세 이상 : 1회 1캡슐, 1일 3회

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 만 7세 이하의 어린이

2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 의사의 치료를 받고 있는 환자

2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성

3) 다른 약물을 복용하고 있는 사람

3. 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

상당시 이 첨부문서를 소지할 것.

2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.

2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여할 것

5. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것

3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

[저장방법] 밀폐용기, 실온($1 \sim 30^\circ\text{C}$)보관

[사용(유효)기간] 제조일로부터 36개월

[포장단위] 10캡슐

[소비자 상담실] 043-881-6333

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다.

※ 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해 드립니다.

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 설명서 작성일자(2015년 12월 23일) 이후 변경된 내용은 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

[제조(회)자] 한솔신약(주) / 충북 음성군 금왕읍 청평길 2-11

[제조자] 일양약품(주) / 경기도 용인시 기흥구 하갈로 110

작성 연월일 : 2015.12.23