

항산화제가 보강된 근육경련 및 협착순환 개선제

뉴먼트마하

연질캡슐

육체피로/어깨·목결림/눈떨림/손발저림
산화마그네슘, 베타카로틴, 감마오라자놀, B1, B6, B12, Vit.E

[성분·함량] 1캡슐 중

산화마그네슘(KP)(마그네슘으로서 150mg).....	250mg
토코페롤아세테이트(KP)(비타민E로서 500IU).....	500mg
γ-오라자놀(KP).....	5mg
파리독신염산염(KP).....	17.8mg
시아노코발라민(KP).....	1.8μg
β-카로틴헥사아세트산(KP)(β-카로틴으로서 3mg).....	10mg
티아민질산염(KP).....	50mg
첨가제(KP)(ACS): 청색호 적색4호 황색5호	
첨가제(동물유래성분): 젤라틴(소, 가축), 소산산젤라틴(소, 가축)	
첨가제(식물유래성분): 대두유(콩기름)	

[성상] 적색의 유상물질이 들어있는 적갈색의 장방형 연질캡슐

[효능·효과]

- 다음 경우의 비타민 A, E, B1, B6의 보급
 - 육체피로 - 임신, 수유기 - 병중 - 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시 - 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 눈의 건조감의 완화, 야맹증(밤에 잘 못보는 증상)
 - 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화: 어깨·목결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)
 - 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨결림 등)
 - 각기 - 눈의 피로
- 마그네슘결핍으로 인한 근육경련

[용법·용량] 만 12세 이상 및 성인: 1일 2회, 1회 1캡슐 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 경도 임부에 비타민 A(레티놀)를 1일 5,000 IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A를 5,000 IU/일 이상 투여하지 말 것(비타민 A결핍증 환자는 제외).

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 2) 만 12개월 미만의 적미 3) 심한 증상의 신부전 환자 4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

3. 다음 환자에게는 신중히 투여할 것.

1) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 황장(이차)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질생 유제를 신중히 투여해야 하는 환자 2) 이 약은 황색5호(선색젤라틴 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

4. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

1) 인산염, 칼슘염, 경구(먹는, 복용하는)용 테트라사이클린계 제제, 제산제 2) 레보도파

5. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 ① 외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민 A를 10,000 IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현(기형발생) 증가가 추정된다는 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A 결핍증치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않는다. 또한 비타민 A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000 IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 한다. 3) 심장·순환기계기능 장애 환자 4) 신장(콩팥)장애 환자 5) 저단백혈증 환자 6) 임부

6. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우: 구역, 구토, 가려움, 건조하고 거친 피부, 동증성 관절부종, 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 붉은 변, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다. 3) 에스트로겐을 포함한 경구(먹는, 복용하는)용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있다. 4) 파리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy): 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다. 5) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다. 6) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 출혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다. 7) 장기간 고용량의 비타민 A(베타카로틴으로부터 전환된 것을 제외한) 섭취는 폐기능을 저하, 여성의 골다공증(뼈아름증) 위험을 높일 수 있다. 8) 항알코올제, 트리암테렌과 병용(함께 복용)투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것. 9) 우발적으로 과량복용 한 경우 10) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

7. 일반적 주의

지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 존재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

8. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000 IU 이상을 넘지 않도록 한다. 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

9. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것. 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[고객만족팀] 1588-2675

[사용기간] 제조일로부터 24개월

[포장단위] 120캡슐, 60캡슐

· 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입시 사용기간이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다. · 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 따라, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다. · 의약품을 사용하기전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오. · 개정일자 이후 변경된 하사항 내용은 식약처 온라인 의약품사전 <http://drug.mfds.go.kr>에서 확인하실 수 있습니다.

개정일자: 2016.02.29

[판매원] JW 중외제약

서울특별시 서초구 남부순환로 2477 JW타워

[제조자] 한국프라이마제약(주)

전라북도 완주군 봉동읍 원산면9로 100