

오쿠로닐 정

(나프로닐옥살산염)

【원료약품 및 그 분량】이 약 1정 중

주성분 : 나프로닐옥살산염 (KP)100mg

동물유래성분 : 스테아르산마그네슘 (소, 우지)

부형제 : 메타규산알루미늄산마그네슘, 미결정셀룰로오스

결합제 : 포비돈

붕해제 : 크로스카멜로오스나트륨, 크로스포비돈

활택제 : 콜로이드성산화규소

코팅제 : 오파드라이 흰색 (85F18422)

【성상】

흰색의 원형 필름코팅정

【효능·효과】

1. 뇌혈관 장애
2. 말초혈관 장애

【용법·용량】

성인 : 나프로닐옥살산염으로서 1회 100mg을 1일 3회 경구투여한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 급성 심근경색 환자 2) 출혈성 상태 초기 환자 3) 기립성 조절장애 환자 4) 이 약에 과민반응 환자 5) 고옥살산뇨 또는 재발성 갈슘 신장결석증의 병력이 있는 환자 6) 급성 심장마비 환자 7) 울혈성부전 환자 8) 중증의 심장 전도 결함 환자 9) 중증의 협심증 환자 10) 중증의 저혈압 환자 11) 간장애 환자 12) 발작을 일으킬 수 있는 환자 13) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 신장애 환자(중증의 신부전 환자 포함) 2) 관상동맥죽상경화증 환자

3. 이상반응

- 1) 정신신경계 : 뇌경련 발작, 감각이상, 때때로 불안, 졸음, 불면, 드물게 피로감, 두통, 어지럼 등이 나타날 수 있다. 2) 소화기계 : 식욕부진, 식도염, 구토, 때때로 구역, 위통, 설사 등이 나타날 수 있다. 3) 과민반응 : 두드러기, 혈관부종, 드물게 발진 등이 나타날 수 있다. 4) 간장 : 간염, 쓸개즙정체황달, 급성 간세포 과사, 간효소 증가, 드물게 간부전이 나타날 수 있다. 5) 신장 : 배뇨장애, 옥살산 갈슘 신장결석이 나타날 수 있다. 6) 순환기계 : 혈압저하, 기립성 조절장애, 부정맥, 협심증, 실신, 말초 부종 이 나타날 수 있다. 7) 기타 : 혈당 상승이 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의

- 1) 이 약은 고혈압 치료의 목적으로는 사용하지 않는다. 2) 이 약의 복용은 옥살산 갈슘 신장결석 형성을 일으킬 수 있으므로 충분한 배뇨량을 유지하기 위해 충분한 수분을 섭취한다. 3) 이 약을 취침시에 음료 없이 복용할 경우 국지성 식도염이 나타날 수 있다.

5. 상호작용

- 1) 혈압강화제와 병용 투여시 혈압강화작용이 증가될 수 있다. 2) 부정맥용제와 병용 투여시 부정맥용제의 작용이 증가될 수 있다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임신 중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 투여하지 않는 것이 바람직하다. 2) 모유 중으로의 이행이 보고되었으므로 수유 중에는 투여하지 않는다.

7. 과량투여시의 처리

과량투여에 의해 심전도역제 및 경련이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 위세척을 하고, 필요에 따라 활성탄을 사용한다. 심혈관기능과 호흡을 모니터링하며, 심한 경우 전기심박조율기를 사용하거나 이소프레날린을 투여한다. 경련의 경우 디아제팜을 투여한다.

【저장방법】 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 30정/병, 200정/병

【제조사】 유니메드제약(주) - 충남 아산시 실옥로 110-27

첨부문서 작성년월일 : 2017. 05. 19

※ 이 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품은 약국·병의원 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다.

※ 본 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 아래의 유니메드제약 홈페이지 또는 고객센터를 통해 확인하실 수 있습니다.

홈페이지 (www.unimed.co.kr) ☎고객상담실 : 080-500-5100

UNIMED 유니메드제약

서울특별시 송파구 삼전로 69 (잠실동) 유니메드빌딩