

원료약품 및 분량 : 1캡슐 중

니코틴아미드(KP).....	20 mg
리보플라빈(KP).....	3 mg
아스코르빈산(KP).....	60 mg
티아민염산염(KP).....	2 mg
레티놀팔미테이트(KP).....	5,000 IU
토코페롤아세테이트(KP).....	10 mg
(비타민D로서 10 IU)	
피리독신염산염(KP).....	3 mg

성상 : 황갈색의 내용물이 충전된 암적갈색의 장방형 연질캡슐
효능·효과 :

다음 경우의 비타민A, E, B₁, B₂, B₆, C 의 보급

- 육체피로 • 임신 • 수유기
- 병중 • 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하시 • 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같습니다.
- : 눈의 건조감의 완화, 야맹증(밤에 잘 못 보는 증상)

용법·용량 : 성인 1회 1캡슐, 1일 1회 복용합니다.

저장방법 : 기밀용기, 실온보관(1~30°C)

사용기간 : 제조일로부터 36개월

제조번호 :

사용기한 :

- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품을 사용하지 마십시오.
- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 작성일(2016년 03월 17일)이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)이나 소비자상담실(02-834-2607 수신자부담)로 문의하시어 확인하실 수 있습니다.

[제조사]  **(주)동구바이오제약**

경기도 화성시 향남읍 제약공단 2길 18

[제조·판매자]

 **유한메디카**

충청북도 청주시 청원구 오창읍 연구단지로 219



사용상의 주의사항

1. 경고

임부에 비타민A(레티놀)를 1일 5,000 IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신 가능성이 있는 여성에는 비타민 A를 5,000 IU/일 이상 투여하지 마십시오.(비타민 A결핍증 환자는 제외.)

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 만 3개월 미만의 저역아
- 3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지마십시오. - (1) 레보도파

4. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의 하십시오.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria) : 요중에 과량의 옥살산염이 배설되는 상태
- 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - ① 외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민 A를 10,000 IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현(기형발생) 증가가 추정된다는 역학 조사결과가 있으므로 임신 3개월이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A 결핍증치료를 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 마십시오. 또한 비타민 A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000 IU/일 미만에서 머물도록 하는 등 적절한 주의를 합니다.
- 4) 통풍 환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자
- 5) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 황달(이차성 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의 하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지 하십시오.

- 1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 가려움, 건조하고 가친 피부, 통풍성 관절부종(부기), 위부(상복부)불쾌감, 설사, 변비, 발진, 반점(종려되어 붙어짐), 붉은 변

- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.
- 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 D를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다.
- 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
- 5) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- 6) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia : 혈액중의 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.
- 7) 장기간 고용량의 비타민 A(비타민A)로부터 전환된 것을 제외한 것들 제외) 섭취는 폐경기를 지난 여성의 골다공증(뼈 약화) 위험을 높일 수 있습니다.
- 8) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

6. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오.
- 2) 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000 IU 이상을 넘지 않도록 합니다.
- 3) 각종 요(소변)검사에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
- 4) 요(소변)를 황색으로 변하게 하여 임상검사에 영향을 줄 수 있습니다.
- 5) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절하십시오. 환자가 다른정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면, 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소하십시오.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.