



중 군 당



일반의약품

분류번호 : 03190

용법 · 용량

만 12세 이상 및 성인 : 1회 1정, 1일 1회 복용한다.

사용상의 주의사항

벤포벨정이란?

육체피로 체력저하 눈의피로 근육통 관절통 어깨결림 신경통 구내염(입안염)



합성 비타민
벤포티아민
100 mg 함유

비타민 B군
9종 함유

항산화 성분과
면역체계 강화에
도움되는 아연 함유

비타민 C, D
UDCA
감마오리자놀 함유

효능 · 효과

1. 다음 경우의 비타민 D, E, B1, B2, B6, C의 보급
- 육체피로 - 임신 · 수유기 - 병중 · 병후병을 앓는 동안이나 회복 후의 체력저하 - 발육기 - 노년기
2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다.
- 뼈, 이의 발육불량 - 구루병의 예방
- 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(허리통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
- 각기 - 눈의피로
3. 아연의 보급



✓ 육체피로, 체력저하



✓근육통, 관절통, 신경통



✓구내염(입안염)

성분 · 함량

1정 중

벤포티아민	100.0 mg	우르소데옥시콜산(KP)	30.0 mg
(티아민염산염으로서 72.31 mg)(KP)		산화아연(아연으로서 24 mg)(KP)	30.0 mg
리보플라빈(KP)	100.0 mg	니코틴산아미드(KP)	10.0 mg
피리독신염산염(KP)	100.0 mg	비오틴(USP)	10.0 µg
시아노코발라민 1000배산	100.0 mg	폴산(KP)	10.0 µg
(시아노코발라민으로서 100 µg)(KP)		클레칼시페롤과립(비타민D로서 1,000 IU)(KP)	10.0 mg
제피아스코르브산	52.1 mg	γ-오리자놀(KP)	5.0 mg
(아스코르브산으로서 50 mg)(별규)		판토텐산칼슘(KP)	5.0 mg
이노시톨(KP)	50.0 mg	유비데카레논(KP)	2.0 mg
토코페롤시세레이트 2배산(비타민 E로서 20 IU)(KP)	40.0 mg	정기제(동물유래성분) : 유당(젖당)수화물(소, 우유)	
		정기제(KPTaCS) : 정제 2호	

성상

황갈색의 장방형 필름코팅정

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

① 고칼슘혈증(hypercalcaemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태) 환자. 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환, 신장콩팥질환 환자) ② 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 ③ 만 12개월 미만의 영아 ④ 신장(콩팥) 결석 환자 ⑤ 이 약은 유당(젖당) 수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency), 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

① 인신염, 갑상염, 경구근염, 복용하는용 테트라사이클린계 제제, 제산제 ② 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우는 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.

① 의사의 치료를 받고 있는 환자 ② 고옥살산노증환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살산이 배설되는 상태) ③ 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아-비타민D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증(hypercalcaemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태를 일으킬 수 있다. ④ 심장 · 순환기계기능 장애 환자 ⑤ 신장(콩팥)장애 환자 ⑥ 저단백혈증 환자 ⑦ 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석에 있는 환자 ⑧ 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 중단 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

① 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 설사, 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적(종혈피로 붉어짐), 묽은 변, 위장장애, 소화장애, 상복부(배부)부종, 저혈압, 폐부종(부기) ② 이 약의 투여에 의하여 생기가 예전보다 떨어지거나 많이 점점 없어질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다. ③ 에스트로겐을 포함한 경구약은, 복용하는용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관막형성) 소인이 있는 환자 ④ 비타민D를 복용할 경우 혈전(혈관막형성)의 위험이 증가될 수 있다. ⑤ 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다. ⑥ 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다. ⑦ 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B9를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다. ⑧ 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진 시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 처리하는 능력 장애) 고옥살산증(hyperursemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태) 간손상을 일으킬 수 있다. ⑨ 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다. ⑩ 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용함(복용)시(아세트산) 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것. ⑪ 오발적으로 과량복용한 경우 ⑫ 개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항 ① 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것 ② 각종 요검사에서 혈당의 검출을 방해할 수 있다. ③ 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사시에 영향을 줄 수 있다. ④ 녹차, 홍차 등 탄산을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것


저장상의 주의사항



1 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.



2 직사광선을 피하고 닿을 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.



3 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보전을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃)

소비자상담실

080-6776-0801(수신자 부담)

포장단위

60정, 120정

제 조 자

한국프라임약품 / 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단9로 100

판 매 원

중 군 당 · 본사 : 서울특별시 서대문구 충정로8(충정로 37) · 공점 : 충청남도 천안시 서북구 성거읍 명항로 797-48

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다.
- 구입 시 사용기간이 경과 되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- 본 제품은 공정거래원칙에 고시 소비자 분쟁해결 기준에 따라 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.
- 의약품 사용(복용) 전에 첨부된 서를 주의깊게 읽어와 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 설명서 개정일자 이후 변경된 내용은 식약처(www.mfds.go.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

개정일자 : 2016. 01. 20