

소화성 궤양 치료제
에피움® 20mg/40mg 정
(에스오메프라졸마그네슘이수화물)
EPIUM Tab, 20mg/40mg

 저희 메디코어는 인간중심의 기업. 함께 나눌 줄 아는 기업이란 경영이념을 바탕으로 인류의 건강과 아름다운 삶을 위해 우수한 품질의 제품을 공급해드리고자 노력하고 있습니다. 저희가 생산하는 약품 하나하나에는 생명과 존엄성을 가장 귀한 가치로 여기는 메디코어 임직원들의 정성이 깃들어 있습니다.

분류번호: 232

- | | |
|--|--|
| [성분 · 함량] 1정 중
-20mg: 에소메프롤롤(에스메사아수화물)(당)
첨가제(벤조산) : 황색소료 | 21.69mg(에소메프롤롤로서 20mg)
43.38mg(에소메프롤롤로서 40mg) |
| [성분 · 함량] 1정 중
-20mg: 연홍색의 원형 필름코팅정
-40mg: 분홍색의 원형 필름코팅정 | |

1. 위산도 역류질환(GERD)

- 미인증 여류식도염의 치료
 - 식도염 환자의 내시경시찰을 위한 경장간 유지요법
 - 식도염이 없는 위식도 역류질환의 증상조절요법
2. 헬리코박터필로리 박멸을 위한 항생제 병용요법
 - 헬리코박터필로리 양성인 십이지장궤양의 치료
 - 헬리코박터필로리 양성인 소화성궤관 환자의 재발방지
3. 비스테로이드소염제(COX-2 비선택성 선택성) 투여와 관련된 위장 상부 질환 증상(통증, 불쾌감, 작열감 치료의 난)요법
4. 지속적인 비스테로이드소염제투여 투여가 필요한 환자
 - 비스테로이드소염제투여 투여와 관련된 위장질환 치료
 - 비스테로이드소염제투여 투여와 관련된 위장 및 십이지장궤양의 예방
5. 헬릭스-엘리닉 증후군의 치료
6. 장폐색수술로 위궤양은 십이지장궤양에 의한 재발 예방에도 이환의 유지 요법

이 약은 물 등의 액체와 함께

1. 성인

- 미관상 역류식도염의 치료: 4주동안 1일 1회 1회 40mg를 투여합니다.
- 식도염이 치료되지 않거나 증상이 계속되는 환자의 경우 4주 4주 4주 복용한다.
- 식도염 환자의 재발 방지를 위한 장기유요법: 1일 1회 1회 20mg
- 식도염이 없는 위식도 역류질환의 증상치료요법:
 - 1일 1회 1회 20mg, 4주후에도 증상 조절이 되지 않을 경우 추가 진료가 필요하다.
 - 일단 증상이 완화되면 그 후 연속되는 증상은 1일 1회 20mg를 투여하여 조절한다.
- 성에서부터 1일 1회 1회 20mg를 투여한다. 투여할 수 있습니다. 비스타로이도스염성질환 투여로 위약량 및 심야지각장애의 발현 위험이 높은 환자에게는
- 1일 1회 1회 20mg의 복용량으로 환자에게 병용요법
- 이 약 20mg을 이복합성 1g, 클라리트로마이신 500mg과 병용하여 1일 2회, 7일간 투여한다.
- 비스타로이도스염성질환(COX-2 비스테릭 선택약물)과 관련된 심부 위약량 증식증, 불면감, 지각장애 치료의 단일요법
- 1일 1회 1회 20mg, 4주후에도 증상이 조절이 되지 않을 경우 추가진료가 필요합니다. 4주후 효과를 임상시험은 실시하지 않습니다.
- 지숙적인 비스타로이도스염성질환 투약이 필요한 환자
 - 비스타로이도스염성질환 투여와 관련된 위약량의 치료: 1일 1회 1회 20mg, 치료기간은 4-8주입니다.
 - 비스타로이도스염성질환 투여와 관련된 심부 위약량 및 심야지각장애의 예방: 1일 1회 1회 20mg
- 출생후 4개월은 중추근육의 치료
 - 근육의 경도는 40% 이하 1일 2회 투여한다. 이후 경도는 항진제로 조제하여 하위, 임상증상은 또는 특정 치료를 지속해야 합니다. 임상치료를 따르면, 대
 - 근육의 경도는 1일 80~160mg의 용량에 의해 조절 가능하다. 1일 80mg의 약물의 용량은 1일 2회로 나누어 복용하도록 합니다.
- 장경추근육 위약량은 심야지각장애에 의한 재발할 예방 용도 이외의 경우 사용
- 장경추근육 위약량 또는 심야지각장애에 의한 재발할 예방 용도 이외 4주동안 1일 1회 1회 40mg를 투여한다.

1) 이식도 열려서 진행(GERD)

- 미관성 악영향시도면의 자료: 4주동안 1월 1일, 1일 40m를 투입한다.
· 미관성 저하되지 않으나 중상이 계속되는 환자의 경우 4주 40m 병용한다.
· 미관성이 없는 유선도 미투성으로 중상치료를 한다.
· 1월 1일, 1월 20m, 4주동안 중상 조절이 안되는 것을 경중으로 치료를 필요한다.
· 일단 중상이 완화된후 그 후 연속되는 중상은 1월 1일, 1월 20m를 병용하여 조절한다.
· 생체조직 1월 1일, 1월 20m를 병용되나 투여할 수 있을 경우, 비스테로이드소염진증제 투여에 유래할 때 심근기생검의 발현 위험이 있는 환자에게는 연속되는 중상 조절이 필요 필요치 않으나 투여하는 것을 권장하지 않는다.
· 4, 5, 6, 7, 8주에: 이 약을 가장 먼저 투여한다.
· 4, 5, 6, 7주에는: 용량을 조절할 필요가 없다. 중증의 소생장제제를 투여하여 예외가 있다? 때문에 중증으로 투여하여야 한다.
· 4, 5, 6, 7, 8주에는: 중증의 소생장제제와 간헐적 환자에게서 중상 조절 필요는 없다. 중증 간장질환에 신중히 신우 약 20mg 용량을 초과해서는 안된다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에게 투여하지 않습니다.
- 1) 이 약, 이 약의 구성성분 또는 벤조아미다졸류에 과민반응 및 그 병력이 있는 환자
- 2) 페니실린계 항생제에 과민반응 환자(벤조아미다졸류의 비결핵을 위해 아목시실린과 병용요법)
- 3) 마크로리드계 항생제 과민반응 환자(벤조아미다졸류의 비결핵을 위해 클라리트로마이신과 병용시에 한함)
- 4) 테트라사이클린, 시사프린드, 피오지드, 이소테라졸을 투여 받고 있는 환자(벤조아미다졸류의 비결핵을 위해 클라리트로마이신과 병용시에 한함)(상처치용 진정소)
- 5) 테트라사이클린 및 넷마니버를 투여 중인 환자(상호작용 참조)
- 6) 수유부
- 7) 심근경색 및 그 병력이 있는 환자

2. 아성인능

- 활력 및 임파로 : 드물게 백혈구감소증, 지혈상반응, 매우 드물게 부위괴사증, 범발구강소증
- 면역계 : 드물게 심혈, 혈관부종, 아나필락시스 반/쇼크 등과 같은 과민성
- 신경계 : 드물게 말초 감각 부수동, 드물게 자간뇌출혈(중증의 자간뇌출혈은 저압삼출혈을 유발할 수도 있습니다), 자간뇌출혈 증상은 또한 저압삼출혈을 유발할 수 있습니다.
- 정신계 : 때때로 불안, 드물게 조울, 정신 혼란, 우울, 매우 드물게 공격적 환각
- 신장계 : 자주 두통, 때때로 어지럼(dizziness), 자각이상, 졸음, 드물게 미각장애
- 시각 : 드물게 흐린시력
- 상처 및 모낭개 : 때때로 여진(verigo)
- 호흡기계 : 드물게 기생충 감염, 폐렴, 설사, 복부팽만감, 구역·구토, 때때로 구강건조증, 드물게 구내염, 위궤양 칸디다증, 매우 드물게 비인강 결정형
- 간담도계 : 드물게 간기능 이상 증가, 드물게 황달을 동반하거나 동반하지 않는 간염, 매우 드물게 담주석, 다른 간질환이 없는 환자에서 발생하는 담석
- 피부 및 피막조직 : 때때로 피부염, 가려움, 발진, 두드러기, 드물게 탈모, 광선소성, 매우 드물게 다형성홍, 피부부작형간염후손(스피르미트-존슨증후군), 독성피피 괴사성피부괴사증후군
- 근육골격계 : 골절 드물게 관절통, 근육통, 매우 드물게 근육소식
- 신장 및 뇨관계 : 매우 드물게 잔뇨잔정
- 생식계 : 매우 드물게 여성무월경
- 전신 및 특이부위 : 드물게 출혈, 발한증
- 대변, 콧물,투여부위,두드러기,발진,발열,설사,복통,탈모,비염,두통,두근거림,두통,두통(등불)

- 전신: 복부팽만, 알레르기 반응, 두통, 흉통, 호흡불가, 안면부종, 안구출혈, 피부, 발열, 인플루엔자 유사 증상, 알부뇨증, 다뇨부종, 갈증, 혼수, 경직, 무릎, 말초부종
 - 실험과제: 흉조, 고혈압 비태

- 소화기계 : 대장과민증, 변비약용, 소화불량, 연하곤란, 위장관형성장애, 심복부동증, 트림, 식도장애, 잦은배변, 위장염, 위장관출혈, 딸꾹질, 흑색변, 구강장애, 인두장애, 직장장애, 위장관 증상, 혈중가스트린증가, 하장애, 허부증, 궤양성 구내염, 구토
- 청각 : 귀암모이 이명

— 간: 빌리루빈혈중, 간기능 이상, ALT 증가, AST 증가
— 대/소변: 당뇨, 고요산혈중, 제노트륨혈중, ALP 증가, 구갈, 비타민 B₂결핍, 체중증가, 체중감소
— 근골격계: 관절염과, 관절병증, 경련, 섬유근육통증후군, 탈장, 류마티스성 다발성근육통, 관절통

(dizziness, vertigo), 사자결근, 자지이성, 졸음

- 생식기계: 월경통, 월경장애, 질염
- 호흡기계: 천식, 기관지염, 후두염, 인두염, 비염, 부비염
- 피부/피부과: 여드름, 황반종막색소 침착, 홍반성반, 무반경성반진, 팔자부종, 피부부종, 가려움, 두드러기, 발한증가
- 소화기계: 소화불량, 위산과다, 위염, 위궤양, 위암
- 비뇨기계: 신장염, 신장부전, 방광염, 배뇨곤란, 진균성균, 혈뇨, 배뇨빈수, 림프관종, 생식기전염질환, 다뇨
- 시각: 결막염, 사시이성
- 내이경: 청각 상실, 말린귀 이상반응: 심이차이증, 식도염, 식도협착, 식도재막, 식도조영술, 위궤양, 위염, 양성종양 및 점막암성, 탈장

1) 이 악으로 인해 알성

- [illegible]

1) 이 약 투여 중 의내.

- [illegible]

14) 헥사키발렌틸리온 반

3. 세토, Torsades de pointes 포함이 나타나고 이는 클로르프로미딘 및 리튬이온배터리에 의해 화학 약물의 간섭과 병용을 받기 때문인 것으로 의사와 의약품 조사결과 보고되어지고 있으므로 나타내고 보고되었습니다.
4. 약물에 대한 반응
- 이 약의 임상적 효과는 주로 대마리에는 제제로서 나타납니다. 통풍성 질환과 해색제 전달과 관련하여 작·간염의 유병률증은 나타나지 않습니다. 라세티(합합의 통풍성 질환)와 인산, 분산 또는 분산과 발현에 대한 작·간염의 유병률증은 나타나지 않습니다. 그러나 이 약을 일주에 처방시 주의해야 합니다.
6. 수유부에 대한 투여
- 이 약이 사람의 수유 중으로 이행하는지 여부는 알려져 있지 않습니다. 수유부에 대상으로 한 시험은 실시되지 않았으므로 이 약을 수유 중 투여해서는 안됩니다.
7. 과량 투여시의 처치
- 과량의 과량투여(약40mg/day)중의 제한된 경험의 관련해서 나타나는 증상은 일시적입니다. 이 약 80mg을 1회 투여한 경우 별다른 문제가 없었습니다. 특이적인 해색제는 알려져 있지 않습니다. 이 약은 전해질결핍이 아주 높기 때문에 투석되지 않습니다. 따라서 과량투여시 대증요법 및 일반 유지 요법을 사용해야 합니다.
8. 보충 및 취급상의 주의사항
- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 2) 다른 용기(병, 바구니)에 있는 것은 삼고먹어서는 안됩니다. 특히 어린이들이 도가니를 폐기물처리하여서 버려지더라도 이것을 드물지 않습니다.

124(900-1)814 12816 12817 12818 12819 12820 12821 12822 12823 12824 12825 12826 12827 12828 12829 12830 12831 12832 12833 12834 12835 12836 12837 12838 12839 12840 12841 12842 12843 12844 12845 12846 12847 12848 12849 12850 12851 12852 12853 12854 12855 12856 12857 12858 12859 12860 12861 12862 12863 12864 12865 12866 12867 12868 12869 12870 12871 12872 12873 12874 12875 12876 12877 12878 12879 12880 12881 12882 12883 12884 12885 12886 12887 12888 12889 12890 12891 12892 12893 12894 12895 12896 12897 12898 12899 12900 12901 12902 12903 12904 12905 12906 12907 12908 12909 12910 12911 12912 12913 12914 12915 12916 12917 12918 12919 12920 12921 12922 12923 12924 12925 12926 12927 12928 12929 12930 12931 12932 12933 12934 12935 12936 12937 12938 12939 12940 12941 12942 12943 12944 12945 12946 12947 12948 12949 12950 12951 12952 12953 12954 12955 12956 12957 12958 12959 12960 12961 12962 12963 12964 12965 12966 12967 12968 12969 12970 12971 12972 12973 12974 12975 12976 12977 12978 12979 12980 12981 12982 12983 12984 12985 12986 12987 12988 12989 12990 12991 12992 12993 12994 12995 12996 12997 12998 12999 13000 13001 13002 13003 13004 13005 13006 13007 13008 13009 13010 13011 13012 13013 13014 13015 13016 13017 13018 13019 13020 13021 13022 13023 13024 13025 13026 13027 13028 13029 13030 13031 13032 13033 13034 13035 13036 13037 13038 13039 13040 13041 13042 13043 13044 13045 13046 13047 13048 13049 13050 13051 13052 13053 13054 13055 13056 13057 13058 13059 13060 13061 13062 13063 13064 13065 13066 13067 13068 13069 13070 13071 13072 13073 13074 13075 13076 13077 13078 13079 13080 13081 13082 13083 13084 13085 13086 13087 13088 13089 13090 13091 13092 13093 13094 13095 13096 13097 13098 13099 13100 13101 13102 13103 13104 13105 13106 13107 13108 13109 13110 13111 13112 13113 13114 13115 13116 13117 13118 13119 13120 13121 13122 13123 13124 13125 13126 13127 13128 13129 13130 13131 13132 13133 13134 13135 13136 13137 13138 13139 13140 13141 13142 13143 13144 13145 13146 13147 13148 13149 13150 13151 13152 13153 13154 13155 13156 13157 13158 13159 13160 13161 13162 13163 13164 13165 13166 13167 13168 13169 13170 13171 13172 13173 13174 13175 13176 13177 13178 13179 13180 13181 13182 13183 13184 13185 13186 13187 13188 13189 13190 13191 13192 13193 13194 13195 13196 13197 13198 13199 13200 13201 13202 13203 13204 13205 13206 13207 13208 13209 13210 13211 13212 13213 13214 13215 13216 13217 13218 13219 13220 13221 13222 13223 13224 13225 13226 13227 13228 13229 13230 13231 13232 13233 13234 13235 13236 13237 13238 13239 13240 13241 13242 13243 13244 13245 13246 13247 13248 13249 13250 13251 13252 13253 13254 13255 13256 13257 13258 13259 13260 13261 13262 13263 13264 13265 13266 13267 13268 13269 13270 13271 13272 13273 13274 13275 13276 13277 13278 13279 13280 13281 13282 13283 13284 13285 13286 13287 13288 13289 13290 13291 13292 13293 13294 13295 13296 13297 13298 13299 13300 13301 13302 13303 13304 13305 13306 13307 13308 13309 13310 13311 13312 13313 13314 13315 13316 13317 13318 13319 13320 13321 13322 13323 13324 13325 13326 13327 13328 13329 13330 13331 13332 13333 13334 13335 13336 13337 13338 13339 13340 13341 13342 13343 13344 13345 13346 13347 13348 13349 13350 13351 13352 13353 13354 13355 13356 13357 13358 13359 13360 13361 13362 13363 13364 13365 13366 13367 13368 13369 13370 13371 13372 13373 13374 13375 13376 13377 13378 13379 13380 13381 13382 13383 13384 13385 13386 13387 13388 13389 13390 13391 13392 13393 13394 13395 13396 13397 13398 13399 13400 13401 13402 13403 13404 13405 13406 13407 13408 13409 13410 13411 13412 13413 13414 13415 13416 13417 13418 13419 13420 13421 13422 13423 13424 13425 13426 13427 13428 13429 13430 13431 13432 13433 13434 13435 13436 13437 13438 13439 13440 13441 13442 13443 13444 13445 13446 13447 13448 13449 13450 13451 13452 13453 13454 13455 13456 13457 13458 13459 13460 13461 13462 13463 13464 13465 13466 13467 13468 13469 13470 13471 13472 13473 13474 13475 13476 13477 13478 13479 13480 13481 13482 13483 13484 13485 13486 13487 13488 13489 13490 13491 13492 13493 13494 13495

[포장단위] 28정

제조의뢰자 : (주)메디카코리아 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 96

[illegible]

저희 메디카코리아 제품은 KGMP에 적합하게 철저한 품질관리를 통해서 제조됩니다. 혹시 사용기간이 경과되었거나, 유통과정 중 변질·훼손된 제품은 구입 경로를 통하여 교환해 드립니다.

※ 식품의약품안전처 온라인의약품사전(<http://drugids.gok.go.kr>)을 방문하시면 첨부부서 작성개정일 이후의 최신 제품정보를 확인하실 수 있습니다. 제품문의 및 상담은 본사 마케팅팀(070-4018-8022) 또는 개발부(070-4018-6013~5)로 문의바랍니다.

작성일자 : 2015. 12. 14
MK15121401