

급·만성기관지염 진해제
코프로진® 정
(레보드로프로피진)
COUGHROZIN Tab.

분류번호: 222



저희 메디카코리아는 인간중심의 기업, 함께 나눌 줄 아는 기업이란 경영이념을 바탕으로 인류의 건강과 아름다운 삶을 위해 우수한 품질의 제품을 공급해드리고자 노력하고 있습니다. 저희가 생산하는 의약품 하나하나에는 생명의 존엄성을 가장 귀한 가치로 여기는 메디카코리아 임직원들의 정성이 깃들여 있습니다.

【성분·함량】 1정 중
레보드로프로피진(EP)..... 60mg
첨가제(동물유래) : 유당수화물(소,우유)

【성 상】
흰색 원형 정제

【효능·효과】
다음 질환에서의 기침 : 급·만성기관지염

【용법·용량】
성인: 레보드로프로피진으로서 1회 60mg을 1일 3회 적어도 6시간 간격을 두고 경구투여합니다.
증상에 따라 적절히 증감합니다.

- 【사용상의 주의사항】**
- 다음 환자에는 투여하지 마십시오
 - 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응이 있는 환자
 - 기관지 점액 분비 증가 환자
 - 점액섬모기능이상(카르타게너증후군, 섬모이상운동증) 환자
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
 - 중증의 간장애 환자
 - 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해 효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.
 - 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
 - 중증 심부전 및 중증 신장부전 환자
 - 고령자
 - 만 2세 미만의 영아
 - 이상반응
 - 소화기계 : 구역, 탄산증, 소화불량, 설사, 구토
 - 중추신경계 : 피로, 기능쇠약, 반수, 혼수, 두통, 어지러움
 - 순환기계 : 심계항진
 - 피부 : 매우 드물게 알레르기 반응

- 일반적 주의

드물게 반수상태가 초래되므로 운전이나 기계 조작 시 주의하며, 특히 알코올과 병용 시 작용이 증대 될 수 있습니다.
- 상호작용

예민한 환자에게 진정제와 병용투여 시 주의합니다.
- 임부 및 수유부에 대한 투여

임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부에는 투여하지 않습니다.
- 보관 및 취급상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
 - 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나, 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 주의합니다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

제조의뢰자 : (주)메디카코리아 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 96
제 조 자 : (주)씨엠지제약 경기도 시흥시 공단1대로27번길 27

저희 메디카코리아 제품은 KGMP에 적합하게 철저한 품질관리를 통해서 제조됩니다. 혹시 사용기간이 경과되었거나, 유통과정 중 변질·훼손된 제품은 구입 경로를 통하여 교환해 드립니다.

※식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 방문하시면 첨부문서 작성(개정)일 이후의 최신 제품정보를 확인하실 수 있습니다. 제품문의 및 상담은 제품문의 및 상담은 메디카코리아(02-585-7799)로 문의바랍니다.

작성일자 : 2016.02.22
MK16022201

