[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
30	92	7	5	Black

조 제 용

에시플엔캡슐

[에소메졸 테스실산염수화물]

의약품 분류번호	237
	일반의약품

[illegible]

· 김소 중
바실루스리케니포르미스균(생균)……250mg (비실루스리케니포르미스균으로서 2.5×10⁹개)
김가지(동물유래) : 우당수 이분(소·우유)

[illegible]

정제의 표면이 얇은 장으로 싸인 캡슐제

[illegible]

금연(禁煙), 과민반응, 심사이질, 두통, 설사, 기타 이상 상태 이상일 때

[illegible]

· 성인 : 1회 2캡슐 1일 3회 복용
· 소아 : 1일 1캡슐 복용
· 투여 방법 : 식후 30분 내에 복용하십시오.

[illegible]

본 제품 항생물질과 병용투여하면 디스프로피온산, 이미페넴, 설파시트리디스프로 병용투여 시 효과는 낮아 진다.

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것 : 이 약은 유당을 함유하고 있으므로 갈락토오스 흡수불량증후군(Lapp유당분해효소 결핍증, Lapp lactase deficiency), 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 환자의 유전적인 문제가 있는 환자에는 투여하면 안 된다.
2. 다음 중 1~3항 투여하면 투여하지 말 것 : 이 약의 성분에 과민반응 환자
3. 일반적 주의
1) 장내 정상 균총을 사진다.
2) 개인에서 피부테스트 등에서 개별이 있을 경우 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
4. 소아에 대한 투여 : 영아 및 어린이에 투여할 경우 의사 또는 약사와 상의한다.
5. 적정한 투여 시기
1) 소아가 삼키지 않는 경우 분말약
2) 의사 처방할 때 이외 임의로 중지하면 완전하게 효과가 없다.
3) 약을 먹고 동일한 그룹을 다른 제품으로 바꾸어 투여하지 말 것.

[illegible]

30캡슐, 90캡슐

[illegible]

기능성, 일반의약품

[illegible]

· 제조업체 : 제이더블유신약(주) 경기도 시흥시 공단로 93-24
· 제 조 지 : 우에어넥스 충남 아산시 시노 / 디테크 309-3

[illegible]

2016. 02. 01

[illegible]

· 본 약 구입 시 사용기한 또는 유효기간이 경과되었거나 유통기한 등 문제, 결함 등은 약국에 제출하시면 교환해 드립니다.
· 이 외에 궁금한 사항 및 [illegible]년 10월 이후 변경된 사용상 시 www.jw-pharm.co.kr 또는 고객상담실(1588-4678)에서 확인하실 수 있습니다.

JW 신약

제이더블유신약(주)
충북 [illegible] 산단로 88-24