

하루 한 알 건강하게!

일반의약품

맥시라민에이정

분류
번호

319
(기타의 비타민제)

맥시라민에이정은 활력 있는 건강한 삶을 유지하기 위해 필요한 27가지의 비타민과 미네랄 성분의 영양제입니다.

맥시라민에이정은 눈의 건조감을 완화하는 비타민A, 에너지의 대사를 도와 피로를 개선하는 비타민B군, 활성산소를 제거하는 각종 항산화제(비타민C, 비타민E, 셀레늄, 아연), 뼈 건강을 위한 비타민D 그리고 건강한 생활에 필요한 각종 영양소(칼슘, 철분, 마그네슘, 인, 칼륨, 구리, 망간, 크롬, 몰리브덴, γ -오리자놀, 이노시톨)를 함유하고 있습니다.

따라서, 맥시라민에이정의 복용은 피로와 눈의 건조감을 호소하는 직장인과 수험생, 비타민·미네랄 보충이 필요한 임신부·수유부, 성장이 청소년과 어르신들, 그리고 병을 앓는 동안이나 회복 후 체력이 저하되신 분들의 건강한 생활을 도와줍니다.

원료약품의 분량(1정 중)

레티놀아세테이트과립(EP)(비타민A로서 2500IU)	5.0mg
β -카로틴20%과립(별규)(베타카로틴으로서 0.6mg)	3.0mg
토코페롤아세테이트2배산(KP)(비타민E로서 30IU)	60.0mg
콜레칼시페롤과립(별규)(비타민D로서 400IU)	4.0mg
피토나디온5%(별규)(비타민K로서 60 μ g)	1.2mg
제피아스코브르산(별규)(비타민C)(아스코브르산으로서 60mg)	62.5mg
니코틴산아미드3배산(KP)(니코틴산아미드로서 20mg)	60.0mg
피리독신염산염3배산(KP)(비타민B ₆)(피리독신염산염으로서 2mg)	6.0mg
티아민질산염3배산(KP)(비타민B ₁)(티아민질산염으로서 1.5mg)	4.5mg
리보플라빈(KP)(비타민B ₂)	1.7mg
폴산(USP)(비타민B ₉)	0.5mg
시아노코발라민1000배산(KP)(비타민B ₁₂)(시아노코발라민으로서 10 μ g)	10.0mg
비오틴(USP)	0.03mg
판토텐산칼슘(KP)	10.87mg
무수인산수소칼슘(KP)(총 칼슘으로서 63.83mg, 인으로서 48.62mg)	213.6mg
푸마르산철(KP)(철로서 4.0mg)	12.2mg
산화마그네슘(KP)(마그네슘으로서 100mg)	165.8mg
산화제이구리(KP)(구리로서 2mg)	2.5mg
산화아연(KP)(아연으로서 15mg)	18.7mg
셀레늄함유건조효모(KP)(셀레늄으로서 25 μ g)	46.3mg
염화크롬(USP)(크롬으로서 25 μ g)	0.128mg
몰리브덴함유건조효모(별규)(몰리브덴으로서 25 μ g)	12.5mg
황산망간수화물(USP)(망간으로서 2mg)	6.15mg
염화칼륨(KP)(칼륨으로서 8.0mg)	15.179mg
이노시톨(KP)	25.0mg
γ -오리자놀(KP)	5.0mg
첨가제(타르색소) : 황색5호	

성상: 연한 노란분홍색의 타원형 필름코팅정

ID

ma

효능·효과

- 다음경우의 비타민 A, D, E, B₁, B₂, B₆, C의 보급
 - 육체피로 - 임신·수유기 - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
 - 발육기 - 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능효과는 다음과 같습니다.
 - 비타민A : 눈의 건조감의 완화, 야맹증(밤에 잘 못보는 증상)
 - 비타민D : 뼈, 이의 발육불량, 구루병의 예방
- 아연의 보급

용법·용량: 만 12세 이상 및 성인 : 1일 1회 1정을 복용합니다.

사용상의 주의사항

복용하시기 전에 아래의 주의사항을 잘 읽어보신 후 복용하시기 바랍니다.

1. 경고

- 1) 임부에 비타민 A(레티놀)를 1일 5,000 IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A를 5,000 IU/일 이상 투여하지 마십시오.(비타민 A결핍증 환자는 제외)
- 2) 철 함유제제는 만 6세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 중독성 시망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 3) 만 12개월 미만의 젖먹이 4) 고칼륨혈증 환자 5) 월슨병
- 6) 혈액색증(철대사 이상으로 철이 간장, 췌장(이차)에 침착하는 질환), 헤모시데린침착증, 비철결핍성 빈혈
- 7) 신장결석 환자 8) 심한 증상의 신부전 환자
- 9) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토스 불내성(galactose intolerance), Lapp

유당분해 효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 (glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제 2) 레보도파

4. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
2) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살산염이 배설되는 상태)
3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
(1) 외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민 A를 10,000 IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현 (기형발생) 증가가 추정된다는 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A 결핍증치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않습니다. 또한 비타민 A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로 부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000 IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 합니다.
(2) 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다.
4) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자
5) 심장·순환기계기능 장애 환자 6) 신장장애 환자 7) 저단백혈증 환자
8) 강심배당체를 투여 중인 환자 9) 담낭(쓸개)관련 질환, 간질환 환자
10) 담낭폐쇄, 구리 부족증 환자 11) 알칼리증, 소화성궤양 환자
12) 당뇨병 환자 13) 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자
14) 신장결석 병력이 있는 환자 15) 임부
16) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여 합니다.

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 가려움, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종, 설사, 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적, 붉은 변, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진, 두드러기, 광선과민반응, 복부·위통증, 경련, 열, 혼수, 상복부 통증, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 고요산혈증, 고칼륨혈증, 가스참, 위장통증, 피부염, 땀·호흡시 악취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 폐부종
2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.
3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다.
4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
5) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적 변화)이 나타날 수 있습니다.
6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperurisemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.
8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
9) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있습니다.
10) 장기간 고용량의 비타민 A섭취는 폐경기를 지난 여성의 골다공증(뼈영양성) 위험을 높일 수 있습니다.
11) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의 하십시오.
12) 우발적으로 과량복용 한 경우 13) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

6. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
2) 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000 IU 이상을 넘지 않도록 합니다.
3) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
4) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사에 영향을 줄 수 있습니다.
5) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.
6) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에게는 신중히 투여 합니다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오.
3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

포장단위 : 100정 저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

○ 이 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.

○ 이 설명서는 2016년 2월 19일자로 작성되었으며 이후로 변경된 내용은 홈페이지 (www.ildong.com) 에서 확인할 수 있습니다.

일동제약주식회사

본사: 서울특별시 서초구 바우로27길 2 공장: 경기도 안성시 공단로 25
소비자상담실: (전화) 080-022-1010 (수신자부담)