



가네진[®] GANEZIN

일반의약품 분류번호: 391

간기능 개선

[원료약품 및 분량] 1정 중

유효성분 :

오로트산카르니틴(별규) 300mg

(오로트산으로서147.6mg, 카르니틴으로서152.4mg)

항독성간장엑스(별규) 25mg

(시아노코발라민으로서0.25mg)

아데닌염산염(별규) 5mg

피리독신염산염(KP) 50mg

리보플라빈(KP) 1mg

시아노코발라민100배산(별규) 25mg

첨가제(타르색소) : 황색5호, 적색40호, 청색2호

동물유래성분 : 항독성간장엑스(소, 간)

· 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파그로스클리어(97W19196), 오파드라이이 빨강(85F35210), 오파드라이200흰색(200F280000), 초코렛분말향, 초코렛미크론, 콜로이드성아산화규소, 크로스카르멜로오스나트륨

[성상] 적갈색의 타원형 필름코팅정제

[효능·효과] 다음 질환의 보조 치료: 만성 간염, 독성 간질환

[용법·용량] 성인: 1회 1정, 1일 2-3회 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 의사의 치료를 받고 있는 환자

2) 이 약은 황색 5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으며 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여할 것.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사,

약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 가려움, 피부발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 변비, 메스꺼움, 상복부 불편감

2) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

3) 피라독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.

4) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.

5) 우발적으로 과량복용 한 경우

5. 기타 이 약의 복용(사용) 시 주의할 사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.

2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아, 단단히 마개로 막아)하여 보관할 것.

3) 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못사용)에 의한 사고 발생이나 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

[저장방법] 밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

[사용기간] 제조일로부터 24개월

[포장단위] 60정, 120정

제조사: (주)셀트리온제약 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 2산단로 82

* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 통한 제품입니다. 만약, 구입 시 사용한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변색, 오염, 손상된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. [소비자상담실: 080-850-3611 (~2)수신자부담] * 이 제품 설명서 작성일자(하단에 표시) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.celltrionph.com) 또는 의약품통합정보시스템(<http://n.edrug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다. * 약품 부작용 발생 시 한국약물안전관리원에 피해구제를 신청할 수 있습니다. (약품부작용신고 및 피해구제 상담: 1644-6223)



가네진은 간을 위한 마음을 담은 진(眞)정한 간장약이라는 의미를 담고 있습니다

셀트리온제약
CELLTRION
www.celltrionph.com

관리번호: GNT-13-03

작성일자: T-2020.01.20