

【분류번호】 124

【원료약품 및 조 분량】 1정 중

플로로글루시놀(무수물)(EP).....124.476mg

· 첨가제(동물유래): 루티프레스 중 유당수화물
(기원동물: 소, 사용부위: 우유)

【성상】 흰색의 원형 정제

【효능·효과】

1. 비뇨기계의 경련 및 통증: 신염성 산통
2. 소화관 및 담도계의 기능 장애에 의한 통증
3. 부인과의 경련성 통증
4. 임신중 수축의 보조치료



대화제약주식회사

서울특별시 관악구 남부순환로 2338
광진·강변도 황외로 444호 4층
http://www.dhpharm.co.kr

우수의약품제조관리기준
KSP 제정소제

FLOSPAN-D^{Tdb.}
500정

전문의약품

후로스판디^정

속효성 진경제



플로로글루시놀(무수물)

【용법·용량】

· 성인: 이 약을 1회 1정, 물 한 컵에 녹이거나 설하에
넣어 증상발현 시에 경구투여한다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】 내부문서 참조

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

(01)08806456046928

제조번호:

사용기한:



HDPE

여기서부터 여신

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약에 과민증 환자
- 2) 이 약은 유당수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 부작용

- 1) 소화기계: 드물게 구역, 구갈 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감량, 휴약 등의 적절한 처치를 한다.
- 2) 피부: 알레르기반응이 나타날 수 있다.
- 3) 기타: 드물게 기분불량, 복시 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감량, 휴약 등의 적절한 처치를 한다.

3. 상호작용

이 약은 진경작용을 나타내므로 모르핀 또는 그 유도체와 같은 진통제와는 병용투여하지 않는 것이 바람직하다.

4. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 동물실험에서 태자독성 및 기형발생은 나타나지 않았으나 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인(특히 초기 3개월)에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.
- 2) 수유중에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.

※ 본 제품은 "우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)"에 따라 제조 및 품질경시를 한 의약품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과하였거나, 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 기타 자세한 사항이나 작성일자(2016년 02월 15일) 이후 변경된 내용은 [대화제약 홈페이지]나 마케팅팀(080-855-0114)으로 문의하시기 바랍니다.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

개정일: 2016년 02월 15일