

의약품 분류번호	114 해열·진통·소염(항염)제
-------------	----------------------

복합한 감기에 화!

화쿨[®] 콜드
연질캡슐
종합감기약

일반의약품

원료약품의 분량 1캡슐 중

아세트아미노펜 (KP).....	200,000mg
브로펜나리인말레이트염 (BP).....	2,660mg
수도메드라인염산염 (USP).....	15,000mg
덱스트로메토르판브로펜나소산염수화물 (KP).....	8,000mg
구아이페네신 (KP).....	41,660mg

성상 연노랑 내지 연한 적색의 투명한 내용물을 함유한 적색의 투명한 정방형 연질캡슐

효능·효과 감기의 증상(여러증상)(코막, 코막힘, 재채기, 인후(목)구멍, 기침, 가래, 오한(춥고 떨리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

용법·용량 만 15세 이상 및 성인 : 1회 2캡슐, 1일 3회, 식후 30분에 복용합니다.
만 11세 이상~만 15세 미만 : 1회 1캡슐, 1일 3회, 식후 30분에 복용합니다.
만 7세 초과~만 11세 미만 : 1회 1캡슐, 1일 3회, 식후 30분에 복용합니다.

사용상의 주의사항

1. 경고

1) 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 합니다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있습니다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 2) 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 천식을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 만3개월 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기)
- 4) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등을) 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

진해(기침을 그치게 함)기(제)기(래약), 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비경구용)용 경구제, 멀미약, 알레르기약)

4. 이 약을 복용하는 동안 다음과 같은 행위를 하지 마십시오.

1) 이 약에는 아세트아미노펜이 함유되어 있습니다. 다른 아세트아미노펜 제품과 함께 복용하여 일일 최대용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용해서는 안 됩니다.

5. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(젖먹이, 갓난아기) 및 만 15세 미만의 어린이(구역이나 구토를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이중후군의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의 하십시오.)
- 2) 만 3개월 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기)에는 복용을 피하고 만 3개월 이상인 경우도 만 2세 미만의 영(젖먹이, 갓난아기) · 유아는 의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 이약을 복용시키지 않도록 합니다. 만 2세 미만 영(젖먹이, 갓난아기) · 유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의 깊게 모니터링해야 합니다.
- 3) 본인 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염(코염), 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 4) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상에 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 기려움증 등을 일으킨 적이 있는 사람
- 5) 간장질환, 신장(콩팥)질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 위십이지장궤양, 녹내장(예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등), 배뇨곤란 등이 있는 사람, 고령자(노인), 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 6) 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나 궤양, 출혈문제를 가지고 있는 사람
- 7) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부

- 8) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨약, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)
- 9) 다음과 같은 기침이 있는 사람
흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열 · 발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침
6. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 구역 · 구토, 식욕부진, 변비, 부종(부기), 배뇨곤란, 목마름(지속적이거나 심한, 어지러움, 불안, 떨림, 불면
2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 증상(심한증상) 증상이 나타난 경우
1) 속(아나필락시스(과민성 쇼크) : 복용후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있습니다.
2) 피부점막안중후군(스티븐스-존슨증후군), 중독성표피괴사증후군(리델증후군) : 고열을 동반하고, 발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈점막에 나타날 수 있습니다.
3) 천식
4) 간기능장애 : 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨) 등이 나타날 수 있습니다.
5) 간질성폐렴 : 기침을 동반하고, 숨이 차고, 호흡곤란, 발열 등이 나타남니다.
3) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

7. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오.
- 2) 장기간 계속 복용하지 마십시오.
- 3) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용 시키십시오.
- 4) 복용시에는 음주하지 마십시오.
- 5) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피하십시오.
- 6) 바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있습니다.

8. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

포장 단위 10캡슐

저장 방법 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

제조/의뢰자 제이더블유중외제약주 / 총남 당진시 송악읍 한진1길 56

제 조 자 ㈜알파코프 / 경기도 화성시 향남읍 제막공단4길 35-7

교환 및 제품문의

본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나, 변질·부패 또는 오손된 제품들은 약국 등의 개시처에 한하여 교환하여 드립니다. 또한 제품에 관한 문의사항이 있으시면 연락주십시오. 연락처:고객 만족팀 1588-2675

※ 첨부문서 작성일자 : 2016년 02월 03일 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지 (www.jw-pharma.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

제조/의뢰자

jw 중외제약
제이더블유중외제약주
총남 당진시 송악읍 한진1길 56