

이명(귀울림)

실비도 정


Silbido Tab.



【원료약품 및 그 분량】 1정(500mg) 중

아미노벤조산에틸(KP)	30.00mg
카페인수화물(KP)	20.00mg
클로르페니라민말레산염(KP)	2.00mg
니코틴산아미드(KP)	20.00mg
파파베린염산염(KP)	5.00mg
리보플라빈(KP)	1.00mg
티아민염산염(KP)	10.00mg
노화(생규)	2.00mg

【성상】 고동색의 타원형 필름코팅정제



【효능·효과】 이명(귀울림)증

【용법·용량】 1회 2~3정 1일 3회 식사 후 물과 함께 복용한다. 15세미만 소아에게는 복용하지 말 것

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

1) 15세 미만의 소아에게는 복용하지 말 것

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것

1) 멀미약, 감기약, 해열진통제, 진정제, 진해거담제(가침가래약), 항히스타민제 성분의 내복약 등(비염코염) 또는 알레르기용 약 등을 복용하고 있는 사람

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것

1) 이 약을 복용 후 차량 또는 기계 장치의 운전 조작을 하지 않는다.(졸음이 나타날 수 있다.)

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사 또는 약사와 상의할 것

1) 지금까지 다른 항히스타민제, 멀미약, 감기약, 진해거담제(가침가래약)에 의한 알레르기 증상(예: 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움증 등)이 일어난 경험이 있는 환자

2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성

3) 전립선비대증 등 배뇨(소변을 누) 장애 환자

4) 의사의 치료를 받고 있는 사람

5) 다음의 진단을 받았던 적이 있는 사람 : 녹내장 심장질환

6) 약물 등에 의한 천식을 일으킨 적이 있는 사람

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고, 의사, 치과의사 또는 약사와 상의할 것

1) 이 약 복용 후 알레르기 증상(예: 발진 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등) 배뇨곤란(소변누기 어려움), 혈압상승, 입마름, 변비, 설사 등이 나타나는 경우 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의할 것

2) 드물게 다음과 같은 심각한 증상이 일어날 수 있다. 이러한 경우에는 즉시 의사의 진단을 받을 것

이상반응	증상
재생불량성 빈혈	파란영, 코피, 잇몸출혈, 발열, 피부와 점막이 창백해짐, 피로감, 가슴의 두근거림, 호흡곤란, 빈혈, 혈뇨 등이 나타난다.
무과립구증	갑작스런 고열, 오한, 출고, 떨리는 증상, 인후통(목구멍 통증) 등이 나타난다.

6. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

1) 정해진 용법, 용량을 잘 지킬 것

2) 다른 약물과 동시에 복용하지 말 것

3) 수 일간 복용하여도 증상의 개선이 보이지 않을 경우에는 사용을 중지하고 의사, 치과의사 또는 약사와 상의할 것

4) 장기 계속하여 복용하지 말 것

7. 저장상의 주의사항

1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것

2) 직사광선을 피하고 습기가 적은 서늘한 장소에 보관할 것

3) 오용, 잘못 사용을 피하고 품질을 보존하기 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

【저장방법】 차광밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】 자사포장단위

【소비자상담실】 1522-3797

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패, 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입한 약국을 통해 교환하여 드립니다.

※ 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

※ 본 첨부문서 작성일자(2016년 5월) 이후에 변경된 내용은 온라인의약도서관(druginfo.go.kr) 또는 소비자상담실(1522-3797)에서 확인할 수 있습니다.

※ 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는 설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

제조사
한풍제약
전북 완주군 봉동읍 완주신단 6로 301

판매처
POK에이오케이(주)
서울시 마포구 동교로 210