

[사용상의 주의사항] 1. 경고 이 약에 함유되어 있는 인공감미료(단맛제 아스파탐) 체내에서 분해되어 페닐알라닌으로 대사되므로, 페닐알라닌의 섭취를 규제할 필요가 있는 유전성 질환인 페닐케톤뇨증 환자에는 투여하지 마십시오. - 1일 허용량인 아스파탐 함유량 WHO 권장량(40 mg/kg/1일)이하로 조정가능한 한 최소량 사용하십시오. 60 kg 성인: 1일 최대복용량 2.4 g 2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오. 1) 수유부

2) 만 7세 이하의 어린이 3) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하지 마십시오. 3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용/사용하지 마십시오. 다른 진통제, 감기약, 해열진통제, 항히스타민제, 진정제, 전해기침을 그치게 할거담제(가래약), 위장운동 진정(경련완화)제 등 4. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오. 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오. 5. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 1) 약으로 알레르기 증상(발진, 충혈되어 붉어짐, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 사람 2) 일부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부 3) 심장장애 환자, 뇌내정맥의 통증, 눈의 침침함 등 환자, 배뇨소변을 뇨장애 환자, 허약자, 노인 4) 다른 약물을 복용하고 있는 사람 5) 폐기종

혹은 만성 기관지염과 같은 호흡기 질환을 앓고 있는 환자 6. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상임 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오. 1) 이 약을 복용함으로써 두통, 안면홍조(얼굴이 붉어짐), 눈부심, 배뇨소변을 뇨장애 등이 나타날 경우 2) 이 약을 복용함으로써 구갈(목 마름) 또는 변비나 나타나는 경우 7. 기타 이 약의 복용 시 주의사항 1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜십시오. 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여하십시오. 3) 이 약을 복용함으로써 졸음이 나타날 수 있으므로 자동차 운전 등 위험이 수반되는 기계를 작동하지 않도록 주의하십시오. 4) 이 약을 복용하는 동안 알코올 음료를 마시지 마십시오. 8. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오. 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오. ※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질 변색 오염되거나 손상된

제품은 약국개설자 또는 약품 판매업자에 반환하여 교환하여 드려야 하며, 공정거래위원회에서 고시한 "소비자분쟁해결기준"에 의거, 정당한 소비자피해에 대해 보상해드립니다. ※ 최종 개정연월일(2016.02.11) 이후 변경된 내용은 온라인 약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다. ※ 부작용보고: 한국약품안전관리원(1644-6223)

[원료약품 및 그 분량] 1정(799.525mg) 중
디멘하이드리니이트(KP) 20mg
스쿠렐라민브롬화수소산염수화물(BP) 0.125mg
참가제(타르색소): 황색5호(일무미노레이크, 참가제(동물유래): 유당수화물(뉴질랜드산 또는 미국산의 2-7년 연령의 건강한 소에서 채취한 우유)

[성상] 연한 주황색의 모서리가 둥근 정사각형 모양의 씹어먹는 정제
[효능·효과] 말미에 의한 어지러움, 구토, 두통의 예방 및 완화
[저장방법] 차광밀폐용기, 실온(1~30℃)보관
[설명서 개정연월일 / 관리번호] 2016.02.11 / P1602-1
※첨부문서는 카툰으로 대체



보건복지부 인증
혁신형 제약기업

KGMP
일반의약품
분류번호: 235

가볍게 물없이 씹어먹는 상쾌한 멀미약

보나링츄어블® BONALING CHEWABLE Tab 정

4정

멀미에 의한 어지러움·구토·두통

일양약품



[용법·용량] 성인(만 15세이상): 1회 2정, 소아(만 8세이상~만 15세미만): 1회 1정. 멀미의 예방에는 승차 30분에서 1시간 전에 복용하십시오. 또 필요시 추가 복용할 경우에는 4시간 이상 간격을 두고 복용하십시오. 1일 복용횟수는 2회를 한도로 하십시오. 입안에서 녹이거나 씹어서 복용하십시오.

제조판매자

일양약품주식회사

경기도 용인시 기흥구 하갈로 110

소비자상담실: 080-021-1010(수신요금부담전화)

학술상담실: 02-570-3888 홈페이지 www.ilyang.co.kr

