

진경 및 장관운동 정상화제

티프라밍 100밀리그램

(티로프라미드염산염)

■ 원료약품 및 분량 (1정 중)

유효성분 : 티로프라미드염산염(별규) 100mg

첨가제(동굴수화물) : 유당수화물

기타첨가제 : 스테아르산마그네슘, 오파드라이헥셀(03B28796), 옥수수전분, 전분글리콜산나트륨, 포비돈

■ 색상

원색의 원형 필름코팅정

■ 효능·효과

1. 다음 질환에서의 급성 경련성 동통 : 간담도산통, 여러 원인에 의한 복부산통, 신장·요관의 산통

2. 다음 질환에서의 복부 경련 및 동통 : 위장관 이상운동증, 담석증, 담낭염, 수술 후 유착

■ 용법·용량

· 성인 : 티로프라미드염산염으로서 1회 100mg 1일 2~3회 경구투여한다.

· 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

1) 외부 자극으로 인해 위장관이 협착된 환자

2) 거대 결장, 허탈 환자

3) 이 약에 과민증 환자

4) 중증의 간부전 환자

5) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), 락포 유당분해효소 결핍증(Lappo lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

항콜린작용을 나타내지 않지만 복내장 또는 전립선비대 환자에는 신중히 투여한다.

3. 이상반응

1) 구갈, 구역, 구토, 변비 등이 나타날 수 있다.

2) 가려움, 홍반 등의 알레르기증상이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.

4. 상호작용

혈압강화약물을 투여받는 환자에게 이 약을 고용량 투여할 경우에는 혈압강화효과가 상승될 수 있으므로 주의한다.

5. 임부에 대한 투여

동물실험에서 임부나 태아에 대한 이상반응을 나타내지는 않았으나 임부에서의 사용은 필요성이 인정되는 경우로 제한하고 의사의 감독하에 투여한다.

6. 보관 및 취급상의 주의사항.

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의할 것.

■ 포장단위 : 30정/병, 300정/병

■ 저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■ 제조번호·사용기한 : 외부모장참조

■ 제조자 : ㈜동구바이오제약 / 경기도 화성시 함남읍 제약공단2길 18

■ 제조외의자 : (주)화이트생명과학 / 경기도 화성시 함남읍 제약공단4길 89

- ※ 의약품용 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.
- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 경과하였거나 변질·변태 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 의약품용 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여야 합니다.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품용 사용하지 않도록 합니다.
- ※ 작성일자 이후 변경된 내용은 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>) 또는 소비자상담실 031-359-9500에서 확인할 수 있습니다.

작성일 : 2019. 05. 31. (Rev.0)



(주)화이트 생명과학