[전문의약품]

금격근이완제

에페프린®정

Epeprin® Tab.

(에페리손염산염)

(Eperisone hydrochloride)

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

주성분: 에페리손염산염 50mg

[성상] 흰색의 필름 코팅정

[효능·효과]

골격근의 긴장에 수반하는 통증의 개선(근육통, 견완통, 요통, 경견완증후군, 목결림)

스포츠 외상으로 인한 타박상, 염좌, 근육통, 좌골신경통, 관절염 및 외상 후 후유증 등에 대한 진통 보조요법

[용법·용량]

성인 1회 1정 1일 3회 식후 복용한다. 단, 증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

1) 중증 근무력증 환자 [근수축력이 저하되어 증상이 악화될 우려가 있다.]

2) 임신 중 또는 임신할 가능성이 있는 여성 [동물실험에서 태아에 대한 안전성이 확인되지 않았다.]

3) 수유 중인 여성 [동물실험에서 유즙 중으로 이행하는 것이 보고되었다.]

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

1) 심장병 환자 [심박수가 증가하는 경우가 있다.]

2) 간장애 환자 [간장애 환자에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다.]

3. 부작용

1) 중대한 부작용

(1) 쇼크, 아나필락시스 양상(호흡곤란, 홍조, 두드러기, 혈압저하, 의식소실 등)이 나타나는 경우가 있으므로 이상이 나타나면 투여를 중지하고 적절한 처치를 할 것.

(2) 간장애: 간장애, 황달이 나타나는 경우가 있으므로 이상이 나타나면 투여를 중지하고 적절한 처치를 할 것.

2) 기타 부작용

(1) 혈액: 백혈구 감소, 혈소판 감소 등이 나타나는 경우가 있다.

(2) 소화기: 식욕부진, 구역, 구토, 속쓰림, 위통, 변비, 설사, 복부팽만감 등이 나타나는 경우가 있다.

(3) 간: AST(GOT), ALT(GPT), 알칼리포스파타아제, 감마-GTP, LDH 상승 등이 나타나는 경우가 있다.

(4) 피부: 발진 등이 나타나는 경우가 있다.

(5) 신장: 혈뇨, 단백뇨 등이 나타나는 경우가 있다.

(6) 기타: 위 1)~5) 이외의 부작용이 나타나는 경우가 있다.

4. 일반적 주의

1) 본 약물투여 중에는 운전, 기계 조작 등 위험을 수반하는 작업에 종사하는 것을 피하는 것이 바람직하다.

2) 본 약물 투여 중 술을 마시면 약효가 증강되는 경우가 있으므로 술을 마시지 않는 것이 바람직하다.

3) 장기간 투여하는 경우에는 혈액검사, 간기능검사 등을 실시하는 것이 바람직하다.

5. 상호작용

1) 병용금기(함께 투여하면 안 되는 약물): 없음

2) 병용주의(함께 투여할 때 주의해야 하는 약물): 없음

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

1) 임신중인 여성에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다. 동물실험에서 태아에 대한 안전성이 확인되지 않았다.

2) 수유 중인 여성은 약물이 모유 중으로 이행하는 것이 보고되었다.

7. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않다.

8. 고령자에 대한 투여

고령자에는 일반적으로 생리기능이 저하되어 있으므로 신중히 투여하는 것이 바람직하다.

[저장방법] 차광밀전 실온(1~30℃) 보관

[포장단위] 100정

※ 허가-특허 연계 제도에 따라 특허권이 존속하는 의약품입니다.

※ 의약품 특성상 제조 후 유통과정 중 품질변화 우려가 있어 제조일로부터 3년 이내 사용하는 것이 바람직합니다.

※ 사용 후 남은 약은 버리지 마십시오. 폐의약품은 가까운 보건소, 보건지소, 보건진료소 또는 동 주민센터(읍·면사무소)에 설치된 폐의약품 수거함에 버려주십시오.

※ 자세한 사항은 의약품안전나라(http://nedrug.mfds.go.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

[제조판매원]

한화제약

[제조자]

아주약품(주)