

일반의약품
조제용

500정

건위소화제 제스탈정

(디아스타제·프로테아제·셀룰라제 /
리파제 / 시메티콘 / 우르소데옥시콜산)

 **신한제약**
경기도 안성시 공단2로 50-4
www.shpharm.co.kr
(제품문의) 02-553-7417

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

- 유효성분: 디아스타제·프로테아제·셀룰라제(별규) 20mg
(전분당화력 278단위 이상, 전분호정화력 640단위 이상,
단백소화력 170단위 이상, 섬유소당화력 2단위 이상),
리파제(KP) 20mg (지방소화력 120단위 이상), 시메티콘(KP) 30mg,
우르소데옥시콜산(KP) 10mg
- 첨가제(타르색소): 청색1호, 황색4호
- 기타첨가제: 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 이산화규소,
카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 탈크, 포비돈, 폴리에틸렌글리콜6000,
히프로멜로오스

[성상] 녹색의 원형 필름코팅정

[효능·효과] 소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 체함, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감

[용법·용량]

만 15세 이상: 1일 3회, 1회 1~2정, 식후 복용
만 8세 이상~만 15세 미만: 1일 3회, 1회 1정, 식후 복용

[사용상의 주의사항]

- 1) 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. (1) 만 7세 이하의 어린이
- 2) 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. (1) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람 (2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 (3) 다른 약물을 복용하고 있는 사람 (4) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 3) 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 이 첨부문서를 소지할 것. (1) 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 4) 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항 (1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. (2) 어린이 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여할 것.
- 5) 저장상의 주의사항 (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것. (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[포장단위] 500정/병

[저장방법 및 사용기간] 밀폐용기, 실온보관(1~30℃) / 제조일로부터 36개월

제조·외도자: (주)신한제약, 경기도 안성시 공단2로 50-4
제조자: (주)노바앰헬스케어, 경상북도 경산시 하양읍 지식산업4로 16-53



※ 이 의약품을 사용하기 전에 기재 사항을 반드시 읽어주시시오. 또한 필요 시에 읽을 수 있도록 보관하여 주십시오.
※ 의약품을 어린이 손에 닿지 않게 보관하여야 하며, 사용기한이 지난 의약품은 사용하지 않도록 합니다. 처방된 증상, 처방된 환자 이외에는 사용하지 마십시오.
※ 이 의약품은 엄격한 품질 관리를 위한 제품입니다. 구입 시, 사용기한이 경과되었거나, 변질·변패, 오염으로 손상되었을 경우, 약국 개설자 및 의약품 판매업자에 한하여 교환하여 드립니다.
※ 식약처 고시 「의약품 표시 등에 관한 규정」 제9조제7항에 따라, 의약품 부작용 발생 시 한국의약품안전관리원(<https://www.drugsafe.or.kr>)을 통해 부작용 피해구제를 신청하실 수 있습니다.

제·개정연월일(2025.07.01.) 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(<http://www.shpharm.co.kr>) 또는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

제조번호:

사용기한:

35X18mm

(01)08806513010749



3Z5TL-250701