

【원료 약품 및 그 분량】 1캡슐 중

레티놀팔미테이트(KP).....	2.94mg
(비타민A로서 5,000IU)	
리보플라빈(KP).....	15mg
티아민질산염(KP).....	25mg
코드로이탄설페이트나트륨(KP).....	50mg
청가제(타르색소): 적색40호, 청색1호	

【성상】 황색의 유상 내용물을 함유한 암갈색의 타원형 연질캡슐

【효능·효과】

1. 다음 경우의 비타민 A, B₁, B₂의 보급

- 육체피로
- 임신·수유기
- 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력지하
- 2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
- 눈의 건조감의 완화
- 야맹증(밤에 잘 못보는 증상)
- 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절염(요통, 어깨결림 등)
- 각기
- 눈의피로
- 다음 증상의 완화 : 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

【용법·용량】 만 8세 이하 어린이 및 성인 : 1회 1캡슐씩 1일 2회 복용

【사용상의 주의사항】

- 고령
임부에 비타민 A(레티놀)를 1일 5,000 IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A를 5,000 IU/일 이상 투여하지 마십시오. (비타민 A결핍증 환자는 제외)
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
(1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
(2) 만 3개월 미만의 저역아
(3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
(4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오.
(1) 만 1세 미만의 저역아
(2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
(3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
(1) 외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민 A를 10,000 IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현(기형발생) 증가가 추정되는 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A 결핍증치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않습니다.
또한 비타민 A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로 부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000 IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 합니다.
(4) 고지단백혈증, 담낭병성고지질혈증 및 췌장(이차)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오.
상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
(1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
- 구역, 구두, 가려움, 건조하고 거친 피부, 통풍성 관절부종, 묽은 변, 설사
(2) 장기간 고용량의 비타민 A(비타민A)으로부터 전환된 것을 제외한) 섭취는 폐경기를 지난 여성의 골다공증(뼈강성증) 위험을 높일 수 있습니다.
(3) 우발적으로 과량복용 한 경우
(4) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

*일반시범표시

표시(양)	표시(위)
ER V	

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- (1) 정해진 용법·용량을 잘 지킵니다.
- (2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여하십시오.
- (3) 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000 IU 이상을 넘지 않도록 합니다.
- (4) 요를 황색으로 변하게 하여 임상징상에 영향을 줄 수 있습니다.
- (5) 지방과파로 특별한 위험이 예상되는 환자에는 이 약을 투여할 때 혈장 지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 재배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절합니다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

6. 저장상의 주의사항

- (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오.
- (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 90캡슐, 180캡슐

- * 만약, 구입시 사용(유효)기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회와 소비자피해보상청에 기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
- * 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사 또는 약사와 상담하십시오.
- * 이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지 www.boryung.co.kr 또는 소비자 상담실 수신자부담전화 080-708-8088에서 확인하실 수 있습니다.
- * 이 약을 사용하기 전에 반드시 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.
- * 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 이디즈넷(ezdrug.mids.go.kr) 의약품정보를 참조하십시오.
- * 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전처(한국약품안전관리원) -> 의약품유해 사례보고 -> 온라인보고에 알려주시기 바랍니다.
- * 본 제품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오.
- * 사용(유효)기간이 경과한 제품은 사용하지 마시기 바랍니다.

소비자상담실 수신자부담전화 : 080-708-8088

첨부문서 작성일자 : 2016년 3월 8일



제조업체 및 판매자 : 보령제약(주) 경기도 안산시 단원구 능안로 107, 109
제조자(주) 팔미코프 경기도 화성시 향남읍 제야공단4길 35-7