

염증/발적/부기/통증/출혈

제노타[®]에이 캡슐

Genota-A Caps.

일반의약품 | 분류번호:231

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

아스코르브산(KP)	150 mg
리소지염산염(KP)	30 mg
키르바조크롬(KP)	2 mg
토코페롤아세테이트 2배산(EP)	10 mg
(DL- α -토코페롤아세테이트로서 5.0 mg)	
첨가제(타르색소): 황색 5호, 황색 203호	

[효능 및 효과] 치은염(잇몸염)·치조(이빨)농루에 의한 여러 증상(잇몸의 발적(충혈되어 붉어짐)·부기·출혈·통증)의 완화

[용법 및 용량] 성인 1회 1캡슐을 1일 3회 식후에 복용한다.

[성상] 연분홍색의 분말이 든 상·하부 황색의 경질캡슐제

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

15세 미만의 소아

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 약 및 화장품 등으로 알레르기 증상(발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 사람
- 2) 다른 약물을 복용하고 있는 환자
- 3) 지금까지 약이나 달걀에 알레르기 증상 (예를 들면, 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 사람
- 4) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
- 5) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
- 6) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여할 것.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약 복용 후 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 설사, 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 구내염(입안염) 등이 나타난 경우
- 2) 피부: 피부점막안증후군(스티븐스-존슨 증후군), 독성표피괴사증후군(리엘증후군)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 발열, 홍반(붉은 반점), 가려움, 안충혈, 구내염(입안염) 등의 증상이 인정되는 경우 및 고열을 동반하는, 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 화상모양의 수증 등의 중증(심한 증상)의 증상이 전신의 피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우
- 3) 1개월 이상 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

↓ 뒷면계속

KGMP적격업체

◀ 조아제약(주)

4080433

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.

5. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

[저장 방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

[포장 단위] 90캡슐, 180캡슐

[수신자부담고객상담실] 080-988-8888

[제조외회사] 조아제약(주) 인터넷홈페이지 <http://www.choa.co.kr>

본사: 서울특별시 영등포구 당산로2길 12

공장: 경상남도 함안군 함안면 광정로 318

[제조자] (주)씨트리 경기도 남양주시 경강로 27

※ 기타 상세한 것은 의사 또는 약사의 지시에 따르십시오.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입서 사용기한이 경과되었거나, 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국에서 교환하여 드립니다.

※ 본 첨부문서의 내용은 최신정보 및 허가사항의 변경에 따라 계속 수정되고 있으므로 사용전에 주의깊게 읽어주시고, 의약품과 함께 보관하여 주십시오.

※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.

※ 표시되지 않은 부작용 이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전처에 전달하십시오.

문안작성일: 2016. 03. 03(Rev.0)