

Breathing Easier!

씨투스정 50mg

(프란루카스트수화물)

KGMP적격업체제품

전문 의약품

분류번호 : 149

■ 원료약품의 분량 (1정 중)

프란루카스트수화물 (JP) 50mg

첨가제(동물유래) : 유당수화물(소, 우유)

■ 성상 : 분할선이 있는 흰색 또는 연한 노란색의 장방형의 필름코팅정

■ 효능·효과

1. 기관지천식 2. 알레르기비염

■ 용법·용량

성인 : 프란루카스트수화물로서 1회 50mg을 1일 2회 아침 저녁 식후 경구투여합니다. 증상에 따라 적절히 증감합니다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응 환자
- 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해 효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

2. 이상반응

- 1) 쇼크 : 쇼크 또는 아니필락시스모양 증상(빈도불명)이 나타날 수 있으므로 주의깊게 관찰합니다. 혈압 저하, 의식장애, 호흡곤란, 발진 등의 증상이 나타나면, 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다.
- 2) 혈액계 : 백혈구감소(초기증상 : 발열, 인후통, 전신권태감 등), 혈소판감소(초기증상 : 자반, 코피, 치육출혈 등의 출혈경향)가 나타날 수 있으므로, 이러한 증상이 나타난 경우에는 투여를 중지합니다.
- 3) 간장 : 황달, AST, ALT의 상승 등을 동반하는 간기능장애가 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하여 이러한 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다. 때때로 빌리루빈 상승, 드물게 ALP 상승 등이 나타날 수 있습니다.
- 4) 호흡기계 : 발열, 기침, 호흡곤란, 흉부 X선 비정상, 호산구증가 등을 수반한 간질성 폐렴과 호산구성 폐렴(0.02%)이 나타날 수 있습니다. 이러한 증상이 발현될 경우에는 투약을 중지하고 부신피질 호르몬 투여와 같은 적절한 처치를 합니다.
- 5) 근골격계 : 횡문근융해가 나타날 수 있습니다. 근육통, 무력감, CK(CPK) 상승, 마이오글로빈 상승 등의 증상이 발현될 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다. 또한, 횡문근융해로 인한 급성신장장애의 발생에도 주의해야 합니다. 드물게 관절통이 나타날 수 있습니다.
- 6) 과민반응 : 때때로 발진, 두드러기, 드물게 가려움, 다형성출혈성반 등이 나타날 수 있으므로 이상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 합니다.
- 7) 정신신경계 : 진전, 경련, 흥분, 불안, 때때로 두통, 졸음, 어지러움, 드물게 불면, 저림, 미각이상 등이 나타날 수 있습니다.
- 8) 소화기계 : 때때로 구역, 복통, 위부불쾌감, 설사, 드물게 구토, 속쓰림, 식욕부진, 변비, 복부팽만감, 구내염, 혀염, 허마비가 나타날 수 있습니다.
- 9) 순환기계 : 드물게 부정맥(빈맥·심방세동·기외수축 등), 심계항진, 흉조가 나타날 수 있습니다.
- 10) 비뇨기계 : 드물게 단백뇨, 요침혈, 빈뇨 빈도불명의 요량감소 및 배뇨장애가 나타날 수 있습니다.
- 11) 기타 : 경직, 두력, 체중증가, 유루증, 수전증, 객담증가, 기침, 위장염, 탈모, 월경불순, 드물게 홍부교액감, 부종, 관태강, 트라클리사이드 상승, 출혈, 호산구증가증, 인두불쾌감, 구갈, 이영이 나타날 수 있습니다.

12) 기관지천식에 사용시

- (1) 국외(일본)에서 승인시 조사부터 시판후 조사까지 이상반응집계의 대상이 된 4963례중 174례(3.5%)에서 216건의 이상반응(임상검사치 이상 포함)이 나타났습니다. 주요한 것은 발진·가려움이 30례(0.6%), 복통·위부불쾌감이 29례(0.6%), 설사 19례(0.4%), 구역 15례(0.3%), AST·ALT 상승 등의 간기능이상 17례(0.3%), 빌리루빈 상승이 7례(0.1%) 등입니다.
- (2) 국내에서 6년 동안 3,271례를 대상으로 실시한 시판후 조사 결과 160례(4.9%)에서 이상반응이 보고되었고 주된 이상반응은 소화불량 34례(1.0%), 가려움 30례(0.9%) 등이었습니다.

13) 알레르기성 비염에 사용시

- (1) 국외(일본)에서 승인시 조사부터 시판후 조사까지 이상반응집계의 대상이 된 4277례중 200례(4.7%)에서 258건의 이상반응(임상검사치 이상 포함)이 나타났습니다. 주요한 것은 설사 42례(1.0%), 복통·위부불쾌감 35례(0.8%), 발진·가려움 24례(0.6%), 졸음 17례(0.4%), 구역 13례

(0.3%), AST·ALT 상승 등의 간기능이상 8례(0.2%), 빌리루빈 상승 8례(0.2%) 등입니다.

(2) 국내에서 4년동안 696례를 대상으로 실시한 시판후조사 결과 4례(0.6%)의 이상반응이 보고되었고, 주된 것은 가려움 2례(0.3%)였습니다.

3. 일반적 주의

- 1) 이 약은 기관지확장제, 스테로이드제 등과는 달리 이미 일어나고 있는 천식발작을 경감시키는 약물 이 아니므로, 이것을 환자에게 충분히 설명할 필요가 있습니다.
- 2) 이 약의 투여중에 대발작이 일어난 경우는 기관지확장제 또는 스테로이드제를 투여할 필요가 있습니다.
- 3) 장기 스테로이드요법을 받고 있는 환자 중, 이 약의 투여에 의해 스테로이드를 감량하는 경우에는 충분한 관리하에 천천히 합니다.
- 4) 이 약의 투여에 의해 스테로이드 유지량을 감량한 환자 중 이 약의 투여를 중지하는 경우에는 원질 환 재발의 우려가 있으므로 주의합니다.
- 5) 이 약을 포함하여 류코트리엔길항제 사용시에 Chung-Strauss 증후군과 같은 혈관염이 나타났다는 보고가 있습니다. 이들 증상은 대체로 경구스테로이드제의 감량·중지시에 나타나고 있습니다. 이 약 사용시는 호산구수, 혈관염증상(저림, 사지악화, 발열, 관절통, 폐의 침윤 등) 등의 추이에 주의합니다.
- 6) 다른 류코트리엔 길항제를 투여 받은 환자에서 인과관계는 명확하지 않으나 우울증, 자살생각, 자살 및 공격적 행동 등의 정신 증상이 보고되었으므로 이 약을 투여한 후 환자의 상태를 주의 깊게 관찰해야 합니다.
- 7) 이 약의 투여에 의해 효과가 나타나지 않을 경우에는, 장기간에 걸쳐 투여하지 않도록 주의합니다.

4. 상호작용

- 1) 이 약은 in vitro 시험에서 CYP3A4에 의해 대사되어, 이들 약물의 대사를 경쟁적으로 저해하므로 주로 CYP3A4에 의해 대사되는 약물과 병용투여시 주로 CYP3A4에 의해 대사되는 약물의 혈중농도가 상승할 가능성이 있습니다.
- 2) 이 약의 대사는 in vitro 시험 및 in vivo 시험에서 CYP3A4를 저해하는 약물에 의한 이 약의 대사가 저해된다는 보고가 있으므로 CYP3A4를 저해하는 약물(이트라코나졸, 에리트로마이신 등)과 병용 투여시 이 약의 혈중농도가 상승할 가능성이 있습니다.

5. 임부 및 수유부에 대한 투여

임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에게는, 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단될 경우에만 투여합니다(임신중의 투여에 관한 안전성은 확립되어 있지 않습니다.).

6. 소아에 대한 투여

저체중출생아, 신생아, 영아 또는 소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않습니다(사용경험이 많지 않습니다.).

7. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(예를 들어, 1회 성인 용량의 1/2을 1일 2회)하는 등 주의합니다.

8. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의합니다.

■ 저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■ 포장단위 : 30정, 56정, 300정

■ 제조번호·사용기한 : 외부포장 참조

※ 본 의약품은 KGMP적격업체에서 생산하여 엄격한 품질 관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시, 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손되었을 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환해 드립니다.

※ 이 첨부문서 작성일자(2016년 3월) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.samapharm.co.kr) 또는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)이나 전화(02-2056-7272)를 통하여 확인하실 수 있습니다.

SA.160323-V1

sama 삼아제약

강원도 원주시 문막읍 동화공단로 49