



감마오리자놀·신경비타민을 함유한
근육경련 및 혈액순환 개선제

일반의약품

마그비 감마
연질캡슐

분류번호: 316 (혼합비타민제(비타민AD 혼합제제를 제외))


[개요 및 특징]

마그비감마연질캡슐은 마그네슘, 비타민E(토코페롤아세테이트)와 비타민B(티아민질산염), B3(니코틴아미드), B6(피리독신염산염), 감마오리자놀을 함유하는 제품으로서, 마그네슘 결핍으로 인한 근육경련을 개선하고, 육체피로, 신경통, 근육통, 관절통(요통(허리), 어깨걸림 등) 완화, 말초혈행장애 및 갱년기시 어깨·목걸림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)에도 효과적입니다.

[성분·함량] 1캡슐 중

토코페롤아세테이트(비타민E)(KP) 500mg (비타민D로서 500IU)
산화마그네슘(KP) 250mg (마그네슘으로서 150.78mg)
티아민질산염(비타민B1)(KP) 50mg
피리독신염산염(비타민B6)(KP) 40mg
γ-오리자놀(KP) 10mg
니코틴아미드(비타민B3)(KP) 10mg
첨가제(타르색소): 적색40호, 황색5호, 청색호

[성상] 흰색의 내용물이 들어 있는 적갈색의 장방형 연질캡슐



[효능·효과]

● 다음경우의 비타민 E, B1, B6의 보급

- 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시, 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
- 비타민E(토코페롤아세테이트): 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화: 어깨·목걸림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)
- 비타민B6(티아민질산염): 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨걸림 등)·각기·눈의피로
- 비타민B6(피리독신염산염): 다음 증상의 완화: 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

● 마그네슘결핍으로 인한 근육경련

[용법·용량] 만 12세 이상 및 성인 1일 2회, 1회 1캡슐 복용

- ※ 충분한 양의 물과 함께 복용합니다.
- ※ 그림과 같이 캡슐포장의 불룩한 부분을 화살표방향으로 누르고 알약만 꺼내 복용합니다. 이 때 실수로 알두미늄 포장을 함께 복용하는 일이 없도록 합니다.



[사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 2) 만 12개월 미만의 젖먹이 3) 심한 증상의 신부전 환자 4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
1) 인산염, 칼슘염, 장구(약)용 테트라사이클린계 제제, 제산제 2) 레보도파
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 3) 심장·순환기계기능 장애 환자 4) 신장(콩팥)장애 환자 5) 저단백혈증 환자 6) 임부 7) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 해당(이)자염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

8) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여합니다.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우: 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 묽은 변, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다. 3) 에스트로겐을 포함한 경우 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있습니다. 4) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다. 5) 고지방 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다. 6) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 7) 항알도스테로제, 트리암테네드 병용투여(함께 복용시) 고칼혈증증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오. 8) 우발적으로 과량복용 한 경우 9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.
- 3) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자가 이 약을 복용할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 복용을 적절히 조절해야 합니다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보전을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

- ※ 연질캡슐이 녹거나 변형될 수 있으므로 직사광선 및 고온다습한 곳을 피하여 보관하시기 바랍니다.
- ※ 빈 용기는 분리수거하여 주십시오.

[사용기한] 외부포장에 표기

- ※ 블리스터 포장의 제조번호 / 사용기한 표시 방법은 아래와 같습니다.
- 예) 제조번호 #6001, 사용기한 2019년 1월 6일인 경우 → "6001/190106"로 표시

[포장단위] 60캡슐(10캡슐/PTP포장 X 6), 120캡슐(10캡슐/PTP포장 X 12)

- ※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 정부의 '소비자분쟁해결기준'에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.
- ※ 본 제품 설명서의 최근개정된 내용은 홈페이지(www.yuhan.co.kr) 또는 소비자상담실(080-024-1188)에서 확인하실 수 있습니다.

문안작성연월일 2016. 3. 30



제조위·판매원

유한양행

본사: 서울특별시 동작구 도량로 74
공장: 충청북도 청주시 청원구 오창읍 연구단지로 219

홈페이지: www.yuhan.co.kr
소비자상담실: 080-024-1188(수신자 요금부담)

제조원 (주)유피코프
경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-7