


신경비타민을 함유한
근육경련 및 혈액순환 개선제

보령마그라크비타

연질캡슐

☞ 근육 경련(마그네슘 결핍) ☜ 신경통, 근육통, 관절통 증상완화

▲ 말초혈행 장애 경년기시 증상완화



품목기준코드:201601616 | 일반의약품

【원료 약품 및 그 분량】1캡슐(1,210mg) 중

토코페롤아세테이트(KP)	200mg	산화마그네슘(KP).....	250mg
(비타민 E로서 200I.U)		(마그네슘으로서 150mg)	
티아민질산염(KP).....	15mg	리보플라빈(KP)	6mg
피리독신염산염(KP)	1mg	니코틴산아미드(KP)	50mg
첨가제(타르색소) : 청색1호, 적색40호, 황색5호			

【성상】 황색의 점조성 내용물을 함유한 알감색의 장방형 연질캡슐제

【효능·효과】

- 다음 경우의 비타민 E, B₁, B₂, B₆의 보급
: 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시, 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.
- 말초혈행장애 및 경년기시 다음 증상의 완화 : 어깨·목결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)
- 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
- 각기 - 눈의 피로
- 마그네슘 결핍으로 인한 근육경련

【용법·용량】 성인 및 12세 이상 : 1회 1캡슐씩 식사와 관계없이 1일 2회

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 2) 만 12개월 미만의 젖먹이 3) 심한 증상의 신부전 환자 4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제 2) 레보도파
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오.
1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 3) 심장, 순환기계기능 장애 환자 4) 신장장애 환자 5) 저단백혈증 환자 6) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자 7) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 묽은 변, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 빨라지거나 양이 점점 많아 질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있습니다. 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민제를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘) 등의 위험이 증가될 수 있습니다. 4) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경 병적 증상 (Neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적 변화)이 나타날 수 있습니다. 5) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(Glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력장애), 고요산혈증(요산과다증: 혈액 중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다. 6) 대량 투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 7) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오. 8) 우발적으로 과량복용할 경우 9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용 시 주의사항
1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜십시오. 2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다. 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용후에는 피하십시오. 4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈당지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절합니다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여 받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.
- 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오. 3) 오용(잘못 사용)을 막고, 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 60캡슐(10캡슐/PTP×6), 120캡슐(60캡슐×2)

- ※ 만약, 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.
- ※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사 또는 약사와 상담하십시오.
- ※ 이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지 www.boryung.co.kr 또는 소비자 상담실 수신자 부담전화 080-708-8088에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 이 약을 사용하기 전에 반드시 첨부문서를 주의 깊게 읽어오며, 첨부문서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.
- ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 이지드럭(ezdrug.mfds.go.kr) 의약품정보를 참조하십시오.
- ※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전처(한국약품안전관리원 → 의약품유해 사례보고 → 온라인보고)에 알려주시기 바랍니다.
- ※ 본 제품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오. ※ 사용(유효)기한이 경과한 제품은 사용하지 마시기 바랍니다.

소비자상담실 수신자부담전화 : 080-708-8088

첨부문서 작성일자 : 2016년 4월 25일



제조·유통 및 판매자 : 보령제약(주) 경기도 안산시 단원구 능안로 107, 109

제조사 : (주)서흥 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61