

(대한제약) **하나**

전문의약품

칼리딘정

(칼리디노게나제)

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

- 유효성분(동물유래성분) : 칼리디노게나제(돼지의 췌장)(JP)
..... 50I.U
- 동물유래성분: 무수유당(소의 우유)
- 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 콜로이드성이산화규소, 폴리에틸렌글리콜6000, 히프로멜로오스프탈레이트

[성상] 흰색의 원형 장용성 필름코팅정**[효능·효과]**

1. 다음 질환에 의한 말초순환장애: 고혈압, 메니에르증후군, 폐색성혈전혈관염(버거병)
2. 갱년기장애, 망맥락막의 순환장애에 의한 여러 증상의 개선

[용법·용량]

1일 30~150I.U.를 3회 분할하여 경구투여 한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 뇌출혈 직후 등의 출혈 환자
 - 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 부작용
 - 1) 과민증 : 때때로 발진, 드물게 가려움 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
 - 2) 순환기계 : 드물게 심계항진이 나타날 수 있다.
 - 3) 소화기계 : 때때로 위부불쾌감, 구역, 구토, 식욕부진, 상복부통, 설사, 변비 등이 나타날 수 있다.
 - 4) 기타 : 때때로 열감, 드물게 두통, 두중, 졸음, 권태감 등이 나타날 수 있다.

3. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관**[포장단위]** 30정/병, 500정/병**[제조·의뢰자]**

하나제약(주) 경기도 화성시 향남읍 제약단지로 13-39

[제조자]

(주)일화 강원특별자치도 춘천시 동내면 거두단지2길 55

- ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 하나제약(주) 홈페이지(www.hanaph.co.kr)를 참조하세요.
- ※ 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품을 구입하였을 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 소비자 상담전화 : 080-577-8004(수신자 요금부담서비스)
- ※ 부작용 피해구제 신청은 한국약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)으로 문의바랍니다.

작성 연월일 : 2025. 03. 17. <M01>

**하나제약주식회사**
하일공장 : 경기도 화성시 향남읍 제약단지로 13-39