



[성상] 흰색의 크림제

[원료약품 및 분량] 이 약 1그램 중

테르비나핀염산염(JP)	10 mg
클리시리진산이 칼륨(KP)	5 mg
리도카인(KP)	20 mg
L-멘톨(KP)	10 mg
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸	1 mg
파라옥시벤조산프로필	1 mg

[효능·효과] 피부사상균에 의한 피부진균(곰팡이)감염증 : 무좀, 완선(사타구니백선), 백선

[용법·용량] 1일 1회, 적당량을 환부(질환부위)에 도포하십시오(바르십시오)

[사용상 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 마십시오.

- 1) 이 약 성분에 의한 과민증(발진 및 부적, 가려움, 붓기 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부
- 3) 유 · 소아

2. 다음 부위에는 사용하지 마십시오.

- 1) 눈이나 눈 주위, 점막(구강안, 비강(코안), 질 등), 음낭, 외음부 등
- 2) 습진
- 3) 습윤(습기 찬, 짓무름, 갈라짐이나 외상(상처)에 심한 환부(질환 부위)
- 4) 손톱, 두피

3. 이 약을 사용하는 동안 다음의 행위를 하지 마십시오.

이 약은 모유로 분비되므로, 이 약을 투여중인 수유부는 수유를 중단하십시오.

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 약사와 상담하십시오.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 약에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 임신 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
- 4) "습진"인지 "무좀, 완선(사타구니 백선, 백선)인지 확실하지 않은 사람(음낭에 가려움 및 짓무름 등의 증상이 있는 경우는 습진 등의 다른 원인에 의한 경우가 많습니다.)
- 5) 환부(질환 부위)가 안면(얼굴) 또는 광범위한 사람
- 6) 환부(질환 부위)가 화농(농음)으로 되어 있는 사람
- 7) 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.

5. 다음의 경우는 즉시 사용을 중지하고, 이 설명서와 함께 의사 또는 약사와 상담하십시오.

- 1) 사용 후 다음과 같은 증상이 나타난 경우

관계부위	증상
피부	발진 및 발적(출혈 되어 붉어짐), 가려움, 붓기, 자극감, 열감, 인비늘, 낙설(비듬)이나 대와 같은 피부의 벗겨짐, 짓무름, 피부건조 및 피부가 당겨지는 느낌, 피부의 갈라짐

2) 2주일 정도 사용하더라도 증상이 좋아지지 않는 경우나 본 약제의 사용에 의해 증상이 악화된 경우

6. 기타 이 약의 사용 시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법 및 용량을 엄수하십시오.
- 2) 환부(질환 부위)나 그 주위가 더러워진 채로 사용하지 마십시오.
- 3) 본 약제가 묻은 손으로 눈이나 점막을 만지지 마십시오.
- 4) 눈에 들어가지 않도록 주의하십시오. 만일, 눈에 들어간 경우에는 즉시 찬물 또는 미지근한 물로 씻어내고, 즉시 안과의의 진료를 받으십시오.
- 5) 이 약은 외용에만 사용하십시오.
- 6) 테르비나핀염산염 크림제는 모르로트를 대상으로 한 동물실험에서 약한 광독성이 나타났다는 보고가 있습니다.
- 7) 이 약은 벤조산을 포함하고 있어 피부, 눈, 점막에 경미한 자극이 될 수 있습니다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선이 닿지 않는 서늘한 곳에 밀봉하여 보관하십시오.
- 2) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 3) 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오. (오용(잘못 사용)의 원인이 되거나 품질이 바뀌는 경우가 있습니다.)
- 4) 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오. 그리고 사용기한 내더라도 개봉 후에는 최대한 빨리 사용하십시오.(품질유지를 위해).

[포장단위] 15g, 20g, 25g, 30g [저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관 [설명서개정연월일] 2017.05.10 / P1705-01

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 펼친 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질 · 변패 오염되거나 손상된 제품은 약국개설자 또는 약품판매업자에 한하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회에서 고시한 "소비자 분쟁해결기준"에 의거, 정당한 소비자피해에 대해 보상해 드립니다.
※ 약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어와 하며, 첨부문서를 약품과 함께 보관하십시오.
※ 첨부문서 최종 개정연월일(2017.05.10) 이후 변경된 내용은 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.
※ 약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다. ※ 부작용보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

제조의약자:



일양바이오팜
일양약품(주)개발회사

충청북도 제천시 바이오밸리 3로 8
소비자상담전화번호 : 02-570-3972
홈페이지 www.ilyangbio.co.kr

제조사: 시믹씨엠오코리아㈜

경기도 부천시 육신로 230번길 23