

일반의약품 정보

[유효성분] 1매 중, 특소프로펜나트륨수화물(KP) 77.76mg(무수물로서 68.5mg)

[효능·효과] 다음 질환 및 증상의 진통·소염(항염): 퇴행성관절염(골관절염), 근육통, 외상(상처)후의 종창(부기), 통증

[용법·용량] 1일 1회 1매 환부(질환 부위)에 부착한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 1) 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응의 병력이 있는 환자 2) 아스피린 천식(비스테로이드소염진통제(NSAID) 등에 의한 천식발작의 유발) 또는 그 병력이 있는 환자(천식발작을 일으킬 수 있다.)

2. 이 약은 다음의 신체부위에는 사용하지 말 것 1) 눈 및 점막 2) 손상된 피부 및 점막, 습진 또는 발진 부위 3) 무릎, 백선 등

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것 1) 기관지 천식(천식발작을 일으킬 수 있음.) 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자 3) 임부 및 수유부 : 임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않기 때문에 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부에 대하여는 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃돌)한다고 판단되는 경우에만 사용할 것 4) 소아 : 미숙아, 신생아, 영아, 유아 및 소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않다(사용경험이 없다.) 5) 고령자 : 시판 후 조사 결과, 65세 이상 고령자의 이상반응 발생률(3.7%, 1,738명 중 65명)은 65세 미만(1.7%, 1,300명 중 22명)에 비해 유의하게 높았다. 주요 이상반응이 부착 부위의 피부 증상이었기 때문에 특히 65세 이상 고령자에 사용하는 경우는 부착 부위 피부의 상태에 주의한다. 6) 이 약은 프로펠렌테리놀을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중하게 투여한다.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 주일 정도 사용하고도 증상의 개선이 보이지 않을 경우 2) 이 약을 사용한 1,075명 중 91명(8.5 %)에게서 이상반응이 보고되었다. 대부분 가려움(2.1 %) , 홍반(붉은 반점) (1.5 %), 접촉피부염(1.4 %) 등의 피부질환, 배가 거북함(0.6 %) 등의 소화기계 증상, ALT 상승(0.6 %), AST 상승(0.5 %) 등의 임상검사치 이상이었다. 3) 시판 후 조사 3,038명 중 87명(2.9 %)에서 이상반응이 보고되었다. 주로 접촉피부염(1.4 %), 가려움(0.5 %), 홍반(붉은 반점)(0.4 %) 등의 피부 증상이었다. 다음과 같은 이상반응이 나타난 경우에는 증상에 따라 사용을 중지하는 등 적절한 처치를 한다. ➡

[항상] 흰색 또는 반투명한 흰색의 점상성의 고체를 부직포 위에 도포하고(바르고) 부직점착테이프를 고정시킨 후 박리지를 덮은 카타플라스마제 [포장단위] 6매

※ 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(<http://www.drugsafe.or.kr>→의약품이상사례보고)에 알리도록 하십시오.

※ 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의약품 정보 참조

※ 만일, 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되었거나 손상된 제품이 발견된 경우에는 약국 개설자 및 의약품 판매업자에 한하여 교환해 드립니다.

	이상반응 빈도		
	0.5 ~ 3 % 미만	0.5 % 미만	빈도불명*
피부	가려움, 홍반(붉은 반점), 접촉 피부염, 피부발진	피하(피부밑)출혈, 피부지극, 색소침착	물집, 종창(부기)
소화기계		배가 거북함, 상복부 통증, 설사· 묽은 변	
간장		ALT 상승, AST 상승, γ-GTP 상승	
기타		부종(부기)	

*) 자발적 보고에서 나타나는 이상반응이므로 빈도 불명

4) 쇼크, 아나필락시스 : 쇼크 또는 아나필락시스(혈압저하, 두드러기, 후두부종(부기), 호흡 곤란) 등이 발생할 수 있다. 이러한 증상이 나타난 경우에는 증상에 따라 사용을 중지하는 등 적절한 처치를 한다.

5. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것 2) 소염(항염)진통제에 의한 치료는 대증요법(증상별로 치료하는 방법)임을 유의할 것 3) 피부의 감염증을 불현성화(알고도 드러나지 않게)를 우려가 있으므로, 감염에 의한 염증에 대하여 사용하는 경우에는 적절한 항균제 혹은 항진균제와 병용(함께 사용)하며, 충분히 관찰하여 신중하게 투여할 것 4) 만성질환(퇴행성관절염(골관절염) 등)에 대하여 이 약을 사용할 경우에는 약물요법 이외의 요법도 고려할 것. 또한 환자의 상태를 충분히 관찰하여 이상반응의 발현(드러냄)에 유의할 것 5) 밀봉봉도포법을 사용하지 말 것

6. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것 2) 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것

[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기한] 용기 하단 표시일까지

[첨가제] : 첨가제(동물유래성분) : 젤라틴(원동물: 소, 사용부위: 가죽) · 기타 첨가제: 건조 수산화알루미늄겔, 농글리세린, 박하유, 부직점착테이프, 부직포, 실리콘나이트리드폴리에스테르필름, 에테르산나트륨수화물, 정제수, 타르타르산, 폴리비닐알코올, 폴리비닐피롤리돈, 폴리크로틸렌이테80, 폴리크로틸렌나트륨, 폴리메틸렌글리콜, 피로아황산나트륨, L-멘톨

제조원회사

부강약품주식회사
경기도 안산시 단원구 능안로 47

제조자

tdds [주]티디에스엠
충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 369-49

제조번호 :

사용기한 :



(01)08806422040516 OTHER

이 문서 작성일자(2019년 3월 20일)이후 변경된 내용은 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.